




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1600/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1600/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1600/A/1




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1600/A/1

TV. A. 188
1600
All



2



Collegio Auditoro Parma
Contributo Donavit Wilhelm
Long Auditor MD: 5 1603

42600
VALERII CORDI
Dispensatorium,


SIVE

PHARMACORVM
CONFICIENDORVM

RATIO;

Cum PETRI COVDENBERGII, &
MATTHIÆ LOBELII Scholiis, emen-
dationibus, & Auctariis.

Accessit hac editione, præter GVILIELMI
RONDELETII de Theriaca tractatum, emen-
datiorem; & FORMVLAS SELECTIORVM
PHARMACORVM, quorum post Val. Cordum
vsus passim receptus est, auctiores; alius FR.
DISSALDEI eiusdem argumenti Libellus.



LVGDVNI BATAVORVM,
Ex Officina IOANNIS MAIRE.
clō. lō. c. xxvii.



LECTORI.

Scias, benigne Lector, asteriscos sparsim in hoc libello obuios, loca emendata, mutata, vel restituta denotare: Notis item his [] inclusa, illustrando contextui addita esse à P. Condenbergio, & aliis.

*Virtutum omni genere
Clarissimo viro,*

D. GERARDO GRAMAIO,
Domino Vefaliae Comitiss,

ac Aërarii bellici Quæstori Statuum
dignissimo,

PETRVS COVDENBERGIVS S. P.

CVM VALERII CORDI de conficiendis Pharmacis libellum Christophorus Plantinus pralo suo esset commissurus, rogavit me, ut, si quid haberem quod editionem istam iuvare posset, cum studiosis communicarem. Fuit enim optimo viro semper propositum, ut quos libros imprimit, non nisi emendatissime è sua officina prodire sinat. Quamobrem, ut de ipsius incredibili taceam diligentia & sumptu; in omni disciplinarum genere doctissimorum virorum opera utitur. Ego verò, etsi quæ iam olim in hunc Cordi libellum (quem ego, quicquid dicat præfatio anonyma, post obitum auctoris in lucem prodisse, heredum vel amicorum curâ, certis de causis persuasum habeo) annotaveram,

A 2

non

non essent apud me tanti momēti, ut vel
semel de illorū editione cogitauerim; ta-
men nō potui nō homini mihi amicissimo,
& honesta petenti morem gerere. Quare
vespertinas aliquot hac hieme horas; quā
sole me quid scribere vel legere permitte-
bāt, libelli huius correctioni dedi; & ma-
ximo mendorum numero sublato, in suū
queque ordinem restitui; multis interim
ipsius auctoris adiectis medicaminibus,
quae hactenus hīc fuerunt desiderata; ita
ut operā me meā non malē posuisse cōfi-
dam: ubi à nonnullis haud immeritò no-
tatur, explicatē subiunctis id rationibus
doceo; & nonnumquā ineptas quorundā
reprehensiones refuto, quae solo nouitatis
studiosine ullis rationibus vidētur inuectae.
Si quid autē à me erit omissū, copiosē &
diligēter excutietur in magno meo huius
farinae opere, quod fortasse aliquādo me-
dicis & pharmacopæis non minorem vo-
luptatē quā utilitatem adferet. Quod
verò illud nondū perficiā & publicē, ma-
ximas habeo & grauissimas consilii mei
causas, tū quòd eorū fauore nō subleuer,
quorum

quorū intererat curare ut tale quid diligēter præscriberetur; tū quod tēpora sint eiusmodi, ut plures fiāt alypta, quā experti Medici & Pharmacopœi. Qua de re cū mecū cogito, nihil fero molestius, quā gentis nostræ inscitiam; quæ cū in aliis ferè rebus omnibus nulli sit nationi secunda, nusquam aequè peccat, quā quod nostri ordinis hominib. sit iniquior. Id verò pluribus verbis aperire non est necesse. Quis enim est vel mediocriter in pharmacopoliis versatus, cui hoc non sit notissimum? Magna spes erat præterea, IOANNEM GOROPIVM BECANVM, non tantum rei Medicæ, sed vniuersæ Philosophiæ & antiquitatis peritissimum virū, aliquid de Pharmaceutice scripturum. quod utinam fecisset, Sed quia nunc omni doctrina refertum opus, quod verè venerande antiquitatis plaustrum quis appellet, præ manibus habet, nostris certè rebus vacare non potest: ideoque nec hortum, ut constituerat, colere. Id quidē ego totis ferè viginti annis feci sedulò: & quidem nūc maximis laboribus & impensis,

A 3

ad sex-

*ad sexcenta exoticarum stirpium genera
in meo florere hortulo quotidie, etsi rei
familiaris cum iactura & dispendio,
maxima tamen cum voluptate cerno. Et
nisi cultor pauperis horti esset pauperior,
darem operā, ne quid mihi deesset, quod
nostra saltem tellus, licet summa cura,
ferre posset. Interea id quod possum ago,
quando quod volo non licet. Sperandum,
inquit Euripides, & ferendum. Ceterum,
ut ad institutum redeam, quæ in hoc
opusculo præstui, illa tibi, Gerarde Gra-
maie, singularis omnium bonarum artiū
patrone, dico dedicōque; partim ut obser-
uantiam erga te meam testificer, par-
tim ut hæc qualiacumque nominis tui
auctoritate munita, invidiam & calum-
nias tanto facilius ferant. Suscipies ergo
hæc, quæ tua est humanitas, benigno vul-
tu, quo Petrum Coudenbergium in tuā
iam pridem clientelam recepisti, & re-
ceptum constanter tueri pergis. Vale,
Macenas optime. Ex officina nostra
pharmaceutica, Antuerpiæ, Kalend.
Martii clo. Io. LXVIII.*

PRÆ-

7

PRÆFATIO
PRISCÆ EDITIONIS,
AD LECTOREM.

CUM Valerius Cordus, Euritii illius celeberrimi Medici filius, studiorum gratia Italiam petiturus, obiter ad urbem nostram Norimbergam peruenisset, atque cum doctis quibusdam ac bonis viris, præcipuè Medicis, mutuam notitiam, amicitiam, familiaritatemque studiosè contraheret; inter cetera, quæ de bonis litteris atque re Medica, vtrò citroque inter eos familiariter, ut fieri solet, agitata sunt; mentio incidit Dispensatorii, quod ipse ex omni genere bonorum auctorum, cum veterum, tum recentium, de Pharmacorum omnium, quatenus in usu sunt, conficiendorum ratione collectum, diligenter & emendatissimè conscripserat. Cumque constaret, illud iam antea in aliquot Saxoniae urbibus, præcipuis Medicis approbantibus, in usum publicum fuisse receptum, interimque tamen ab eo & locupletatū, & annotationibus eruditis magis atque magis illustratum; rogatus fuit à compluribus, ut illud ipsum etiam nostris Pharmacopolis impertiret. Cordus autem, etsi ad iuvandam rem Medicam iam tum mirificè esset

A 4 accen-

accensus, pro sua tamen modestia atque prudentia, nonnihil subuerebatur, priuatam suam auctoritatem ad Pharmacopolas permouendos, ponderis haudquaquam satis esse habituram. Itaque librum suum Senatui potiùs offert, tum demum in usum publicum assumendum, cum esset illius iudicio & auctoritate comprobatus. Senatus verò, pro sua in studiosos omnes propensione, ac reipublicæ omni ex parte iuuandæ diligentia ac sollicitudine, officium illud Cordi perquam gratum habuit; librūque collegio Medicorū, Cordo præsentē, perlegendum & examinandum tradidit: ut si quid mutandū, adiiciendūve arbitraturi essent, id auctore non modò sciente, verum etiam consentiente fieri posset. Quod cum sedulò ac magna diligentia factum esset, Senatusque ex Medicorum censura iam intellexisset, nihil hactenus absolutius aut emendatius in hoc descriptionum genere typis inuulgatum esse; librum non solum in publicum edendum, verum etiam Pharmacopolis, ut eum veluti lumen quoddam deinceps sequantur, offerendum esse decreuit. Cuius quidem editioni, hac quoque de causa studiosius inuigilatum est, ut auctore interim in Italia, dum ad metam studiorum suorum quàm acerrimè contendit, immatura morte sublato, aliquid tamen illius

exta-

PRAEFATIO.

9

extaret, quod ingenium eius & industriam posteritati testaretur, eumque ab obliuione vindicaret.

Hoc igitur Valerii Cordi, candidissimi & diligentissimi iuuenis monumentum quaecunque, certè non poenitendum, studiose lector, obuïs vlnis amplectere: & si quid ex eo iuuaberis (iuuaberis autem, nisi fallor, quàm plurimùm) amplissimo Norimbergensi Senatui, cuius liberalitate tibi cõmunicatur, gratias habe. Sin autem aliquid in eo displicuerit, ne Auctorem mortuum inhumaniter calumniis impete: sed absolutiore opere in publicum edendo, illum vincere, & nomen eius obscurare contende. Bene vale.

IOANNES POSTHIVS
D. MEDICVS GERMANVS.

*Pharmaca quæ Cordus variis collegit in hortis,
Lætus agens æui tempora verna sui,
Post obitum in multos transcripta fuere libellos;
Verùm his errores non tolerandi incrant:
Quos gelido veniens Petrus de monte remouit,
Miscendo fidâ pharmaca cuncta manu.
Dii tibi, Coudenberge, senis dent Nestoris annos,
Vt quod habes, ingens perficiatur opus.*

A ; INDEX

INDEX SECTIONVM.

Pharmacopœum qualein virum esse deceat.
 Confectiones aromaticæ.
 Confectiones Opiatæ.
 Conditæ. Conferuæ.
 Syrupi. Rob. Lohoch.
 Lenitiua & Solutiua.
 Pilulæ. Trochisci.
 Olea. Vnguenta.
 Cerota. Emplastra.
 Præparationes quorundam simplicium.
 Ponderum ratio & notæ.
 Accesserunt Valerii Cordi De purgantium medicamentorum extractione, ac Oleorum artificiosa distillatione (præter nonnulla pharmaca locis suis inserta) libellus.
 Epitaphium eiusdem Valerii Cordi.

APPENDICIS INDEX.

De Delectu, Collectione, Repositione, & Duratione Simplicium, ex Iacobo Siluio.
 De Adulterationibus Simplicium medicamentorum cognoscendis, ex eodem Iacobo Siluio.
 Simplici aliquo absolutè scripto, quid accipiendum, ex eodem Iac. Siluio.
 Diarium Pharmacorum parandorum, & simplicium legendorum, à Matthia Lobelio collectum.
 Nonnulla purgantia medicamenta composita, Matthiæ de Lobel.
 Succedanea, Quid pro Quo, vt vocât, ex Iac. Siluio.
 De Succedaneis, Lobelii, imitatione Rondeletii.
 Guilielmi Rondeletii de Theriaca tractatus, emendatior & auctior.
 Formulæ Selectiorum Pharmacorum, post Cordum vſitatorum, auctiores.
 Pharmaconetes siue Pharmacitis Biblos, Fr. Dissaldei, Liber continens Pharmaca tam simplicia quàm composita, quæ in Officinis parata habere debent Pharmacopœi.

v A-

II
VALERII CORDI

SIMESVSII

PHARMACORVM

CONFICIENDORVM

RATIO.

*Qualem virum Pharmacopœum
esse deceat.*

MAGNUM præsidium humanæ imbecillitati in Medicina situm est, vt Homerus, omnium poëtarum præstantissimus, Medicum non sine causa ποικίλιν ἀντάξιον ἄλλων pronuntiasse videatur. Verùm huius laudis, vt nunc quidem Medicina administratur, non exiguam partem Pharmacopœus sibi vindicat, cùm sit Medici quasi dextra manus; pericliteturque ipsius culpâ sæpè, non solùm ægri valetudo, verùm etiam Medici, quantumuis præstantis, fama & existimatio; cùm ea quæ Medicus rectè præscribit, parum dextrè exequitur, aut materia vititur exoleta, aut adulterata. Inde enim frequenter accidit, vt æger vel non iuuetur omnino, vel, quod multo peius est, etiam lædatur. Medicus autem, præterquam quòd pro imperito habetur, etiam in errorem ducitur, dum se

A 6

aut

aut de morbo non rectè iudicasse, aut non debitam medicinam administrasse suspicatur. Quare non temerè quemlibet ad huius muneris functionem admittere deberent, qui ad gubernacula rerum publicarum sedent. Verùm illi ut volent, suo fungantur officio, nos idoneum Pharmacopœum paucis delineabimus, ut ineptos & improbos à functione tam periculosa submoueamus, idoneos autem ad hoc munus capeffendum alacriores reddamus.

Principio, Latinæ linguæ non vulgariter tantùm, sed ad munditiem & proprietatem usque peritum esse oportet, ut ea quæ eruditi Medici, vel in genere, vel in specie ipsi præscribunt, rectè & exactè intelligere possit. Neque confidat se satis instructum esse, si semel vulgarem quandam viam functionis suæ, quasi artificium manuarium perdidicerit. Namquum multa quotidie noua conficiendarum medicinarum ingenia inueniantur; multa etiam veterum, obliuione sepulta, iterum in lucem eruantur, noua illi itidem quotidie discenda erunt; neque semper habere poterit aliquem, qui ea ipsi quasi per manus tradat, & ad oculum demonstret, ex eruditorum virorum descriptionibus ea ut discat necesse est. Quare si Latinæ linguæ probè peritus non fuerit, fructus nouorum ingeniorum, aut omninò,
aut

aut magna ex parte expers manebit.

Deinde opus est illi etiam cognitione rerum minimè vulgari, aut protrita, earum præsertim quæ propriè ad functionem eius pertinent: cuiusmodi sunt Simplicia omnia, quorum descriptiones ex præstantissimis auctoribus petitas, ad res ipsas cōferre debet, donec exactam illorū cognitionem hauriat, & prorsus imbibat. Cognita verò, visu, gustu, olfactu, tactu, & aliis debitis modis sæpe ac diligēter examinet, non solum ut falsa à veris, & adulterata à sinceris; verum etiam ut præstantissima à mediocribus, & mediocria à degeneribus discernere consuescat.

Est & alia causa cur tā diligenti examine opus sit. quædā enim alioqui grata, & salubria, ob insignē tamē acrimoniā in vasculis æreis decocta, aut instrumentis ferreis diu tractata, tam terrū ac horribile virus inde cōtrahūt, ut gustu fiāt abomināda, & quāvis valenti vētriculo intolerabilia. Quare hoc quoque scire debet, quo genere vasculorū & instrumentorū, vnaqueque medicina sit coquenda, tractāda, & conseruanda.

Hanc curam, alia quasi huic connexa sequitur, scilicet, ut herbas, flores, fructus, femina, radices, debito tempore colligat, & ritè reponat, ne vel parum efficacia sint, vel putrescant, aut nimis arefacta virtutem omnem amittant.

Habeat etiam ædes salubri loco sitas, ac variis reponendis conseruandisque accom-
modas. nonnulla enim humido, pleraque calido, quædam sicco, quædam etiam frigi-
do loco rectius conseruantur: quam varie-
tatē non quælibet domus præstare potest.

Facultates quoque saltem mediocres adsint oportet; in primis autem animus li-
beralis, ab avaritia sordibusque alienus. Diuitiæ enim hoc præstare poterunt, vt cō-
modè habitet, & Medicinas, quæ emendæ sunt, suo tempore quam-optimas coëmat. Animus autem liberalis, minimeque aua-
rus, cauebit, ne cōpendii, aut lucri sui cau-
sa, deteriores vili pretio libentiùs, quàm præstantissimas, paulo largiore cōmparet.

Iam simplicibus medicinis omnibus di-
ligenter collectis, coëmptis & repositis, succedit industria compositarū ritè dispen-
sandarum; vbi eum in primis vigilantem & circumspectum esse oportet. Nec temerè confidet ingenio suo in succedaneis eli-
gēdis, sed peritum Medicū consullet: quem etiam omnino in conficiendis Opiatis, & similibus præstantibus, ac magni momenti medicinis, vt præceptorem & iudicem ad-
hibebit: cui adiunget, si commodè fieri po-
terit, vnum & alterum bonum atque doctū virum, vel Senatorii ordinis, vt eos habeat veluti testes suæ diligentix, industriæ ac fidei. Deinde quamque medicinam sic ritè præpa-

præparatam, debito ac præscripto tempore fermentari sinat, antequàm eam in vsum publicum expendat.

Nec minor in eo fides requiritur in reiciendis simplicibus atq. cõpositis, quàm in iisdem reponendis & componendis. Debet enim singulis mensibus, aut sæpiùs etiam, omnia lustrare, & diligenter considerare, vt corrupta, putrida, mucosa, exoleta, & quouis modo inutilia, vel inefficacia reddita, reiciat bona fide; nec in iis quærat suũ lucrũ, quibus ægroto crearetur vitæ periculũ: sed sit, vt diximus, animo liberali & magno; cogitetq. parũ illud damnũ, fide sua iam perspecta, maioris sibi lucri causam fore.

Hæc omnia cùm indefessam diligentiam & animum sibi semper præsentem requirant: hoc quoque obseruare conuenit, ne sit alex aut similibus ludis deditus, ne computationibus gaudeat, aut alioqui vinosus, vel ebriosus, neque fœdis amoribus implicatus teneatur. Alea enim negligentiam parit: ebrietas, errores, obliuionem & stuporẽ inducit: turpis verò amor, etiam veneficia illi extorquere posset.

Quare omninò, si fieri potest, maritus sit, cui cum vxore rectè conueniat; liberosque habeat, quos honestè educare studeat: huiusmodi enim pignoribus obstrictus, vagas libidines detestabitur, neq. illis fomēta sciens subministrabit: & posteritati suæ
consu-

cōsulens, bonam conscientia seruare adnirretur; nec metu, nec gratia, nec prece, nec pretio, ad vllum veneficium impelleretur.

Quòd si accesserit vera pietas, hoc est, timor Dei, & fides in Christū, charitas erga proximū, & spes futura vitę, omnia erunt tutiora, illustriora & feliciora. Tum enim cogitabit: Si cūm quid per negligētiam in vitam aut valetudinem proximi peccaue-
ro, iudiciū Dei non effugiā: quanto minū
effugiam, si sciens ac prudens venenum de-
dero, aborsum procurauero, aut aliquod
aliud ingēs atque insigne flagitiū designa-
nero? Et si humanitas eorū qui infirmos &
ægrotos tantūm visitare solent, Christo
adeò grata est, vt illud beneficiū in seipsum
collatum esse affirmet; quantò gratior erit
illi mea cura & sollicitudo, dum studeo illis
Medicinas rectè cōponere, tempestiuè ex-
hibere: & non propter lucrum tantūm, verū
etiam humanitatis respectu operam dare,
vt meliūs habeant & conualescant?

Hęc & similia si cogitabit, vltro, ac sua
spōte, erit humanus, placidus, affabilis, be-
nignus, alacris, in primis autem mitis erga
pauperes, & commodus erga imperitos; nō
enim in eorū ineptias, sed in necessitatem
ægroti respiciet, ac Deū omniū inspectōrē
ac iudicē prę oculis habebit: qui rectè agē-
ti longè maiora & beatiora prēmia largie-
tur, quàm ab vllō mortaliū persolui possint.

C O N -

17

CONFECTIONES

AROMATICÆ.



*Aromaticum Garyophyllatum, descri-
ptionis Mesuæ.*

℞. Garyophyllorum ʒ vij.
Macis Zedoariæ Galangæ
Sātali Machoziri Trochiscorū Diarhodō
Cinnamoni Ligni Aloës Spicæ Indicæ
Piperis longi Cardam. minoris ana ʒ j. ✱
Rosarum ʒ iiij. Glycyrrhizæ rasæ
Galliæ moschata veræ ana ʒ ij.
Folii [Sumatur eius loco Casialignea vera, aut
duplex pondus Cinnamomi.]
Cubebarum ana ʒ ij. Ambra ʒ j. ✱
Moschi ʒ β. Sacchari optimi.

VAL. CORDI ANNOTAT.

IN confectiōibus aromaticis ad saccharili-
bram unam, pendentem ʒ xij. accipiat ʒ j. spe- ✱
cierum.

MYROPOLE accipiant in confectiōibus libram
continentem ʒ xij. & secundum hanc diuidantur ✱
uncia, dragma & scrupuli. Scrupulus verò pen-
dat grana electa xx. Nicolao presertim.

GALANGÆ, id est, minoris Galangæ &
rusæ, saporis aromatici: nam assertur hodie noua
quæ

quedam Galanga, magna, crassa, foris subrusa,
intus Zingiberis palliditate & filis, gustu acerrima,
sine aromatica aliqua gratia: hac in nullas con-
fectiones Galanga nomine incutienda est. Quod se-
* mel dixisse satis sit.

A **SANTALVM** Machoziri, est species citrini
Santali, odoratissima, & valde aromatica, tam
gustu, quam odore: & affertur ad nos cum San-
talo albo, & citrino vulgari.

GLYCYRRHIZA est dulcis radix, quam
hodie usitato nomine Liquiritiam appellant.

B **FOLIUM** nondum allatum est ad nos in Ger-
maniam; quare cum eo careamus, necesse est eius
loco aliquod succedaneum accipere. Est autem eius
succedaneum, ut Galenus nobis reliquit, Spica In-
dica, aut Casia lignea vera. Cum autem hac con-
fectio alioquin capiat Spicam Indicam, Folii vice
Casiam ligneam veram accipiendam esse censeo.

MOSCHI scribendum est: nam Musci ap-
pellatione, arborum villosa canities dicitur.

PETRI Coudenbergii Scholia.

A Santalum Machoz. est species, &c.] San-
tali citrini duas reperiri species, cum Cordum dice-
re Franciscus Alexander in suo Apolline miretur,
nos easdem quoque iisdem aceruis à Lusitanis
Antuerpiam aduectas interdum observauimus.
Vnam nempe (Santali albi corde ad rufedinem
accedente, ignaris quandoque imponitur) inter
vulgarem optimam, ex pallido rufescentem, odo-
ratam ac aromaticam: Alteram verò prorsus
luteam,

Inteam, aut quasi croco tinctam, odoratissimam, & valde aromaticam tam gustu quam odore, ut & Cordus ait; atque insuper unguinosam, sed eam admodum raram. De hac itaque specie cum Cordum hic locutum esse existimem: non ea propter tamen id ipsum quartum Santalum dici debere putamus, ut Franciscus sinistre colligit: haud secus atque nigri Piperis species plures cum sint, magnitudine, duritie, pondere atque acridine differentes, illorum aliquod quartum Piper esse dici non possit. Ceterum de Santalis plura, ea-que magis indubitata, quam à quoquam hactenus scriptitatum est, qui cupit, Garcia ab Horto de Aromatibus Indicis libellum, nuperimè ex Lestranico in Latinam linguam à Carolo Clusio conversum, consulat.

Folium.] Folium tribus nervis distinctum, laurino simile, quod Folii Indi nomine in officinis passim prostat, Folii in medicamentis locum non incommodè obtinere possit, dum genuinum adferatur, haberi que abundè queat. De hoc quoque pluribus Garcia libellus.

VENTRICULUM & cor cōfortat: nauscam & vomitum sedat, & valet contra putrefactionem in partibus ventriculi. Membra verò nutritionis calefacit, ac ventositates dissolvit & carminat.

*Aromaticum Rosatum Gabrielis,
descript. Mesuæ.*

R. Rosarum rubrarum 3 xv.

Gly-

Glycyrrhizæ rasæ ʒ vij.
 Ligni Aloës Sātali Machoziri ana ʒ iiij.
 Cinnamomi electi ʒ v.
 Macis Garyophyllorum ana ʒ ij. β.
 Gummi Arabici
 Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.
 Nucis moschatæ Cardamomi
 Galangæ ana ʒ j.
 Spicæ Indicæ Ambra grisea ana ʒ ij.
 Moschi ʒ j. Sacchari.

CARDAMOMI, videlicet minoris: nam cum simpliciter Cardamomum scribunt auctores, minus Cardamomum, id est, vsuale intelligunt.

MOSCHI, hoc est, ut vulgò dicitur corrupto vocabulo, Musci; pus illud aromaticum.

VENTRICULO imbecillo, aliisque nutritioni deseruientibus instrumentis succurrit. Ventriculi humiditatem, omnemque in eo putredinem emendat: concoctionem iuuat; & ex morbo conualescentibus auxiliatur.

Dianisum D. Mesua.

℞. Anisi electi ʒ xx.
 Glycyrrhizæ rasæ Mastiches ana ʒ j.
 Carei [i. Carui] Macis Galangæ Fœniculi
 Zingiberis Cinnamomi ana ʒ v.
 Macropiperis Melanopiperis Leucopip.
 Calaminthæ Pyrethri
 Casia lignæ veræ ana ʒ ij.
 * Cardamomi minoris Garyophyllorum
 Cube-

Cubebarum Spicæ Indicæ
 Croci ana ʒ j. β. Sacchari.

MASTICHES, hoc est, ut vulgo dicitur,
 Masticeis.

CASIA lignea vera debet accipi, quæ nuper
 cepit afferri; figura Cinnamomi, gustu aliquan-
 tulum lubrica, & Cinnamomi amula: at non ille
 parvus cortex saporis insipidi ac styptici, ut hæte-
 nus factum est.

CRASSIS flatibus in ventriculo natis,
 eiusdemque perfrictioni succurrit. Pitui-
 tam in eo crudam absomit; tussique diu-
 turnæ potest.

Diambra D. Mesue.

℞. Cinnamomi Doronici
 Garyophyllorū Macis Nucis Moschatæ
 Folii [aut succedanei eius] Galangæ ana ʒ iij.
 Spicæ Indicæ Cardamomi maioris
 Cardamomi minoris ana ʒ j.
 Zingiberis ʒ j. β.
 Santali citrini Ligni Aloës
 Piperis longi ana ʒ ij. Ambræ ʒ j.
 Moschi ʒ β. Sacchari albißimi.

CONTRA omnem corporis imbecilli-
 tatem efficax est; omnemque corporis per-
 frictionem discutit: nativum suscitatur ca-
 lorem, & rediuvium recreat; resarcitque
 eos qui frigido torquentur humore, Iuvat
 articulos, & membris omnibus miri-
 ficè

ficè subuenit. Venterculum fastidientem,
 quique cibum continere non potest, robo-
 rat : & inappetentiam cibi summè corri-
 git. Cor ipsum roborat.

A *Diathamaron D. Nicolai.*

R. Anthophyllorum

Zingiberis ana ʒ v. ʒ j. ʒ xvj.

Cinnamomi

Garyophyll. ana ʒ iiij. ʒ j. ʒ iiij.

Carnium dactylorum ʒ iiij. ʒ. ʒ viij.

* Galangæ Spicæ Indicæ Zedoariæ

Costi Pyrethri Coralli rubri

B Rheupontici [accipiatoreius pæmeriâ Rha-
 barbarum sic vocatum]

Saliuncæ Tragacanthæ Anacardii

Ossium dactylorū Carpobalsami Anisi

* Baccarum Iuniperi ana ʒ ij. ʒ ij. ʒ viij.

Leucopiperis

* Macropiperis ana ʒ j. ʒ j. ʒ ij.

Limaturæ auri puri

Limaturæ argenti meri

* Ossium è corde cerui ana ʒ ij. ʒ. ʒ vj.

Rasuræ Eboris Moschi ana ʒ j. ʒ viij.

Ambre ʒ j. Sacchari.

THAMAR Arabibus dactylum, palma ar-
 boris fructum significat ; unde confectiori nomen

* Diathamaron : corruptè Diacamaron.

ANTHOPHYLLI sunt grandes Garyo-
 phylli, qui ad maturitatem perueniunt, nucleo
 intus

intus duro bisidoque; sapore non tam acres ut Garyophylli, praterquam in superficie.

COSTI, videlicet albi, feruidum & aromaticum saporem habentis. Non vulgaris illius grandis, qui teterrimum & rancidum saporem habet, & adulterinus est, atque ex Helueticorum alpibus & Italia ad nos affertur.

CARPOBALSAMI. Non habentur Opobalsamum, Carpobalsamum, & Xylobalsamum, secundum eorum veram descriptionem: verum cum experientia didicerimus, quod olea Cinnamonum & Garyophyllorum secundum nostram artem distillandi, veteribus ignotam, parata, in probis Balsami veri, & virtutibus similia sint (quare etiam pro Opobalsamo, oleum Garyophyllorum in Theriacam nostram accepimus:) non inconsultum esset, si quis pro Carpobalsamo acciperet Cubebas, aut Caryophylla, siue etiam Cardamomum, aut aliud semen, quod haberet mordacitatem in gustu, cum quadam redolentia, secundum Carpobalsami descriptionem, si horum nulum antea esset in descriptione.

SALIUNCA Germanicum est vocabulum, quo significatur Spica Celtica vera, quam in Pharmacopoliis Spicam Romanam appellant. Sed in Nicolao Alexandrino Græco, inuenitur loco Saluınca Eleliphacum, id est, Salvia, præsertim in Aurea Alexandrina.

LIMATURA auri & argenti. Cum aurum sit metallicum & valde ponderosum corpus, limatura eius vel scobs semper fundum petit, nec aqua-

*aqualiter confectiōibus commiscetur : quare hic,
& reliquis omnibus locis, sumantur folia auri.*

P. C. SCHOL.

A Pondera apud Cordum hacce in compositione deprauatissima restitui : sed non veluti L. Fuchsius ex suo Myrepsō vult, hocce in medicamento, innumerisq̃ue aliis corruptissimo.

B Corallium album, quod à Cordo perperam appositum erat, deleui.

EFFICACITER prodest difficulter spirantibus, arteriacis, ruffientibus, tabidis & omni thoracis & stomachi offensa : Aquæ subter cutem fusæ, renum doloribus. Voluptatem parit, corporaq̃ue saginat.

Diacalamintho D. Mesuæ.

℞. Calaminthæ montanæ

Calaminthæ campestris Seselios

Petroselini Macedonici ana ʒ vj.

Zingiberis ʒ iij.

Seminis Apii

Comarum Thymi ana ʒ ij.

Ligustici ʒ vj.

Piperis ʒ xij. Sacchari albissimi.

CALAMINTHA montana nascitur copiosissimè in montibus circa Confluentiam urbem, ad Rhēni & Mosellæ confluentes.

CA-

CALAMINTHA campestris, hoc est, usualis Calamintha, quæ in arvis nascitur (Mesue fluiatilem requirit:) hæc enim efficacior est, quàm in humidis locis nata. Germanicè *Korannyntz* vocatur.

SESELIOS, id est *Siselios*, quod etiam *Siler montanum* vocatur.

COMARVM Thymi, id est, summitatum foliorum, & florum Thymi.

PETROSELINVM Macedonicum non est Olusatrum, vel, ut corruptè pronuntiant, Olixatrum, aut Alexandrum, semine oblongo, magno, nigro, amaro, ac Myrrham emulante sapore. Sed quia iam vero Macedonico Petroselino caremus, licet nobis eius loco Olusatri semen accipere (quod vulgò in Pharmacopoliis Petroselinum Macedonicum, falso tamen, appellatur;) donec aliquando verum nobis contingat.

PIPERIS, id est, Piperis nigri: nam cum Piper simpliciter pronunciamus, semper nigrum intelligimus.

AVXILIATVR iis quos cibi fastidiũ urget, appetentiam reuocans: ægri quoque spirantibus, ventriculo refrigerationem sentienti, & flatibus distento, confert.

*Diacalaminthon Galeni, Sanitatis
tenenda lib. 4.*

℞. Calaminthæ	Pulegii	Petroselini
Seselios	ana	5 3.
	B	Aprii

Apii Cacuminum Thymi ana \mathfrak{z} ij.
 Ligustici seminis \mathfrak{z} viij.
 Piperis \mathfrak{z} xxiiij. Sacchari.
 CRASSA ac lenta attenuat & discuti-
 tit: vrinas mouet, ac mulieribus menses.

Diacuminum D. Nicolai.

Rx. Cumini præparati [*id est, pridie in aceto
 infusi, & iterum exiccati*] \mathfrak{z} viij.
 (*id est, \mathfrak{z} j.*) \mathfrak{z} j.

Cinnamomi

A Garyophyllorum ana \mathfrak{z} ij. β .

Melanopiperis

Zingiberis ana \mathfrak{z} ij. $\bar{\mathfrak{z}}$ v.

Galangæ

Thymbræ [*eius loco sume Satureiam*]

Calaminthæ ana \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} ij.

Ammios

Ligustici ana \mathfrak{z} j. $\bar{\mathfrak{z}}$ xviiij.

Macropiperis \mathfrak{z} j.

Spicæ Indicæ Cardamomi

Nucis Moschatæ ana \mathfrak{z} ij. β .

Sacchari.

THYMBRA est propriè Satureia silue-
 stris, circa quam nascitur Cuscuta Epithymi
 similis, quæ Epithymbrum appellatur. Affertur
 iam ad nos ex Orientalibus partibus: ve-
 rum rarò: ideòque in defectu eius satiuam
 Thymbram, hoc est, Satureiam accipere no-
 bis licet.

P. C

Ana ʒ ij. β.] *Cacutit Fuchsius, ʒ ij. ʒ ij.*
ex Pseudomyrepso suo legendum existimans.

ARRETIACIS, difficultati spirandi,
 ruficulosis, inflationibus efficaci est adiu-
 mento. Noxam ventriculi corrigit, conco-
 ctionem iuuat, adstrictionum vitia sanat.

Diacinnamomum Mesue.

R. Cinnamomi tenuis	ʒ xv.	A
Cinnamomi crassi boni		
Enula ana	ʒ iiij.	B
Galanga	ʒ vij.	
Garyophyllorum	Piperis longi	
Cardamomi maioris	Cardamomi mi-	
Zingiberis	Macis	(noris
Nucis moschatae		
Ligni Aloës ana	ʒ ij.	Croci ʒ j. *
Sacchari tabarzeth	ʒ v.	
Sacchari albißimi.		

SACCHARI tabarzeth, id est, purissimi
 atque optimi Sacchari, cuius ʒ v. miscentur
 speciebus: idq; idèd hoc loco accipitur, ut spe-
 cies cò melius conferrentur ad usum. Vltimum
 Saccharum additur, cum vis rotulas facere
 ex speciebus.

Cinnamomi tenuis, Cinnamomi crassi.] A
 Per Darseni, vel potius Darchini, lignum Chi-
 nense, cui lignum odoratum, hoc est, China-
 B 2 momum,

momum, tanquam Chinaamomum, siue Cinnamomum intelligunt Persæ atque scriptores Arabes; cortices quandoque ligna appellantes, ut Xylocinamomum Græci. Quod interim crassi corticis est, Cinnamum vocant. Per Darseni Cinami igitur, Cinnamomum crassi corticis, tanquam ligneum significare volunt: est enim & in genere crassioris Cinamomi, quod & valdè bonum est, hoc est, acre, odoratum ac aromaticum. Nec caret hac Mesuæ mens, ubi crassum Cinamomum requirit, suis rationibus: quas perpendat Francisci Alexandri Apollo oportet. Itaque Cinnamomum tenuis corticis electum, per se, aequè atque per Darseni Cinami, crassi corticis Cinamomum bonum, distinctim cum Cordo hîc interpretandum, intelligendum atque legendum existimo: utrumque tanquam in suo genere optimum. De Cinnamomo autem & Casia, García de Aromatibus librum quem dixi, consule: ubi doctissimorum etiam hætenus virorum de hisce rebus altercationes, aniles, prorsusque futiles esse animadvertes.

B Cuminum, à Cordo huic medicamento temerè impositum, hortante & id quoque Fuchsius, Monachis id prius monstrantibus, expunxi.

EST medicina salubris ad humorositatem ventriculi, & putrefactionem in eo. Phlegma digerit, & digestionem adiuuat.

Dian-

Dianthos D. Nicolai.

℞. Florum Rorismarini ʒ j.
 Violarum Rosarum
 Glycyrrhizæ ana ʒ vj.
 Garyophyllorum Spicæ Indicæ
 Nucis moschatæ
 Galangæ Cinnamomi
 Zingiberis Zedoariæ
 Macis Ligni Aloës
 Cardamomi Anisi
 Anethi [*videlicet seminis*] ana ʒ iiij.
 Sacchari.

PRODEST præter rationem tribula-
 tis, cardiacis: animi lætitiā auget. Eos
 roborat qui à longo morbo debiles adhuc
 sese recolligunt. Ventericulum perpulchrè
 emendat.

Diamargariton frigidum
D. Nicolai.

℞. Nucleorum sem. Citrulli
 Cucurbitæ Melonis Cucumeris
 Seminis Portulacæ
 Papaueris albi
 Santali albi
 Santali moschatellini [*id est, Citrini, boni*
odoris]
 Ligni Aloës Zingiberis
 B 3 Rosa.

30 CONFECTIOES

Rosarum rubrarum

Florum Nymphaeae albae [id est, Nenupharis]

Florum Boraginis

Myrtillorum verorum ana ʒ j.

Corallii albi

Corallii rubri ana ʒ β-

Margaritarum ʒ iiij.

Sacchari.

NUCLEVS seminum, est ipsa in medio seminum medulla. Sunt autem eximendi horum seminum nuclei, cum iam preparanda est confectio haec, aut alia, quae durare debent: nam diu ante exempti rancidi fiunt.

OMNEM virium imbecillitatem firmat: iis quos animus deficit, siue à corde siue à stomacho deliquium originem ducat, omnem noxae causam vitalium partium discutit. Insuper asthmaticis, tussientibus, tabidis auxiliatur. Longo morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum robur conducit.

*Di. margariton calidum**D. Auicenne.*

℞. Margaritarum non perforatarum

Pyrethri ana ʒ j. Zingiberis

A Mastiches ana ʒ iiij.

B Zedoariae Doronici

* Seminis Apii Casiae

Carda-

AROMATICAE.

31

Cardamomi	Nucis moschatæ				C
Macis	Cinnami	ana	3	ij.	*
Ben albi	Ben rubei				D
Piperis					*
Macropiperis	ana	3	ij.		
Cinnamomi		3	v.		
Iacchari.					

P. C. SCHOL.

Zedoariæ.] *Auicenna exemplaria editio-
is penultima, Zurumbet; postrema autem,
à Valgriso inquam exhibita, Zedoaria legunt,
ut hinc vocum harum & rerum vicinitatem
atque ambiguitatem (de quibus à plerisque
concertatur) tibi expendendam nunc relin-
quam.*

Doronici.] *L. Fuchsius Doronicum hic ex- B
bungit, quod tamen omnia Auicenna exem-
plaria aptissimè etiam recipiunt.*

Casia.] *Cùm Cordus huius loco rad. C
Tapsie pessimè haberet, correctiora Auicenna
exemplaria Scitaragi legunt, nonnulla Capsia,
quod non nisi Casia est. Nam ineptiores Itali
etiam Casiam addita p ante s Capsiam scribere
solent. Scitaragi autem cùm plura significata
habeat, littera unius forsitan aut carentia, aut
mutatione (utin plurimis dictionibus usu ve-
nit) quandoque Lepidium designat, quandoque
Casiam: quam hic intelligendam, commo-
dissimèque indendam dico. Quare Francisci
Alexandri Apollinis stupidam pertinaciam,
B 4 Fuchsius*

Fuchfio etiam mihi astipulante, demiror, Tapsiam hinc (medicamento huic adeo iniquam) sumendam esse mordicus defendentis. Interim non tantum quomodo C in T mutata, sed Radicis vox accedere qui potuerit, forsanelamabitur: verum Lacones habeo hinc mihi imperantes.

D Cinnami.] *Hac voce Cordus carebat aque atque Been albi. In Avicenna Cherse legitur, quod Cinnamum interpretantur.*

VALET mulieribus: rectificat enim dispositionem matricis, & ventriculorum earum.

Diamoschum dulce, D. Mesue.

℞. Croci	Doronici
Zedoariae	Ligni Aloës
Macis ana	3 ij.
* Margaritarum albarum	Serici crudi rosti
Charabæ	[id est, Succini]
* Corallii rubri ana	3 ij. β.
Galliae moschatae verae	
* Ocimi citrati ana	3 j. β.
Been albi	Been rubri
Folii [ant succedanei eius]	Spicae Indicae
Garyophyllorum ana	3 j.
Zingiberis	Cubebarum
Piperis longi ana	3 j. β.
Moschi	3 ij.
Sacchari albi.	

O c i.

OCIMUM citratum non est Melissa, sed species quadam Ocimi siue Basilici, odore Melisse aut Citrei mali: cuius defectu, garyophyllatum Ocimum sumi potest.

PRODEST contra cordis palpitacionem: ei quoque cui tumultuosa insomnia obuersantur, item iis qui incertis timoribus corripuntur. Malis cerebri frigidis, vertigini, comitialibus, & difficulter spirantibus succurrit.

Diamoschum amarum, D. Mesue.

Rz. Croci	Doronici		
Zedoariæ	Ligni Aloës		
Macis	ana	3	ij. *
Margaritarum albarum			
Serici crudi tosti	Charabæ		A
Corallii rubri	ana	3	ij. β. *
Galliæ moschataæ veræ			
Ocimi citrati	ana	3	j. β.
Been albi	Been rubri		
Folii [aut succedanei eius]			
Spicæ Indicæ			
Garyophyllorum	ana	3	j.
Zingiberis	Cubebæ		
Piperis longi	ana	3	j. β.
Moschi	3	ij.	
Absinthii			
Rosarum	ana	3	iiij. *
Aloës lotæ	3	iiij.	*
	B	5	Casto-

34 CONFECTIONES

Castorei
Ligustici ana ʒ j.
Cinnamomi ʒ ij. β.
Sacchari.

• SERICVM *crudum testum significat Serice bombycis vellus, nullo colore tinctum, nulliq; humori aut succo qui tingendo sit, intectum; sed tale quale natura est, fictilique inditum, ac donec conteri possit testum aut assatum: vulgò dicitur Sericum vstum; quamvis comburi non debeat, sed torreri aut assari tantum.*

P. C. SCHOL.

A *Setam pro Serico Cordus undiquaque barbarè legebat.*

Hæc confectio valentior est ad ea quæ suprâ dicta sunt: & propriè ad exiccandum humiditates ventriculi, & putrefactiones eius.

Diagalanga D. Mesæ.

A R. Galangæ
Ligni Aloës ana ʒ vj.
Garyphyllorum Macis
Ligustici ana ʒ ij.
Zingiberis Macropiperis
Leucopiperis Calami aromatici
Cinnamomi ana ʒ j. β.
Calaminthæ siccæ Menthæ siccæ
Carda-

Cardamomi maioris
 Spicæ Indicæ Seminis Apii
 Seminis Fœniculi Seminis Anisi
 Seminis Carui ana ʒ j.
 Sacchari albiſſimi.

P. C. SCHOL.

ʒ vj.] *Legendum eſſe ʒ vj. Fuchſius rectè
 monet, non ʒ viij ut Cordus malè habebat.*

VALET aduerſus craſſiores flatus, aci-
 dos ruſtus, prauamque concoctionem:
 item actiones ventriculi & iecoris à frigi-
 ditate impeditas, robuſtiores reddit, caſ-
 demque emendat.

Diapenidion D. Nicolai.

R. Penidiarum ʒ ij.
 Pinearum
 Amygdalorum dulcium
 Papaueris albi ana ʒ iij. ʒ j.
 Cinnamomi
 Garyophyllorum
 Zingiberis Succu Glycyrrhiæ
 Tragacanthæ Gummi Arabici
 Amyli candidiſſimi
 Seminis enucleati Gucurbitæ
 Citrulli
 Cucumeris
 Melonis ana ʒ j. ʒ ij.
 Camphoræ ʒ β.
 B 6 Sacchari

Sacchari albißimi.

AMYLVN *hodie corrupto vocabulo dicitur Amydum.*

P. C. SCHOL.

A *Deleui Amygd. amaras, quas Cordus perperam addiderat.*

V A L E T aduersus omnem thoracis noxam, tussim à frigore contractam, vocis iacturam : tabidis denique & purulenta exsercantibus succurrit.

Diatri simplex.

R. Ireos ℥ β. Sacchari candi
Specierum diatragacanthi frigidi ana ℥ ij.
Sacchari albißimi.

* P O T E S T ferè eadem quod sequens, licet imbecillius.

Diatri Salomonis, ex Nicolao.

R. Iridis ℥ j.
Pulegii Hyssopi
Glycyrrhizæ ana ℥ vj.
* Tragachanthæ
Amygdalorum Pinearum
Cinnamomi Zingiberis
Piperis ana ℥ iiij.
Caricarum Passularum enucleatarum

Car-

Carnium dactylorum ana ʒ iiij. β.
 Styracis calamitæ rubæ | *potius rufa, legis*
 p. c.] ʒ ij. ʒ j.

Sacchari albiſſimi.

Tuſſiculofis, difficulter ſpirantibus auxi-
 liatur: abſciſſæ vocis iacturam reſarcit,
 quæ refrigeratione contracta ſit.

Diatrágacanthum frigidum,
D. Nicolai.

℞. Tragacanthæ albiſſimæ ʒ ij.

Gummi Arabici ʒ j. ʒ ij.

Amyli ʒ β.

Glycyrrhizæ

Nucleorum ſeminum Cucurbitæ

Cucumeris

Citrulli

Melonis ana ʒ ij.

Camphoræ ʒ β.

Penidiarum ʒ iiij.

Sacchari albiſſimi.

Medetur omnibus pulmonum & tho-
 racis vitiis aridis, maximè tabidis, macie
 confeſtis: Inflammatione lateris laboran-
 tibus, omnibuſque tuſſibus calidis & ſic-
 cis, exaſperationi linguæ & faucium.
 Deuoratum tamdiu ægrotans in ore con-
 tineat, quòd liquefactum perfectè exu-
 gatur.

Diatragacanthum calidum
D. Nicolai.

★ R. Gummi Tragacanthæ ℥ iiij.
 Hyssopi Pinorum nucleorum
 Amygdalorum amborum purgatorum
 Seminis Lini ana ℥ vj. Sem. Fœnigræci
 Cinnamomi ana ℥ β.
 Glycyrrhizæ rasæ Succī Glycyrrhizę
 Zingiberis ana ℥ ij.
 Sacchari albi.

Valet tussientibus ex frigido phlegmate, & non valentibus eiicere; asthmaticis, empyicis, anhelosis, suspiriosis, peripneumonicis, phthisicis, & ad omnem coarctationem pectoris: stomachum confortat, digestionem procurat.

Manus Christi perlata.

R. Sacchari clarificati ℥ j.
 Aquæ Rosarum ℥ β.

Concoquantur dum aqua rosacea igni evanescat, & saccharum iustam crassitiem consequatur. In fine margaritarum minutissime tritarum ℥ β. addatur, atque super marmor aqua rosacea inspersum infundatur, & fiant rotulæ.

P. C. SCHOL.

Quantis cachinnis Cordus, & tanquam
caci

ecaci caco duce Fuchf. Colonienſes medici, ac Franciſci Alex. Apollo, vel pueris Pharmacopœorum, hæc ſcriptio ſeſe deridendos exhibuerint, vix exprimi poſſit: ut hinc non tractari à fabris fabrilia, lucidè cerni queat. Eo pacto quòd huiusmodi imaginariis, extraq̃ arenam Medicorum quorundam ſcriptionibus, nullam debitam miſcendi conſciendiq̃ rationem, ut neque modum; & ex conſequenti parum aut nihil artis ſue frugis, operisq̃ manuarii commodi, haurire diſcerè ve poſſint Pharmacopœi: nō margaritas oleum & operam omnem frequentiffimè perdere, ac vitiatas materias porcis obicere velint.

M E D E T V R deiectis viribus, ardentibus febris; & imaginationes falſas abolet.

Diabyſſopum D. Nicolai.

℞. Hyſſopi Ireos Thymi
 Melanopiperis ana ʒ xxx.
 Pulegii
 Thymbræ [*eius loco ſume Saturciam*]
 Rutæ Cumini ana ʒ xx.
 Carnium daſtylorum
 Tragacanthæ Glycyrrhizę
 Caricarum pinguium Paſſularum enu-
 cleatarum
 Fœniculi ana ʒ x.
 Zingiberis Sem. Aniſi
 Carui

Carui

Ligustici ana ʒ v.

Sacchari.

Accommodatum est ad capitis querelam ex frigido: vnam exiccat, arterias purgat, tussim compescit, omnes frigiditates pectoris & stomachi emendat; digestionem procurat; pleuriticis & empyicis mirabiliter opitulatur.

Diacostum D. Mesue.

℞. Costi candidi, aromatici, amari

Cassie lignee veræ Cinnamomi ana ʒ v.

Seminis Apii Seminis Anisi

Schoenanthi

Rhabarbari ana ʒ iij.

Asari ʒ iiij.

Croci Aristolochie

Myrrhæ ana ʒ ij.

Sacchari.

SCHOENANTHI. Hodie corrupto nomine dicunt Squinanthum.

COSTI AMARI. Cœpit hisce annis afferri loco veri Costi adulterinus quidam: qui nequaquam accipiendus est, ut supra dictum est, sed candidus, amarus & aromaticus.

ASARI, id est, radicum eius. sola enim radices ad medicinam accipi debent.

VALET ad dolorē viscerum & oppilationem in eis, & ad principium hydropisis.

Dia-

Diarhodon Abbatis,
ex Nicolao.

℞. Santali albi
Santali rubri ana ʒ ij. β.
Tragacanthæ
Gummi Arabici
Spodii ana ʒ ij.
Asari Mastiches
Spicæ Indicæ Cardamomi
Succi Glycyrrhizæ Croci
Xyloaloës [*id est, Ligni Aloës*]
Garyophyllorum
Galliæ moschatæ Nicolai *
Anisi Fœniculi
Cinnamomi Rhabarbari
Seminis Ocimi
Berberis [*id est, acinorum eius*] A
Seminis Scariolæ Seminis Portulacæ B
Nucleorum seminis Cucurbitæ
Citrulli Cucumeris Melonis
Seminis Papaueris albi ana ʒ j.
Margaritarum
Ossis è corde cerui ana ʒ β.
Sacchari Candi [*ut èd melius species conser-*
uentur]
Rosarum ana ʒ j. ʒ iiij.
Camphoræ ʒ vij.
Moschi ʒ iiij. β.
Sacchari albißimi.

SCA-

B SCARIOLA propriè est Endivia illa vulgaris, quæ in dorso foliorum est spinosa. Quid autem vera sit Endivia, ubi locus postulaverit, dicemus.

P. C. SCHOL.

A Berberis.] acini sunt hic fructus Berberis integri.

B Scariola.] Cordum non novisse Scariolam, hoc nomine vulgarem admodum plantam, monente & id Francisco Alex. satis liquet; ex eo quod in Foliorum dorso eam spinosam faciat, ut Sonchum præ oculis habuisse videatur.

VALET aduersus ventriculi calorem, iecinoris, lienis, pulmonumque: contra viscerum dolores, & omnem totius corporis noxam à calore proficiscentem.

Dialacca maior, D. Mesuæ.

R. Lacce præparatæ [eius præparatis in fine habebitur]

Rhabarbari ana ʒ iiij.

Spicæ Indicæ

Mastiches Apii

Coliculorum Schœnanthi Absinthii

Succi Eupatorii Mesuæ

Ammios Sabinae

Amygdalorum amarorum

Costi Myrrhæ

Rabiae tinctorum Fœniculi

Anisi

Anisi

Asari

Aristolochiæ rotundæ veræ

A

Sentiænæ

Croci

Cinnamomi

Hyssopti

Cassie lignæ veræ Summitatū Schœnanthi

Idellii ana ʒ j. ʒ.

Piperis

Zingiberis ana ʒ j.

Sacchari albiſſimi.

COLICVLO RV M Schœnanthi.] Herba

aromatica à Græcis dicitur Σχοίνον, id est, Schœnus, & significat luncum aromaticum, qui hactenus improprie dictus est Squinanthum. Nam Schœnanthum siue Σχοίνον ἀνθόν, significat lunci huius aromatici florem, qui non affertur ad nos. In hanc autem compositionem ingreditur bis Schœnanthum; hoc quidem loco soliculi aut stipites eius, inferius verò summitates eiusdem.

SVMMITATVM Schœnanthi, id est, florum eius: nam flores in summitate huius herba constituti sunt, & proprie Schœnanthum appellantur: sed quia flores non ad nos feruntur, cogimur tenerrimas eius partes in cacumine decerptas, eorum vice medicamentis miscere.

SVCCI Eupatorii.] Hic succus non debet fieri ex vulgari Eupatorio, neque ex Eupatorio Græcorum, id est; Agrimonia falsò hodie vocata, sed ex Eupatorio quod Mesue describit. Est autem Eupatorium Mesue ea herba,

qua

qua ab Italia dicitur Gratia Dei, siue Gratiola; cuius magnus est prouentus Wittemberga in pratis ad Albim fluvium sitis.

P. C. SCHOL.

A Aristolochiam longam, erroneè in contextum à Cordo intrusam, deleni.

B Succus Eupatorii.] Gratiola vocata, purgatoria herba, foliis Hyssopi, Eupatorium Mesuae haud dubio, ut & L. Fuchsius, Matthiolus, ac Franciscus Alex. rectè monent, esse non potest. Satius igitur erit, Ageratum Dioscoridis, quod & hodie Eupatorii Mesuae nomen obtinuit, in eius locum substituere, donec melius doceatur.

VALET aduersus frigus ventriculi: obstructions. inflationes iecinoris, & renum duritias sanat. aquæ inter cutem causas omnes discutit. menses ciet: flatuosos spiritus ab alto corpore abigit.

Diacurcuma, id est, Διά Κεῖρα
maior, D. Mesuae.

R. Croci	Asari
Petroselini Macedonici	
Dauci	Anisi
Apii ana 3	iiij.
Rhabarbari	Meu
Spicæ Indicæ ana 3	vj.
Costi	Myrrhæ
	Cassia

Cassiæ lignæ veræ Schœnanthi
 Carpobalsami [*aut aliquod succedaneum, ut
 superius significatum est*]
 Rubiæ tinctorum
 Succii Absinthii
 Succii Eupatorii Mesuæ [*i. Gratiola*]
 Opobalsami [*aut aliquod succedaneum, siue
 oleum Garyophyllorum, aut aliud crassum
 odoriferum oleum*] ana ʒ ij.
 Calami aromatici
 Cinnamomi ana ʒ j. β.
 Scordii [*videlicet veri*]
 Scolopendriæ [*Ceterach intellige*]
 Succii Glycyrrhizæ ana ʒ ij. β.
 Tragacanthæ ʒ j.
 Sacchari albissimi.

Confert ad ægritudines antiquas, & ca-
 chexiam : & ad hydropisim iuuamentum
 est manifestum, & eradicat ægritudines
 hepatis & lienis chronicas, quæ iam in-
 duratæ sunt : & confert ad corruptio-
 nem stomachi, & humiditatem frigi-
 dam, & ventositates grossas in eis, &
 ad dolorem renum & vesicæ, & vrinam
 prouocat.

Diaprasium D. Nicolai.

ꝑ. Prassii ʒ v. β.
 Tragacanthæ Pinearum mundatarum
 Amygdalorum dulcium
 Pista.

Pistaciorum Carnium dactylorum
 Caricarum pinguium
 Passularum enucleatarum ana ʒ ii. β.
 Cinnamomi
 Garyophyllorum
 Nucis Moschatae
 Macis Ligni Aloës
 Galangae Spicae Indicae
 Zingiberis Zedoariae
 Glycyrrhizae Rhapontici
 Anacardii Styracis calamitae
 Galbani Terebinthinae
 Mastiches Myrrhe
 Ireos Aristolochiae rotundae
 Corticum radicum Capparis
 Gentianae Melanopiperis
 Anisi Foeniculi
 Anethi Apii
 Petroselini Macedonici
 Saxifragiae ana ʒ ij.
 Hermodactylorum
 Origani Peucedani
 Schoenanthi Cardamomi
 Leucopiperis
 Carui Ligustici
 * Vincetoxici ana ʒ j. β. ʒ j. s.
 Balsamitae Pulegii
 Dictamni Cretici
 Costi Pyrethri
 Thymbre Basiliconis
 Paeoniae [*videlicet radicis eius aut seminis*]
 Macro

Macropiperis Amomi Sinoni
 Trobi veri ana ʒ j. ʒ ij. ʒ.
 Xylobalsami [*aut succedaneum aliquod si-
 mile descriptioni Xylobalsami*]
 Casia fistulae
 Corallii rubri Rasura Eboris
 Carpobalsami [*aut aliquod succedaneum, ut
 supra*]
 Dauci Cretici ana ʒ ʒ.
 Moschi Ambræ
 Offis e corde cerui ana ʒ xiiij.
 Sacchari albiissimi.

SAXIFRAGIA in Italia dicitur ea her-
 ba, quam in Germania Pimpinellam vocamus.
 Itali habent diuersam Pimpinellam.

BALSAMITÆ.] Nicolaus Alexandri- A
 nus Latine impressus, non Balsamitam ha-
 bet, sed Balsamum: significat tamen Balsami
 vox, nonnunquam etiam Mentham; cuius spe-
 cies est Balsamita, hoc loco recipienda: nam si
 Balsami liquorem intellexisset Nicolaus, non
 simpliciter Balsamum, sed Opobalsamum po-
 suisset.

SINONVM, secundum Matthæum
 Sylvaticum, est Petroselinum agreste. Sed de
 eo infra in annotationibus Aurea Alexan-
 drina.

CASIAE fistula nomine hoc loco nequa-
 quam debet intelligi Casia fistula, cuius nigra
 medulla bilem per aluum purgat; sed Casia li-
 gnea aromatica, quæ Cinnamomo similis est:

nam

*nam hæc etiam apud probatos veteres auctores
Casia fistula vocatur.*

- B DAUCVS Creticus hodie ignotus est:
*ideò possumus eius loco Sefeli Creticum accipe-
re, id est, Berwurtz, aromaticam herbam,
foliis Fœniculi, sed multò minoribz.*

P. C. SCHOL.

- A Balsamita.] *Cùm Nicolai codex, ut &
Cordus fatetur, Balsami legat; eo non herba
Balsamita vocata, neque cum Fuchzio Bal-
sami veri folia, sed oleum seu succus veri Bal-
sami, Opobalsamumve hîc intelligendum esse
existimo.*

- B Daucus Creticus.] *Berwurtz Germanis
vocata herba, seu Fœniculus porcinus Belgis,
non est Sefeli Creticum, ut neque Daucus
Creticus, sed potius Meum Diosc. aut illi
proximum. Daucus autem Creticus verus,
Diosc. delineationi ad amissim conueniens,
semine acris, albo, hirsuto, oblongo, nu-
perrimè cognosci cœpit: virèque in hortu-
lo hodie, inter plurimas raras plantas, no-
stro.*

*Sanat capitis vertigines, oculorum ca-
ligines abstergit, palatum & arterias pur-
gat, distillationem vix astringit, dentium
dolorè mitigat. Asthmaticis & suspiriosis
peculiariter opitulatur, pectoris & pulmo-
nis causas facilè amputat. Stomachi & he-
patis dolores & debilitates sedat, splene-
tico*

corum & pleuriticorum angustias para-
 orisat: omnium interaneorum vitiis pro-
 est: inflationes & torsiones ab eis aufert.
 ephriticos, calculosos, stranguriosos &
 colicos purgat, & dolorem releuat. Sæpiùs
 item sumptum, colorem pallidum emen-
 at, menses deducit, & in ordinem debi-
 um redigit. Typos quotidianarios &
 quartanarios reprimat. Qui autem hoc ele-
 uario vsus fuerit, à multis conseruabitur
 morbis.

Diatrion santalon D. Nicolai.

2. Santali albi	Santali rubri
Santali citrini	Rosarum
Sacchari	ana 3 iij.
Chabarbari	Spodii
Succi Glycyrrhizæ	
Seminis Portulacæ	ana 3 ij. 3 β. 3 v.
Amyli	Gummi Arabici
Fragacanthæ	
Nucleorum seminis Melonis	
Cucumeris Cucurbitæ	Citrulli
Seminis Scariolæ	ana 3 j. β.
Camphoræ	3 j.
Sacchari albissimi.	

SCARIOLA est *Endiuia vulgaris*, cuius
 folia in dorso habent spinulas, ut dictum est
 supra in *Diarhodon Abbatis*.

Pollet aduersus iecinoris & ventriculi
 C calo-

calorem mirum in modum : tabidis & re-
gio morbo correptis itidem prodest.

Diaxyloaloës D. Mesuæ.

℞. Ligni Aloës crudi

Rosarum ana ʒ j.

Garyophyllorum Spicæ Indicæ

Macis Nucis moschatæ

Galliæ moschatæ Mesuæ Cubebarum

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris

• Mastiches

Cinnamomi

Cyperi Schœnanthi

Zedoariæ Been albi

Been rubri

Folii [*aut Macis sive Spica Nardi*]

Serici crudi Margaritarum

Corallii rubri Charabæ

Foliorum Citrei mali

Corticum Citrei mali

Ocimi garyophyllati

Sisymbrii Menthæ siccæ

Sampfuchi [*id est, Maiorana*]

Piperis longi

Zingiberis ana ʒ iiij.

Moschi boni ʒ i.

Ambre ʒ j. ʒ.

Sacchari albissimi.

CYPERI, videlicet Cyperi rotundi: nam
rotunda

AROMATICAE. 32

rotunda radices Cyperi propriè & simpliciter
ab auctoribus Cyperi vocantur. Longis verò
radicibus Cyperus, vocatur ab iisdem Cyperis.
Quoniam verò non semper rotundum habere
licet, necesse est in penuria eius, longo vii.

SISYMBRIUM est mentha aquatica,
nigricantibus, ut purpura, caulibus.

PRODEST malis ventriculi, cordis &
iecinoris frigidis, animæ defecticni, con-
coctioni que. Oris fœtorem abigit, lati-
tiam que parit.

Diatrion pipereon Mesue.

℞. Macropiperis Melanopiperis
Leucopiperis ana ʒ v.
Zingiberis Thymi
Anisi ana ʒ ij.
Spicæ Indicæ Ammios
Amomi [quod non habetur, & loco eius ca-
piatur Carpesium sine Cubeba, aut Calam-
mus aromaticus officinarum, qui pro vero
Acoro habetur]

Cinnamomi ana ʒ j.
Casie lignæ Seminis Apii
Seselios

Asari
Enulæ siccæ ana ʒ ʒ
Sacchari albißimi.

Refrigerato ventriculo, & acido ructui,
quartanis, exolutis, iecinorosis, & inflatio-
nibus auxiliatur. Item rufficentibus.

C 2

Dia-

Diazingiber D. Nicolai.

℞. Zingiberis Galangæ
 Garyophyllorum Cinnamomi
 Nucis moschatę Granorum paradisi
 Piperis longi Macis
 Cardamomi Spicę Indicę
 Rhabarbari Rosarum rubrarum ana ʒ xv.
 Pinearum mundatarum ʒ β.
 Phisticorum [*id est, Pistaciorum*] ʒ ij.
 Anisi Fœniculi
 Glycyrrhizę rasę Croci ana ʒ β.
 Sacchari albissimi.

* Ventriculum roborat & firmat.

Electuarium Ducis, D. Nicolai.

℞. Anisi ʒ ij. ʒ xv.
 Glycyrrhizę
 Mastiches ana ʒ ij. ʒ v.
 Cinnamomi
 Chamædryos Zingiberis
 Galangæ Fœniculi
 Carui ana ʒ j. ʒ xv.
 Xylocastię Calaminthę
 Dauci Pyrethri
 Piperi albi Piperis longi
 Cyperi [*scilicet rotundi*]
 Schœnanthi Ireos

Amo-

Amomi [*aut succedaneum eius*]Folii [*aut succedaneum eius*]

Asari ana ʒ j.

Spicæ Indicæ Croci

Gummi Arabici Tragacanthæ

Seminis Anethi Calami aromatici

Cubebæ Garyophyllorum

Carpobalsami

Ligustici Seminis Olusatris

Baccarum Juniperi Seselios

Pentaphylli [*videlicet radicum eius*]

Seminis Asparagi

Seminis Citri

Acori [*aut loco eius Galanga*]

Ammios Rhabarbari

Nucis myristicæ [*id est, Nucis Moschata*]

Ligni Aloës

Basilici garyophyllati

Milii solis

Seminis Saxifragiæ

Nucleorum seminis Citrulli

Cucumeris

Melonis Cucurbitæ

Seminis Scariolæ

Petroselini

Been albi Been rubri

Styracis calamitæ

Cardamomi ana ʒ β. ʒ v.

Penidiarum ʒ iiij. ʒ ij. β.

Sacchari albissimi.

CHAMAEDRYOS, *videlicet vera, quæ*

C 3

folia

54 CONFECTIOES

folia habet similia quercus. nascitur in montibus Iena, & inter Herspruck atque Ambergam.

OLVSATRI semen, est magnum semen, quod in omnibus Pharmacopoliis dicitur Macedonicum siue Petroselinum Macedonicum.

Valet ad indigestionem & ventositatem Stomachi & intestinorum, & ilei dolorem & lapidis.

Electuarium de Gemmis D. Mesua.

℞. Margaritarum albarum 3 iij.
Sapphiri Hyacinthi
Sardæ Granatorum
Smaragdi ana 3 j. ꝑ.
Zedoariæ Doronici
Corticum Citreimali Macis
Seminis Ocymigaryophyllati ana 3 ij.
Corallii rubri Charabæ
Rasuræ Eboris ana 3 ij.
Been albi Been rubri
Garyophyllorum
Zingiberis Piperis longi
Spicæ Indicæ
Folii [*aut succedanei eius*]
Crocī
* Cardamomi ana 3 j.
Trochiscorum Diarhodon
Ligni Aloës ana 3 v.
Cinnamomi Galangæ

Zurum-

AROMATICAE.

55

Zurumbeth ana 3 j. β.

Foliorum Auri

Foliorum Argenti ana 3 ij.

Ambræ 3 ij. Moschi 3 β.

Sacchari albißimi.

SAPPHIRVS & Smaragdus, qui passim in Myropoliis habentur, nihil valent; cum flammam edant in igne, & ex argenti fodinis colligantur: quare omittendi sunt; aut loco eorum, de Hyacintho & Granato maius pondus sumatur.

SARDA est gemma qua neotericis Carpo-la vocatur; quod diligenter est notandum. Hactenus enim qualis esset gemma Sarda, ignorauimus omnes.

ZURUMBETH est species Zedoaria, qua radicem habet rotundam & globosam, & affertur cum Zedoaria longa.

P. C. SCHOL.

Zurumbeth est spec.] Inter tres Zedoaria species qua Antuerpiam aduehuntur radiculis oblongis, quartum quid optimo Zedoario potissimum immixtum reperitur, rotundis globulis, & ea propter Truncosa Zedoaria à Materialistis nostris vocitata: hac utentur Zurumbeth loco Pharmacopœi, & Garciam ab Horto De Aromatibus Indicis hisce de rebus consulant, plura noscere qui voluerint.

Malis cordis, ventriculi, cerebri, iecino-

C 4

cinoris,

cinoris, & vteri frigidis auxiliatur. Item
palpitationi cordis, defectioni animæ, ac
concoctioni: tristitiam denique citra cau-
sam ortam amouet.

Electuarium Iustinum D. Nicolai.

R. Cinnamomi

Folii [*aut succedanei eius*] Costi

Nardi [*id est, Spica Indica*]

Cassia lignea Aristolochia longa

Aristolochie rotunda Enula campana

Hysopi Pulegii Artemisia

Pentaphylli [*videlicet radicis eius*]

Leucopiperis Orobi veri

Petroselini Ligustici

Olusatris [*i. Petroselini Macedonici vocati*]

Seminis Vrticæ

Milii Solis

Saxifragia seminis [*sumatur eius loco se-
men Pimpinella nostra, Germanorum vi-
delicet, non Sanguisorba vocata.*

Baccarum Iuniperi Seminis Asparagi

Sileris montani

Seminis Apii Seminis Anethi

Seminis Rutæ Seminis Citrei mali

Seminis Fœniculi Seminis Anisi

Baccarum Lauri ana 3 j. β.

Sacchari albissimi.

Valet ad dolorē renum: calculos frangit,
& arenas expellit, ac stranguriam dissoluit.

Conse-

Confectio Liberans [scilicet à peste.]

℞. Radicum Tormentillæ

Seminis Acetosæ

Endiuiæ

Coriandri præparati

Citrei mali ana ʒ j. β.

Santalorum omnium

Dictamni albi ana ʒ j.

Boli Armeni præparati

Terræ sigillatæ [loco eius Bolus Leuanticus, id
est, Orientalis, sumatur] ana ʒ iiij.

Margaritarum Corallii albi

Corallii rubri Charabæ

Rasuræ Eboris

Spodii [id est, Eboris vlsi, de quo in fine]

Ossis è corde cerui

Been albi Been rubri

Doronici Cardamomi

Cinnamomi Macis

Ligni Aloës

Cassia lignea [aut succedanei eius]

Croci Zedoariæ ana ʒ β.

Smaragdi [loco eius Hyacinthi aut Granati]

Hyacinthi Granati

Serici crudi incisi & torrefacti ana ʒ j.

Penidii

Sacchari Candi ana ʒ ij.

Florum Nenupharis [id est, Nymphae]

Buglossæ

℥ 5

Rosæ

58 CONFECTIOES

Rosarum . ana ꝑ j.

Camphoræ ġ vij.

Moschi

Ambra ana ġ iiij.

Sacchari albiſſimi.

Contra peſtem plurimum valet: tutatur corpus ne lædatur à peſtifero aëre, & præſeruat humores à corruptione.

Confectio Cordialis, Alex. Benedicti.

℞. Margaritarum

Spodii [*id eſt, Eboris uſti*]

Granatorum verorum

Cinnamomi Tormentillæ

Boli Armeni ana ꝓ iiij.

Santalorum omnium Raſuræ Eboris

Vnicornu ana ꝓ ij. Hyacinthorum

Sapphiri [*loco eius maius pondus Hyacinthi*]

Corallii albi Corallii rubri

Charabæ albæ [*al. Succini*]

Valerianæ veræ

Diſtamni Zedoariæ

Ligni Aloës ana ꝓ j.

Terræ ſigillatæ [*aut Boli Levantici, hoc eſt, Orientalis*] ꝓ j. ꝑ ij.

Serici crudi modicum torrefacti ꝑ ij.

Oſſium è corde cerui ꝑ j. ſ.

Been albi

Been rubri ana ꝑ iiij.

Foliorum auri opt. numero v.

Moschi

Moschi

Ambræ ana ḡ x.

Sacchari albissimi.

P R Æ S E R V A T cor à peste.

*Electuarium Latitie, Galeni;
ex Nicolao.*

℞. Florum Ocimi garyophyllati

Crocī Zedoarię

Xylobalсами [*pro quo Lignum Aloës, cum in
istâ descriptione non habeatur*]

Garyophyllorum Corticum Citrei mali

Galangæ Macis

Nucis moschatæ

Styracis calamitæ ana ʒ ij. β.

Anisi Rasuræ Eboris

Thymi Epithymi ana ʒ j.

Camphoræ Moschi Ambrę

Margaritarum perforatarum

Ossium de corde cerui ana ʒ β.

Auri foliati meri [*id est, purissimi*]

Argenti foliati meri ana ʒ β.

Sacchari albissimi

Fiat confectio solida.

Si verò volueris facere in forma liqui-
da sine opiatæ, tunc adde

Succi Cydoniorum

Pomorum odoratorum dulcium

Boraginis

C 6

Vini

Vini veteris optimi, ana partes æquales: in tanta mensura, quanta despumando & decoquendo saccharo satis fuerit: nulla enim aqua saccharum dissolui aut decoquere ad spissitudinem debet in hac confectioe.

LÆTITIAM colorisq̃ue bonitatem efficit: concoctionem iuuat, & canitiem retardat.

Electuarium Latificans Rhasis.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| ℞. Melissæ | Corticum Citrei mali |
| Garyophyllorū | Galliæ moschatae Mesuæ |
| Mastiches | Croci |
| Cinnamomi | Nucis moschatae |
| • Cardamomi | (cipi) |
| Neremisch | [pro quo potest semen Pæonia ac- |
| Been albi | Been rubri |
| Zedoarie | Doronici |
| Seminis Ocimi | |
| ★ Seminis Ocimi garyophyllati | ana ʒ β. |
| ★ Moschi | ḡ xxiiij. |
- Sacchari albissimi. Fiat confectio in tabulis.

Si verò volueris facere in liquida forma, ut decet, tunc prædictas species sequenti Syropo misce, & fac in modum opiatę:

- ★ ℞. Myrobalanorum Chebularum nu. xx.
- ★ Emblicarum numero xxx.
- ★ Aquæ P iiij. aut quantum sufficit. Coquatur tritę myrobalani in prædicta aqua, donec

donec remaneat tertia pars ; deinde cola.
Colaturæ adde mellis despumati l'j. loco
prædicti sacchari: bulliat postea vsque ad
iustam spissitudinem ; & insperge species
prædictas , postquam feruor Syrupi re-
missior factus fuerit.

NEREMISCH apud Rhasis est Rosa asi-
nina. Auerrois autem interpres dicit Paoniam
esse Rosam asinorum. Ergo, secundum hunc Ne-
remisch idem esset quod Paonia : nisi Rhasis de
utraque, id est, de Neremisch & de Paonia, duo
propria faceret capitula, tanquam de rebus di-
uersis. Cerid igitur statuere non possumus, quid
sit Neremisch.

Confortat omnia membra principalia,
ex quibus virtutes manant naturales &
animales : iuuat calorem naturalem , &
spiritum viuificat: compescit malas cogi-
tationes : & bonos mores , lætitiâque
& gaudium gignit.

*Electuarium Plurifarcoticum, seu potius
Pleres archonticum, D. Nicolai.*

R. Cinnamomi Garyophyllorum

Ligni Aloës Galangæ

Spicæ Indicæ Nucis moschatae

Zingiberis Spodii

Schœnanthi

Cyperii Rosarum

Violarum ana 3 j. ʒ xv.

C 7 Folii

62 CONFECTIOES

Folii [loco ipsius, Macis sumatur]

Glycyrrhizæ Mastiches

Styracis calamitæ

Sampsuchi [id est, Maiorana]

Balsamitæ Ocimi

Cardamomi Macropiperis

Leucopiperis

Myrtillorum

* Corticis Citrei mali ana ʒ ij. ʒ v.

Margaritarum splendidarum

Been albi Been rubri

Corallii rubri

Serici tostæ ana ʒ j. ʒ ij. ʒ.

Moschi ʒ vij. ʒ.

Camphoræ ʒ v.

Sacchari albissimi.

Tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquio animi à corde proficiscenti succurrit. Memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus & asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert.

Lithontribon D. Nicolai.

R. Spicæ Indicæ Zingiberis

Xylobalsami [aut Ligni Aloës, ut supra]

Acori [siue Calami aromatici hodie vocati]

Cinnamomi

Peucedani [videlicet radicis eius]

Meu [loco eius accipe Sefeli Cratici radicem, id est, Beruvuriz, Germanis vocatam]

Mela-

63

Garyophyllum

Glycyrrhizæ Cyperi

Seminis Olusatrì [est semex quod Macedo-
nicum vulgò perperam vocant]

Asparagi Ocimi Vrticæ

Folii [*aut succedanei eius*]

Ligneę Casię [aut succedanei eius]

Ircos Amomi

Petrofelini Macedonici Sefelios

Cardamomi

Lapidis Lyncis Olei Nardini

Sacchari albiſſimi.

Olei

Olei Moschelini præparatio infrà habebitur.

P. C. SCHOL.

A Meu] Sefeli Creticum Cordo vocatum, quod Beruvurtz Germani, Fœniculum porcinum Belge appellant, esse ipsissimum Meu seu Meum Diosc. omnino persuasum habeo. Nec radicem eius tantam, tamve crassam esse, (natalibus præsertim locis natam,) neque tam graviter olere, veluti Matthiolus metuit, ut neque tenuitatis nec odoris à Dioscor. descriptos limites ita transire putem, quin genuinum Meum esse queat: Crassitudo cum crassitudine comparanda cum sit, simul atque suaviter olere, & simpliciter odoratum esse, aliquantulum cum etiam differant. Eo modo, ut qua de Meo Asturia ac Sistra Monachi observarunt & scribunt; ego, ut pote mihi quoque comperta, approbem, illisq; manus dem. Proinde si quispiã adhuc nihilominus refragari voluerit, pro Meo vero tamen eo tantisper veniatur Pharmacopœi, deserto illo quo hætenus vsi sunt nostrates; dum ipsa Diosc. Genius nobis aliud proferat. Ceterum imprudenter admodum Matthiolum carpit Fuchsius, quòd ille unà cum Monachis, hanc herbam Apulis Imperatoriam nominari inquit, quam Angelicam esse (sic à Germanis appellatam) malè interpretatur Fuchsius: cum Imperatoria nomine ab isthoc Meo admodum diutè à Germanis demonstrantur planta.

Præ-

AROMATICAE. 65

Præclarum ad indigestionem stomachi
& frigiditate. Illicum lumborumque do-
lores compescit, lapides in renibus &
vesica potenter confringit, & inde mira-
biliter expellit. Stranguriam & dysuriam
vestigio soluit.

Rosata Novella D. Nicolai.

2. Rosarum	Sacchari
Glycyrrhizæ	ana ʒ j. ʒ j. ʒ ij. β.
Cinnamomi	ʒ ij. ʒ ij. minus ʒ ij. *
Caryophyllorum	
Nardi [<i>id est, Spica Indica</i>]	
Zingiberis	Galangæ
Nucis moschatæ	Zedoariæ
Styracis calamitæ	Cardamomi
Seminis Apii	ana ʒ j. ʒ vj. *
Sacchari albissimi.	

CONFERT apprimè calori & siccitati
stomachi, cordis, hepatis & pulmonis.
Sitim compescit & vomitum, abscindit
debilitatem stomachi, adstringit laxa.
Cardiacis subuenit, sudorem diaphoretici-
cum reprimit, ex chronica infirmitate de-
biles recreat.

Electuarium Diapæonias.

℞. Radicis Pæoniæ	ʒ j.
Macis	Spicæ Indicæ
Croci	Coralliorum rubrorum
	Mar-

66 CONFECTIO NES

Margaritarum non perforatarum

Mastiches ana ʒ β.

Myrtillorum verorum ʒ j. β.

Cinnamomi

Nucis moschatæ

Garyophyllorum

Folii [*loco eius Cassie lignæ veræ*]

Zingiberis Piperis longi

Cardamomi

Granorum paradisi ana ʒ ij.

Glycyrrhizæ ʒ v.

Anacardi ʒ j. β.

Moschi Ambrae ana ḡ vj.

Sacchari albißimi.

Fiat confectio in tabulis in æstate.

In hieme verò adde speciebus triplū mel-
lis despumati, & conficiatur electuarium.

CONFERT epilepsiæ, & vertigini.

*Electuarium Resumptiuum**D. Nicolai.*

℞. Rosarum Glycyrrhizæ

Sacchari ana ʒ ij. ḡ v.

Gummi Arabici

★ Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.

Santali albi

Santali rubri ana ʒ j. β. Papaueris albi

Succi Glycyrrhizæ Amyli

Seminis Portulacæ

Lactucæ Scariolæ ana ʒ iij.

Garyo.

Caryophyllorum
 Cardii [*pro eo, Eberis vsti*]
 Cinnamomi ana ʒ j.
 Zingiberis
 Myracis calamitæ ana ʒ ij.
 Croci ʒ v.
 Menidiarum ʒ β.
 Nuculeorum seminis Cucurbitæ
 Citrulli Cucumeris Melonis ana ʒ ij.
 Seminis Cydoniorum ʒ ij.
 Amygdalorū dulcium Pinorū nucleorū
 Berberis Seminis Maluæ
 Seminis Coti siue Bombacis
 Seminis Violarum Nymphææ
 Cerebesten ana ʒ ij.
 Cum Syrupi Violati quantitate sufficien-
 ti fiat Electuarium.

RESTAURAT humiditatem radica-
 lem: lenit, humectat, nutrit, & confor-
 tat. Aperit poros, obsistit cholerae: sedat
 febre, tussim & sitim. Restituit integras
 vires, & pristinam sanitatem, extenuatis,
 consumptis & hecticis.

*Diacorum D. Mesue, in sua praxi, **
cap. 1. de affectibus nervorum.

ꝑ. Radicum Secacul Acori
 Pinearum ana ꝑ j. β.
 Radices Secacul mundatę & incisę co-
 quantur in aqua clara, donec aqua consu-
 matur:

matur : postea optimè pistentur, & in minutissimas partes conterantur, donec pulvi similes fiant. Dein adfunde eis melli odorati & optimè despumati l' x. coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secacul imbibebunt, in vaporem resoluta sit; diligenter agitando, ne ad vassum adurantur radices. Cùm autē iust spissitudinis consistentiam acquisuerit, a igne deponito, & adde radices Acori tenuissimè tritas, & Pineas minutissimè incisas, cū subsequētī puluere optimè mistas
℞. Piperis ʒ j. Piperis longi
Garyophyllorum Zingiberis

A Macis ana ʒ iiij.
Nucis moschatae Galangæ
Cardamomi ana ʒ iiij.

Omnia ista simul cum melle & radicibus Secacul misceto & vnito; diligenter agitando, ne grumi aliqui relinquantur.

B SECACVL verum est Siser, quod Germani vocant Gritzelmoren, & Klingelmoren, Galli Escheruis & Seruiles, Banari Nudle, Sueui Geyrle.

ACORVS, id est, vulgò vocatur Calamus aromaticus. Mesue iubet etiam Acori radices elixari. Sed quia nos recentes & virides non habemus, ut ii qui in calidis regionibus habitant, ideo melius est eas tritas melli admiscere.

P. C. SCHOL.

A Rosas è contextu, à Cordo perperam impostas,

, *Fuchsio quoque & id volente, sustuli.*

Secacul verum.] Secacul non est Sifer, ut B
rdus existimat: sed, veluti Frācisco Alexand.
oque placet, esse posset ea planta quam Crith-
m spinosum, seu Pastinacam marinam vo-
it Monspelussani: unde mihi in horto meo à
athia Lobelio doctore Medico semine trans-
isso, nunc viret. Genuinum interim si id non
erit, in eius locum tamen commodè substitui
set, respondentibus facultatibus: dum Arabs
ispiam ipsissimum nobis monstrauerit.

Confert mirum in modum ægritudini-
us neruorum: acuit omnes sensus & in-
enium, sedat dolores capitis; est pecu-
are remedium frigidarum ægritudinum
num, & maximè catarrhi.

Pulvis ad Epithemata cordis.

. Santali rubri ℥ j.
orticum Citrei mali Santali albi
osarum Corallii albi
orallii rubri Charabæ
podii [accipe Eboris vsti], ana ℥ β.
ossis cordis ceruini
Croci ana ℥ j.
pecierum Lætitia Galeni
pecierum electuarii de Gemmis
pecierum Diamargariton ana ℥ iiij.
Camphoræ ℥ j.

In puluerem redactæ species commi-
ccantur.

Pulvis

Pulvis ad Epithemata hepatis.

℞. Rosarum Santali albi Santali rubi
 Absinthii Schœnanthi
 Spodii [*pro eo, Eboris vsti*]
 Spicæ Indicæ ana ʒ β.
 Contrita in pulverem misce, & repone.

CONFECT IONES

OPIATÆ.

Diaolibanum D. Nicolai.

℞. Castorei Opii
 Hyoscyami albi ana ʒ iiij.
 * Cassiæ lignæ ʒ ij. ʒ ij.
 Folii [*aut succedanei eorum*]
 Croci
 Turis masculi ana ʒ ij.
 Rhapontici
 Amomi [*pro quo Carpesium*] ana ʒ j. ʒ ij.
 Myrrhæ ʒ j. β.
 Pæoniæ Styracis calamitæ
 Macropiperis ana ʒ j.
 Spicæ Indicæ
 Pyrethri Euphorbii
 Leucopiperis ana ʒ ij. β.
 Mellis despumati triplex pondus.

Est verò observandum in omnibus opiatibus, ut singulis uncis specierum, miscantur tre vnci.

cia mellis despumati. Si minus fuerit, exsic-
atur confectio facile: si verò plus addatur, vi-
eius disperguntur.

Tus Masculum, est Tus album aut fla-
m purissimum, in globulos rotundos singulos,
et testiculorum figura geminos concretum;
noq; Masculi cognomen accepit.

Vtile est ad diuersas passiones ca-
tis: hemicranicum dolorem placat, &
percilii: lachrymas potenter stringit:
uces rheumatizatas & arterias lenit. He-
optoicis & tussientibus medetur. Vo-
itum compescit: dolorem stomachi &
auseam aufert. Peripneumonics, pleuri-
cis, empyicis subuenit. Gonorrhœam
satyrialem emendat, & menstrua-
lem sanguinem sistit.

*Insa Enea, sine Zazenea, vel Egetea A
D. Mesue.*

. Castorei

Myrrhæ

Opii

Helanopiperis

Macropiperis

alban

Costi

cinnamomi

Phu

leu [aut loco eius Sefeli Creticum, id est,
Beruvuriz]

lauci

Asari

roci

ana

3 iiij.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

P. C.

P. C. SCHOL.

A Musa.] Erroneè à Cordo Musa hac confectio inscribitur, veluti & Francisci Alexandritè observavit; cùm Sagzeneà à Mesue vocetur. Musa enim Enea apud Nicolaum confectio est, ab hac plurimum differens.

V A L E T ad omnes passiones frigiditas, & ventositates crassas, & dolores dentium & corrosionem eorum, & ad frigus stomachi, tarditatem digestionis colicam, difficultatem urinae, & ad frigus & phlegma, & ad mucositatem urinae.

Philonium Maius, siue Romanum
D. Nicolai.

R. Leucopiperis

* Hyoscyami albi [i. seminis eius] ana ʒ v.
Opii ʒ ij. β.

Cassiae lignae [aut succedanei eius] ʒ j. β.

A Seminis Apii ʒ j.

Petroselinum Macedonicum Fœniculi

B Dauci Cretici ana ʒ β.

Croci ʒ j. Spicae Indicae

* Zedoariae

* Pyrethri ana ʒ β. ḡ. v.

Cinnamomi ʒ j. β.

Euphorbii Costi ana ʒ j.

Mellis

bellis despumati optimi triplex pondus.

Pro Danco Cretico accipere licet Seseli Cre-
tici, id est, Beruvuriz.

P. C. SCHOL.

Sem. Apii ʒ j. & paulo post. Sem. Dau. A
ana ʒ. ʒ.] Pro ʒ j. Cordus malè ʒ j. si. B
i & pro ʒ ʒ. erroneè ʒ j. legebat: ut Fran-
co Alexand. quoque placet.

Emendat tussim cum vino multo obla-
m, peripneumoniam cum hydromeli-
sanguinis sputum cum polygoniæ
co. Indigestione n stomachi & vom-
m cum posca, dolorem hepatis cum
omelite curat: spleneticis, & aurigi-
sis cum oxymelite subuenit; cœliacis,
mapozemate rutæ. Pleuriticis, ilio-
, nephriticis & vesicæ symptomatis
colericis medetur.

Philonium D. Mesue.

Piperis albi
minis Hyoscyami albi ana ʒ xx.
pii ʒ x. Croci ʒ v.
icæ Nardi Indicæ Pyrethri
storci ana ʒ j.
bellis despumati optimi triplum pōdus.
M i r r u m in modum mitigat dolores,
recipue stomachi, matricis, laterum,
tius ventris, & colicam cum decoctione
D chamæ-

chamæmeli vel rutæ, & statim prouoc
 somnum cum aqua lactuæ vel syrupo p
 paueris. Tollit dolorem capitis cum de
 coctione stæchadis, prohibet catarrhu
 cum decoctione olibani vel spicæ. Con
 tra spasmus, & paralyfim bibitur cum de
 coctione nucis moschatae. Facilitat anho
 litum cum decoctione baccarum lauri vel
 hyssopi, & sedat tussim cum aqua mellis
 Prouocat vrinam, faciliat mictum,
 frangit lapides vesicæ, cum decoctione S
 xifragiæ vel aqua apii. Compescit vom
 tum & fluxum sanguinis ex ore, cum succo
 plantaginis vel decoctione mastiches;
 sedat singultus, & præfocationes, & viti
 matricis, & potenter somnum inducit.

Philonium ex Galeno & P. Ægineta

℞. Croci	ʒ	v.	
Pyrethri		Euphorbii	
Spicæ Indicæ		ana	ʒ j.
A Piperis albi	ʒ	xx.	
Hyoscyami	ʒ	viiij.	
Lachrymæ Papaueris		ʒ	x.
Mellis despumati optimi	tripulum.		

P. C. SCHOL.

A Hyoscyami ʒ. viij.] Cùm non Galeni
 sed P. Ægineta tantum corrupta exemplari
 perperam legant Hyoscyami ʒ viij, atq; ex Cor
 nat

OPIATAE.

75

arii dolabella ꝓ xx pro ꝓ viij. restituenda sine,
um Mesues descriptione hoc pacto conveniet:
spote qui ex hisce eandem desumerit; Castoriū
n Euphorbii locum substitutum si exceperis.

Philonium Persicum D. Mesue.

℞. Piperis albi
Hyoscyami albi ana ꝓ xx.
Apii
Terræ sigillatæ [pro qua Boli Armeni, ut
suprà] ana ꝓ x.
Lapidis Hamatitidis Croci ana ꝓ v.
Castorei Spicæ Indicæ
Euphorbii Pyrethri
Margaritarum Charabæ [id est, Succini]
Zedoariæ Doronici
Trochiscorum Ramich [de quibus infrà]
ana ꝓ j.
Camphoræ ꝓ j.
Mellis rosati optimi triplum.

P. C. SCHOL.

Piperis albi.] Insulè admodum Papaver
n huius locum surrogauerat Cordus ; quod
suboluit facile Fuchsio : sequentibus nihilo-
minus Cordum Colonensibus medicis, in abipsis
vulgato non ita diu Dispensariolo.

INVENTUM est ad retinendum san-
guinem menstruorum, hæmorrhoidarum,
fluxum ventris, vomitum, & sputū sangui-
D 2 neum;

neum; præsertim si cum succo plantagini
dissolutum bibatur, & ad fluxum mēstruo-
rum mittatur in vuluam, & ad fluxum san-
guinis excoriatorum clysterizetur. Confe-
lidat fermè vlcera & venas : & nihil est
quod magis & tutiùs præseruet ab abortu
prægnantem grauidam.

Requies Nicolai.

℞. Rosarum

Violarum ana ʒ iiij.

Opii Hyoscyami

Papaueris [*videlicet albi*]

Mandragoræ [*videlicet cort. radicis eius*]

Scariolæ [*videlicet seminis*]

Lactuæ [*videlicet seminis*]

Seminis Portulacæ

Psyllii

Nucis moschatæ Cinnamomi

Sacchari ana ʒ j. β.

Santali albi Santali citrini

Santali rubri Spodii

Tragacanthæ ana ʒ ij. ḡ v.

Mellis despumati optimi triplum.

REQUIES dicitur, quia requiem acci-
pientibus præstat : maximè typicè febrici-
tantibus, quotidianariis, tertianariis
quartanariis, acutis & peracutis.

Trypher.

Tryphera magna D. Nicolai.

. Opii 3 ij.

Cinnamomi

Caryophyllorum

Cicæ Indicæ

Zingiberis

Cyracis calamitæ

Calami aromatici

Hyperici

Sedididis Illyricæ

Cucurbitæ

Cori [aut Calami aromatici hodie vocati]

Mandragoræ

Rosarum

Sem. Anisi

Pii

Cæniculi

Hyoscyami

Ocimi

Mellis despumati optimi triplum.

*IRIS Illyrica, est eadem que in Pharmacopoliis dicitur Ireos.**NARDVS Celtica siue Spica Celtica, & Galienca, est eadem herba qua in Pharmacopoliis dicitur Spica Romana.**AUXILIATUR dolori stomachi ex rigiditate; & cum accepta fuerit, statim patientem ad sudorem prouocat. Phreneticis, & mulieribus quæ ex melancholia*

D 3

de ma-

de matrice insomnes sunt, rheumaticis, peripneumoniacis, & qui excernunt excrementa cum sanguine, vtilissima est.

Tryphera minor Fænonis, ex Mesue.

Rx. Myrobalan. Chebularum

Bellericarum Indarum Emblicarum

Nucis moschatæ ana ʒ v.

† Nasturtii assati Asari

Origani Persici Piperis

Olibani Ammios

Zingiberis Fructus Tamarisci satiuæ

Nardi Indicæ Schœnanthi

Cyperi ana ʒ iiij.

Scoriæ ferri, quinque diebus in aceto maceratæ, & deinde tostæ ʒ xx.

Myrobalani cum butyro recenti non salito assentur modicum; reliqua oleo amygdalino dulci inuoluantur: deinde addatur

Moschi ʒ j.

Mellis despumati triplex pondus.

Oportet autem diligenter attendere, ne Myrobalani comburantur, cum in butyro assantur.

ORIGANVM Persicum, idem est quod *Origanum Orientale*: nascitur etiam in Creta insula, & Græcia: habet autem surculos, capsula, folia, & ramulos maiorana similia; saporem verò inter Satureiam & Dictamnem Creticum medium: estq; valdè odoratum & aromaticum.

*aticum. affertur ex Oriente in Italiam. loco
utem eius accipere licet Dictamnium Creticum
erum.*

TAMARISCUS *fatua*, arbor est proce-
s: sed ea nos caremus, ideoque cogimur loco
us nostratis Tamarisci foliis uti.

SCORIA ferri, propriè significat ferri
crementum, id est, Eysenschlacken Germanis
vocatum: verum, id non debet hoc loco accipi,
id Squama aut Batitura Ferri optimi aut
shalybis, quam Græci Stomoma appellant.

VALET ad corruptionem & exuberan-
tiam menst ruorum, & hæmorrhoidarum,
& ad corruptionem formæ, & debilitatem
stomachi, & destruit humorem crudum,
& clarificat colorem. Confortat vesicam,
& abscindit fluxum ventris.

Tryphera Sarracenica D. Mesuæ.

ꝑ. Myrobal. Chebulorum

Indorum Bellericorum Emblicorum

Citrinorum ana ʒ v.

Cinnamomi Leucopiperis

Macropiperis Melanopiperis

Secacul [id est, Siferis, ut supra]

Folii [aut succedanei]

Spicæ

Cardamomimajoris Cardamomi minoris

Cassia lignæ [aut succedanei eius]

Scitaragi Indi Cyperi

Apii Linguae avis

D 4

Garyo-

30 CONFECTIOES

Garyophyllorum

Been albi Been rubri

* Zingiberis ana 3 ij.

Nucis moschatae Macis

Sesami excorticati ana 3 iij.

Amygdalorum dulcium

Amygdalorum amarorum ana 3 v

Ligni Aloës Rhabarbari

Rutæ Seminis Fœniculi

Mastiches ana 3 ij.

Ocimi garyophyllati Menthae siccae

Origani Perfici [eius loco *Dictamnium Cre-*
ticum accipe] ana 3 j. β.

Fricentur Myrobalani trite cum butyro
vaccino recenti & non salito; alia verò
species cum oleo amygdalino dulci: &
confice cum mellis dēspumati opt. triplo.

SECACVL, non est Iringus siue Eryngiū,
neque Iringus, qui habet folia Cretami marini
neque Sigillum Salomonis. Sed verum Secaculū
est veterum Siser, hoc est radix illa quæ Germa-
nicè dicitur Klingelmorn, Gritzelmorn, Nudlen,
& Geyrlen: Gallicè Escheruis & Seruilles.

LINGVA auis, est semen Fraxini.

SEITARAGI Indum, est herba Nastur-
tii odore & sapore, foliis longis, radice simili
eius herba quàm Merretich vocant Germani,
& Pfefferwurtz, Raphanum magnum.

CONCOCTIONEM ventriculi & he-
patis suo calore iuuat: ob id flatus dissipat;
humores in ventriculo & aliis visceribus
putres

utres absorbit; oris & corporis odorem
& colorem commendat; lassitudinem tol-
lit. Sanitatem præsentem tuetur, & mor-
borum generationem prohibet. Venerem
auget: hæmorrhoides sanat.

Tryphera Persica D. Mesue.

2. Succorum Solatri siue Solani

Endiuæ veræ & satiuæ

Apii ana P ij.

Lupulorum depuratorum P j.

Proiciantur desuper

Violarum siccarum aut viridum

Rosarum ana ℥ iiij. [aliis ℥ iiij.] *

Folliculorum Senæ ℥ ij.

Agarici ℥ j.

Prunorum Damascenorum piaguiū nu. l. *

Cuscutæ ℥ β.

Spicæ Indicæ ℥ iiij.

Bulliant molliusculo igne, donec super-

sint P ij.

Et iniiciantur Epithymi ℥ xl.

Myrobalanorum Citrinorum

Chebulorum

Indorum frictorum in oleo amygdalo- *

rum dulcium ana ℥ ij.

Bulliant leuiter, deinde ab igne depo-

nantur & percolentur: atque dissoluantur

in vna parte istius percolati

Tamarindorum recentium ℥ iiij.

Mannæ electæ ℥ j. β.

D s Pulpæ

82 CONFECTIOES

Pulpæ Cassiæ ℥ iiij.

Sacchari violati ℞ j.

Percolentur & mudentur à granis & sordibus ; atque in aliam aquæ partem proiciantur

Sacchari albissimi ℞ iiij.

Aceti vini ℞ j.

Coquantur leuiusculo igne : deinde proiciantur super illud quod dissolutum est in succis, & aggregentur simul in vnum, atque coquantur donec mellis crassitiem obtineant : postremò in puluerem redactæ sequentes species inspergantur:

Rhabarbari optimi ℥ ij.

Myrobalan. Citrinorum ℥ j. β.

Chebulatorum

Indorum ana ℥ j.

Belleticorum

Emblicorum ana ℥ iiij.

Seminis Fumiterræ

Trochiscorum Diarhodon

Macis Mastiches

Cubebæ

Spodii [loco eius Eboris vñi]

* Santali citrini ana ℥ ij.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citrulli

* Cucumeris

Melonis ana ℥ ij. β.

Anisi ℥ iiij.

Spicæ Indiæ ℥ ij.

Inuoluan-

Involvuntur hæ species in oleo viola-
to: & confectio reponatur in vase vitreo.

CONFERT febribus acutis, & inflam-
mationi stomachi & hepatis, ictericis ca-
cidis: de oppilatione incolumitatem ac-
quirit. Visum à fumis cholericis deperdi-
tum, reparat. Sitim mitigat: morbos adu-
tionis fieri prohibet.

Confectio Anacardina D. Mesue.

℞. Piperis nigri

Piperis longi

Myrobal. Chebulorum

Emblicorum Bellericoum Indorum

Castorei ana ʒ ij.

Costi Anacardii

Sacchari tabarzeth

Burungi

Baccarum Lauri ana ʒ vj.

Cyperi ʒ iiij.

Anacardi per se terantur, & aliis tritis
admisceantur: deinde omnia cum butyri
recentis non saliti &

Mellis despumati ana ʒ v. β.

Simul coctis bullitione vnicā conficiantur. *

P. C. SCHOL.

Burungi.] Cordus huius loco semen Eru. A
ta posuerat, hanc dictionem ita interpreta-
tus; cum Melissam esse existiment plerique,

ut monet Eufhsius, Matthiolo aliter sentiente. Si verò dictionem hanc Eruca semen esse, Mesue mens fuerit, per id Sinapi semen à colore album vulgo hinc nuncupatum, atque ab officinis nostris perperam Eruca semen vocitatum, intelligendum erit; ab huius confectiois virium scopo non alienum.

Est confectio sapientum, & eorum qui desiderat scire: acuit enim intellectum, subtilizat sensum, memoriam recuperat; & confert dolori stomachi & ventris à frigidityte facto; & clarificat sanguinem, colorem bonum facit.

Aurea Alexandrina D. Nicolai.

R. Afari (suprà)
 Carpobalsami [aut aliquod succedaneum, ut]
 Sem. Hyoscyami albi ana ʒ ij. ʒ.
 Garyophyllorum
 Opii Thebaici Myrrhæ
 Cyperi rotundi ana ʒ ij.
 A Balsami [loco eius oleum Garyophyllorum]
 Cinnamomi
 Folii [aut succedanei eius]
 Zedoarię Zingiberis
 Costi veri Corallii
 Casie lignee verę Euphorbii
 Tragacanthæ
 Turis masculi
 Mei [vel potius Mei]

Styra-

Styracis calamitæ			
Galienæ [<i>id est, Spica Celtica, qua nunc Ro-</i>			
<i>nana dicitur. Sed in Græco Alexandrino habet-</i>			
<i>ur Eleliphæon, id est, Salvia</i>]			
Cardamomi minoris	Seselios		
Seminis Napi	Seminis Saxifragiæ	B	
Anethi			
Anisi	ana	3	j.
Ligni Aloës			
Rhapontici		C	
Aliptæ moschatae	Castorei		
Spicæ Nardi Indicæ	Galangæ		
Opopanax	Anacardii		
Mastiches	Sulphuris viui		
Radiciæ Præoniæ			
Eryngii [<i>videlicet radiciæ eius</i>]			
Rosarum	Thymi		
Acori veri [<i>sive Calami aromatici</i>]			
Pulegii	Aristolochiæ longæ		
Gentianæ			
Corticum rad. Mandragoræ			
Chamædryos	Phu	*	
Baccarum Lauri			
Ammi [<i>id est, Ammios</i>]			
Dauci Cretici [<i>eius loco licet accipere Seseli</i>			
<i>Creticum, id est, Beruvuriz</i>]			
Macropiperis	Leucopiperis		
Xylobalsami [<i>aut aliquod succedaneum</i>]			
Sem. Carui			
Amomi	Petroselini		
Ligustici	Rutæ		
	D 7		Sinoni

Sinoni ana 3 ss.

Auri cocti [i. omnino igne depurati & sinceri]

Argenti meri [vel Fol. Argenti]

* Margaritarum albarum

Blattæ Byzantiæ

* Ossis è corde cerui ana 6 xv.

Limaturæ Eboris

* Calami aromatici

Pyrethri ana 6 vij.

Mellis despumati triplum.

IN Græco Alexandrino Nicolao etiam alia
quædam pretiosa habentur in fine, nî fallor. Si-
cut videbitur, si in lucem venerit.

MYRRHAB. *Advarius*, auctor quem
Ruellius interpretatus est, pro Myrrha habet
Myrti baccarum, id est, Myrtillorum, facili ex
altera in alterutram vocem lapsu: nam Myrta
in plurali numero Græcis sunt fructus Myrti;
que vox magnam habet similitudinem cum
Myrrha.

MEV veronos caremus. eius loco accipere
licet Sisonis semen, quod iam dicitur Amo-
mum, aut Seseli Creticum, hoc est Beruvuriz;
sed hoc inferius est accipiendum pro Dauco
Cretico.

NAPVS, est parua, densa, ac solida ra-
pa, quam appellamus Germanicè Mersbur-
gisch, Bortfeldilsch, & Bairisch rublein.

PHV verum, quod ad medicinam requi-
runt Auctores, non est Valeriana vulgaris,
nempe agrestis: sed alia herba que Germanicè
dicitur

icitur Gartenseliunk, Teriacskraut & Spik-
vurtzel. Caulem & flores habet Valeriana,
radicem maiorem & odoratiorem, folia longa
& mollia. Colitur à nobis in hortis.

AMOMVM verum] est Rosa Hierichuntis D
dorata: sed eo Pharmacopola hætenus carne-
unt. eius succedaneum est verus Acorus aut
carpesium.

SINONVM siue Sison, siue Sinna, siue Si- E
on, est semen nigrum aromaticum, quod ho-
ie Anomum in Pharmacopoliis vocitatur
alsò.

AMBARVM Margaritarum] hoc est, F
erforatarum & non perforatarum. alii le-
unt albarum Margaritarum. Actnarius ha-
et simpliciter Margaritarum. Non malè ergo
uis aget, si tam perforatarum quàm non
erforatarum, ana ʒ β. ʒ vj. & β. acceperis,
ta ex utrisque unum fiet pondus, videlicet ut
Nicolauus habet, ʒ j. ʒ xiij.

P. C. SCHOL.

Balsami] Opobalsami, legebat Cordus, au. A
floris potius mentem interpretans & ponens,
quàm vocem eam quam repererat seruans. Per
Balsamum verò absolutè scriptum, herbam
ipsam ipsius Balsami fruticis intelligi vult
Fuchs. Myrepsum Xylobalsamo, Carpobalsa-
mo, Opobalsamo, & Balsamo, quatuor di-
finitis vocibus uti perhibens. Sed eundem My-
repsum quatuor illa simul in eodem usurpare
medica-

medicamento, nec dicit nec demonstrat. Quare per Balsamum, Nicolaum succum seu Opobalsamum intellexisse, unà cum Francisc. Alexand. Apolline censeo.

B Sem. Napi.] *Seminis Sinapis legit Fuchsius huius loco ex Myrepso, cui & aliquot vetusta mea exemplaria consentiunt.*

C Rhapontici.] *Rhabarbari perperam legebat Cordus, indicante & id quoque Fuchsius; quod à Rhapontico diuersum est. Id ipsum autem adamussim Dioscoridis descriptioni conueniens, hisce nuperrimis annis primum adferri denuò atque à peritioribus nonnullis cognosci cœpit. Non ita diu enim eius uncia paucas (rariusculum enim adhuc est) ex urbe Veneta, in qua tum agebat, ad me dono misit, non minùs doctus, quàm hacce in nostra arte si quis alius versatissimus atque diligentissimus Valerandus Donreus, Lugduni pharmacopœa nunc faciens. Verùm in huius Rhap. puria Rhabarbaro non incommodè uteris.*

D Amomum verum.] *Rosâ Hierichuntis vocata vulgò, Amomum herclè esse non potest, ut Matthiol. Fuchsius, & Francisc. Alex. rectè sentiunt. Quare eius utendum succedaneo.*

E Sinonum.] *Cordi mentem, ut neque Anguillare, non intelligit Francisci Alex. Apollo. Dicere enim volunt, Sinonum seu Sisonem verum, esse semen quoddam nigrum, acre, aromaticum, exiguum, Apii semini simile, eius herba, inquam, cuius imago ab Hieronymo Trag.*
go, &

, & Corda, Sifonis nomine depicta est; ac
cuius semen Belgii atque Germania officina
limonium falsò vocitant, proque eo sinistrè
tuntur. Id ipsum interim si Sinonum non fue-
rit facultate cum illi sit satis vicinum, pro eo-
dem usui esse poterit.

Ambarum Margar.] Cum ita legeret Cor- F
pus, unà cum multis aliis, longè aliter sese
habet; nempe ut in contextu restitui.

CONTRA defluxiones capitis frigore
conceptas efficax est: oculorum lachry-
mas exiccat, dentium dolores lenit: ad-
uersus capitis cruciatum summopere
prodest. Illitum fronti comitiales, insa-
nos, vertiginosos, & in vniuersum om-
nem capitis noxam mulcet. Tabidis, tussi-
culosis, humorem à thorace reiicientibus,
cardiacis, sanguinem exscreantibus præ-
senti est auxilio, ischiadicis, coli & renum
cruciatibus. Aduersus iliorum noxam, dif-
ficultatem vrinæ, & eiusdem stillicidium
valet: calculos comminuit: omni ventris
malo liberat. Quotidianis & tertianis fe-
bribus circa accessionis initium, sufferue-
facto Stœchadis iusculo, medetur.

Diacodion simplex D. Mesuæ.

℞. Capitulum Papaueris mediocrium *
flaccidorum numero x.

Macerata horis xxiiij. in Aquæ celestis *
sextario

90 CONFECTIOES

sextario vno, coquantur ad tertias, id est, tamdiu vsque quo tertia pars aquæ superfit.

Colaturæ expressæ adde

Sapæ optimæ ad tertias coctæ 3 iiij.

Mellis optimi 3 j.

Coquantur ad perfectionem.

Diacodiū cōpositū verò vt fiat, addantur

Acaciæ, non ita aridæ, sed liquidæ

* Rubiæ tinctoriæ Hypocistidis

Croci Myrrhæ

Balaustiorum [hoc est, florum malogranat. siluestrium] ana 3 j.

Ramich 3 iiij.

FLACCIDORVM, id est, non omnino recentium, neque aridorum, sed medio habitu, qualia sunt pridè decerpta. Si verò sicciora fuerint capita, biduo maceranda erunt.

SEXTARIVS mensura genus est, quod si melle repleatur, pendet 3 xxx; si oleo, pendet 3 xviij, si verò aqua repleatur, pendet aque 3 xx. Hoc autem loco accipiendus est sextarius aquæ callestis: ergo aquæ oportet esse uncias xx ponderales. Variant tamen Auctores in sextarii definitione, vt inferiùs in vnguentis dicitur.

HYPOCISTIS, id est, vt hodie corrupto nomine vocant, Hypoquistidos.

RAMICH, compositio est peculiaris, quæ ponitur in Trochiscis.

MELLIS quantitas admodum parua videtur

letur esse in hac confectio. Actuarius aliud
habet Diacodion ; quod huic subiiciamus sta-
tim.

DIACODION simplex confert eis
quibus ex capite ad pectus & ad pulmonem
subtiles catarrhi defluunt, & sunt causa
tussis.

Compositum autem, naturę impetum
sistit, & sanguinis reiectionem à visceri-
bus thoracis.

Diacodion D. Actuarii.

℞. Capita Papaveris, neque perquam vi-
ridia, neque etiam ariditate exsucca,
numero xij.

Rosarum ʒ j. ʒ j. ℞.

Croci Acaciæ

Dulcis radice [id est, Glycyrrhizæ] ana ʒ j.

Armenæ glebæ [id est, Boli Armenæ] ʒ ℞.

Cinnamomi Hali

Hypocistidis

Floris silvestris Punice [id est, Balanflorū]

ana ʒ j.

Myrti Dauci ana ʒ j.

Corallii candidi [id est, albi]

Corallii rutili [id est, rubri]

Rhois culinarii [id est, obsoniorum]

Sanguinis Draconis

Florum Althææ ana ʒ j. [seu ʒ ij.]

Seminis Portulacæ ʒ j. ℞.

Capita

Capita papaueris in caelesti imbre sufficienti duos dies macerato, postridie ad tertias coquito, & decoctum expressum ad iustam consistentiam bulliat cum mellis optimi ℞ ij. Postremò deposito ab igni vase, species subtilissimè tritas adicito, & bene vnito.

☞ hoc signum significat pondus, quod dicitur Sicilicum: pendet autem tantum quantum 3 ℥. & est quarta pars uncie unius.

HALVS aut Halum siue Alum, est Consolida saxatilis, id est, Symphytum petraeum, quod hodie non habent Pharmacopola, ideoq; necesse est Symphyti, siue Consolida maioris radices accipere, nam Galenus dicit, utile esse magnum Symphytum, id est, Consolidam, ad omnia ad qua Petraeum, id est, Alum.

RHVS Culinarium, id est, quod nunc vocant Arabico nomine Sumach: oportet autem enucleatum, & pulpam eius accipere.

AUXILIO est cœliacis, dysentericis, leuitati intestinorum, alui profluuiio, cum aqua caelesti, in qua spodium ferbuerit aut succinum torrefactum, vel cum stillaticio rosarum liquore.

A Diacastorium D. Nicolai.

℞. Castorii

Myrobalanorum citrinorum ana 3 iij.

minus 6 j. β.

A℞

OPHIATAE.

93

Assē foetidæ Myrrhæ
 Euphorbii ana ʒ j. ḡ xvij.
 Aloës ʒ j. β. minus ḡ j.
 Folii [aut succedanei eius]
 Artimonii [id est, Pyrethri]
 Glycyrrhizæ Tragacanthæ
 Calami aromatici
 Nitri Galbani
 Schœnanthi Opopanacis
 Spice Nardi Indicę
 Sagapeni Nucis moschatę
 Casiæ lignę Leucopiperis
 Macropiperis Melanopiperis
 Xylobalsami [aut succedanei eius]
 Carpobalsami [aut succedanei eius]
 Colocynthidis Rhapontici
 Styracis Calamitæ Zingiberis
 Cinnamomi ana ʒ j. ḡ ij.
 Staphisagrie
 Dauci Fœniculi
 Petroselini Apii
 Sileris montani Baccarum Lauri
 Petrolei Seminis Sinoni
 Styracis [calamitæ] rubræ [id est, rufa pu-
 rissima]
 Sanguinis draconis Cardamomi maioris
 & minoris
 Turis Agarici
 Mastiches
 Salis Hammoniacy Zedoariæ
 Anisi ana ʒ j. ḡ ix.
 Thym-

- Thymbrae Hyssopi
 Chamædryos Pulegii
 Origani Balsamitæ
 Ocimi Brancæ vrsinæ
 Dictamni [*videlicet Cretensis*]
 Seminis Rutæ Aristolochiæ longæ
 Aristolochiæ rotundæ Ari
 Mabathematicum Asari
 Saluiæ [*videlicet minoris*]
 * Rosarum
 Bdellii ana ḡ xvij.
 Epithymi Polypodii quercini
 Opobalsami [*loco eius oleum Caryophyllorū*]
 ana ḡ xiiij.
 * Alypiados
 * Capparis [*id est, radicis eius*] ana ḡ xij.
 Anacardii Sabinæ Gentianæ
 * Corticum rad. Mandragoræ ana ḡ x.
 Peucedani
 * Absinthii ana ḡ vij. Ireos ḡ iij. β.
 Mellis despumati triplum.

PETROLEVM hoc loco accipiendum est
 clarum, flauum atque liquidissimæ tenuitatis:
 & non nigrum & crassum.

STYRACIS rubea, id est, calamita rubea:
 hoc enim loco non est accipiendus cortex ille fuscus
 & aridus, quem vocant Thymiana, atque
 malè Storacem rubeam: sed Styracis calamita
 purissima gutta, quibus rufus est color.

SALIS Hammoniæ, hodie dicunt Ar-
 moniæ. est autem hic duplex. Factitius, quo
 videntur

utuntur Chymista, Aurifabri & Aerarii: atque Nativus, qui ad medicinam recipitur. Cum autem careamus Nativus, necesse est eius loco Salem Gemmeum accipere. Nam hoc loco non requiritur Sal Hammoniacus factitius, ut puto; potest tamen tantilla eius portio iudè misceri tam numerosis simplicibus huius compositionis.

BRANCA Ursina, hoc loco non significat eam herbam quam Germani Bernklaw vocant, foliis asperis, umbella & semine. Anethi, odore & sapore cimum; radice acri & feruida: sed eam Brancam qua in Italia Ursina vocatur, radicibus longis, Tragacantha modo mucosis.

MABATHEMATICOVM, aiunt esse Cauliculi silvestris succum. est autem Cauliculus seu Caulis agristis idolus quod Cato & alii rei rustica scriptores apud Latinos Brassicam silvestrem vocant, cuius multa sunt species.

ALYPIAS, siue Alypum, quid sit, non- B dum constat: quidam interpretantur Meze-reon, id est, Chameleam, sed falsò: utrumque enim seorsum peculiari capite ab auctoribus depingitur: vires habet acres, & atramtilem per alium purgandi. possumus autem eius loco accipere Epithymum, Thymbram, aut Thymum.

P. C. SCHOL.

Huius confectiois descriptionem cum non A
esse

*esse legitimam, sed corruptissimam Fuchsius
& Franciscus Alexander meritis conqueran-
tur, eam nos hic sua integritati restituimus;
quamquam non ex Fuchsii Myrepsō deprava-
tissimo, ut neque ex Francisci Apolline.*

B Alypias siue Alypum.] *Eius, qua hec no-
mine hodie cognoscitur, herbam affabrè tibi
Matthiolus in suis illis heroicis Commentariis
depictam exhibet.*

CONFERT cephalalgicis, epilepti-
cis, vertiginosis, hemicranicis, para-
lysi omnium membrorum, & omnibus
frigidis agritudinibus, tempore frigido
nocentibus.

Michleta D. Nicolai.

℞. Myrobalan. citrinorum
Chebulorum

Indorum, omnium tostorum ana ʒ ij. β.

Myrobal. Bellericorum

Emblicorum tostorum ana ʒ ij.

Nasturtii tosti [id est, seminis eius] ʒ ij. β.

Cumini Anisi

Fœniculi Ammios

Carui ana ʒ j. β.

Omnia cruda terantur, & maceren-
tur in aceto vini modico xxiiij. horis,
exiccantur cum insperso aceto; postea tor-
reantur supra prunas: tostis addantur
subsequentia:

Spo-

Podii [idest, Eboris vsti]

Malauſtiorum

ulpæ Sumachii Mastiches

ummi Arabici ana ʒ j. ʒ xv.

Omnia cum oleo rosato fricentur, & omisceantur cum Syrupi myrtini triplo.

Propriè valet ad hæmorrhoides, & ad ventris torsionem & rugitum lienterix, & dysenterix: & optima est omni solutioni ventris.

Electuarium de Baccis Lauri,

D. Rhasis.

1. Fol. Rutæ [siccorum] ʒ x.

ammios Cumini Nigellæ

igustici [idest, seminis eius]

Origani Carui

etroselini

mygdalorum amarorum *

iperis nigri Piperis longi

Menthastri Dauci Aconi

accarum Lauri

Castorei ana ʒ ij.

agapeni ʒ β.

popanacis ʒ iij.

Mellis despumati triplū [i. l. j. ʒ iij. ʒ vij.]

SAGAPENVUM corrupto nomine vocatur
erapinum in Pharmacopoliis.

VALET ad colicam & iliacam passionem; & doloribus intestinorum ex causa frigida vel ventosa confert.

E

Diasa-

Diasatyrium D. Nicolai.

℞. Testiculorum Satyrii recentium den-
torum

Radicum Pastinacæ sativæ recentium

Radicum Secacui [*id est, Grietzelmorn*]

Nucis Indicæ Pinearum

* Pistaciorum ana ʒ xij. ʒ.

Garyophyllorum

Zingiberis Anisi

Erucæ seminis

* Lingue avis [*i. seminis Fraxini*] ana ʒ v.

Ḡ xv.

Cinnamomi Caudarum Scincorum

Seminis Bulbi ana ʒ ij. ʒ.

* Moschi Ḡ vij. ʒ.

Mellis despumati optimi P iij.

SATYRIUM habet duas radices, una
solidam, alteram flaccidam; ex his tantum
sumenda sunt densa & solide.

SEMINIS Bulbi. Bulbus vulgè non est co-
gnitus: quare eius loco Vrtica semen accipere lice-

SCINCORVM. Notandum est in primis
non esse accipienda reptilia illa quadrupedia en-
fossis, quæ nos vocamus Vvassermolchen, sive
Vvasser Eydixen; ut hæcenus factitatum est.
Veri autem Scinci iam denuò in copia afferun-
tur ex Alexandria Ægypti, quos à Materia
listis expetant Pharmacopoli in posterum.

POLLET contravescicæ & renum imbe-
cillitatem

illitatem: iis etiam auxilio est, qui urinam
reddere nequeunt: venerem stimulat,
amque certa de causa cessantem, haud se-
miter restituit.

Diasaryrion aliud D. Mesue.

2. Secacul albi & mundi, & elixati in de-
cocto Cicerum, quorum prima aqua in
qua decoquebantur, sit effusa ℞ j.

Festikulorum vulpis [herbæ] ℞ viij.

Radiciis Raphani ℞ iiij.

Radiciis Laph plani ℞ ii.

Terantur hæ tres radices posteriores, &
infundatur super eas lactis bubuli aut
ovilli tantum, ut lac duos digitos emi-
neat, adiciendo Olei sesamini

Sutyri recentis non saliti ana ℞ iiij.

Coquantur cum facilitate usque ad con-
sumptionem lactis, & donec omnino re-
nollitæ sint radices, & habeant iustam spis-
situdinem instar pultis crassioris: nam si
liqueam quod in lacte & radicibus est, non
consumatur, situm contrahit hoc medica-
mentum.

Postea affunde omnibus hisce prædictis
radicibus

Mellis despumati optimi ℞ vj.

Succi Ceparum recentium ℞ j. *

Coque omnia simul ad perfectam deco-
ctionem, deinde ab igne deponere, & insper-
ge sub-

E 2

ge sub-

100 CONFECTIOES

ge subsequentium specierum minutissimum pulverem:

Caudarū Scinci, cū renibus & sumine, ʒ

Seminis Erucae Zingiberis

Been albi Been rubri

Linguae auis [*id est, seminis Fraxini arboris*

Seminis Nasturtii Cinnamomi

Piperis longi Seminis Bauciae

Seminis Napi

Pulpae seminis Asparagi maximè recentiana ʒ iiij.

Confice cum eis : vltimò verò adiiciantur subsequentia:

* Pinearum mundatarum ℥ j.

Fisticorum [*i. Pistaciorum mundatorū*] ʒ

* Cerebellorum passerum ʒ ij.

Confice & misce omnia optimè, & aromatiza cum

Moschi boni ʒ j.

RADICIS Raphani, videlicet sativam quam vocamus Rettich.

LUPH planum.] Duplex est Luph (*id est, Serpentaria,*) crispum scilicet & planum: Crispum folia habet diuisa & crispā; Planum vel lata & plana veluti Aron, unde utrique nomen inditum est. Vulgò autem apud nos carum est Luph, id est, vera Serpentaria: idèd eiu loco accipiende sunt radices herba quam Aro vocant.

A TESTICULI vulpis] hoc loco non sunt accipiendi testes animalis, dicti vulpes; sed radice

lices Satyrii siue Orchios, quæ habent simili-
tudinem testiculorum vulpium. Vnde etiam no-
men herba accepit. quæ in re quosdam turpiter
irrasse scio.

NAPVS est paruum, oblongum, densumque
rapum: cuius sunt species plures, Bayerisch
rublein, Stechrublein, Merseburgisch & Bors-
feldisch rublein.

BAVCA est Pastinaca sativa siue Caro-
ta: Ghelbenmoren Germani vocant.

FISTICVM siue Phisticum, idem est
quod Pistachium siue Pistacium.

P. C. SCHOL.

Testiculi vulpis hoc loco.] Cordus hic
Orchin cum Satyrione confundit, ut ritè inquis
Franciscus Alexand. Quare Orchios dictio de-
lenda est.

VALET ad erectionem virgæ: multipli-
cat sperma, & desiderium coëundi.

Theriaca D. Andromachi, ex Aëtio.

℞. Trochiscorum scilliticorum ʒ xlviij.

Trochiscorum de vipera, seu Pastillorum

Theriacorum

Trochiscorum Hedychroi Piperis nigri

Opii Thebaici recētis ana ʒ xxviij. [al. 2ʒ]

Rosarum siccarum Scordii Cretici

Seminis Buniadis agrestis Iridis Illyricæ

Agarici albi Pontici [id est, in Ponto nati]

E 3

Cinna-

- Cinnamomi Succī Glycyrrhizæ sicci
 Opobalsami [*loco eius olei Caryophyllorum*]
 ana ʒ xij.
 Myrrhæ Troglodyticæ
 Croci Cilicii Zingiberis
 Rheupontici [*id est, Rhubarbari*]
 Radicum Quinquefolii
 Calaminthæ montanæ Marrubii comarum
 Stœchadis cacuminum & foliorum
 Petroselini Macedon.
 Costi recentis [*videlicet veri, non adulterini*]
 Piperis albi Piperis longi
 Dictamni Cretici Turis masculi
 Schœnanthi [*id est, Iunci odorati floris*]
 Terebinthinæ Chiæ [*i. in Chio insula nascens*]
 Casiæ fistulæ [*videlicet Casia lignea vera*]
 Spicæ Nardi ana ʒ vj.
 * Gentianæ radicis Polii comarum
 Styracis calamitæ Seselios Massiliensis
 A Abrotoni Seminis Thlaspios
 Ammi Chamædryos comarum
 Chamæpityos comarum
 Hypocistidis succi Malobathri foliorum
 Spicæ Celticæ [*id est, Spica Romana*]
 Anisi Helladici [*hoc est cognomen Anisi, in
 regione, ubi optimum est*]
 Mei Athamantici [*vulgò Mei*]
 Fœniculi seminis
 * Sigilli Lemnii [*aut eius penuria Beli Armæ*]
 Chalcitidis semiaffatæ
 Amomi racemi Acori radicis

Ph

huPūici [*accipe verū, quod in hortis colitur*]

Carpobalsami Hyperici cacuminum

leaciaz liquidioris Gummi vermiculati *

Cardamomi ana ℥ iiij.

Oanci Cretici Galbani puri

Opopanacis Sagapeni Perfici

Bituminis Iudaici [*id est, Asphalti*]

Centaurii minoris comarum Castorii

Aristolochiaz tenuis ana ℥ ij.

ini veteris odorati, quantum liquoribus

& gummis dissoluendis satis fuerit.

Mellis despumati optimi triplum; hoc est

℔ xiiij. ℥. vj. vt sequetur paulo pōst.

Confice sic: Cinnamomum Crocumque

vt Aëtius vult) vnumquodque per se te-

rito, & si voles etiam Rhabarbarū & Hedy-

threos Trochiscos: misce deinde inuicem

optimè: postea reliquas herbas ac radices,

& omnia arida similiter tūdito, semper si-

nilia cum suis similibus; aromata per se,

ac reliqua etiam per se seorsum. Postea (si

Aëtium imitari est animus) Crocum, Ca-

iam, Cinnamomum, & Lemniam terram

in pila cū vino optimo tere atque vnito, ac

reliqua omnia secundum artem addito; &

melle despumato vniuersa excipito.

Ego verò ita præparare consueui, simili
fere ratione:

℔. Piper nigrum Piper album

Piper longum Iridem Illyricam

Zingiber Costum

E 4

Amo-

Amomum [*aut eius succedaneum*]

Acorum Cardamomum Carpobalsamum

Incidenda minutim cōcidito, & in minu-

tissimum puluerem conterito, & per angu-

stissimum cribrum excernito: postea in

icatula diligēter, ne exspiret, obstructa re-

ponito, donec reliquis admisceas. Postea

℞. Radices Quinquefolii Gentianam

Meon [*aut eius succedaneum*] Phu

Dauci Cretici radicem [*aut eius succedaneū*]

Aristolochiæ tenuis radicem Rosas

Trochiscos scilliticos

Trochiscos de vipera

Scordium Calaminthen montanam

Marrubii comas Stœchadis comas

Dictamnū Creticum Schœnanthum

Polii montani [minoris] comas

Abrotonum Chamædryos comas

Chamæpityos comas

Nardum Celticam Hyperici comas

Centaurii minoris comas, atque

Castorium, & semina omnia;

Concidito omnia minutim, teritoque in

tenuissimum puluerem, & per angustissi-

um cribrum excutito. Excussū pulue-

rem prædicto quem reposuisti adicito,

diuque donec perfectè commisti sint, in

mortario terito; adhibita diligenti cura, ne

quid inter tundendum excernendumq̃ pe-

reat, aut temerè ponderi decedat: mox

ē mortario exemptum puluerem iterum ne

exspire

exspiret reponito, vsque quò omnia confi-
ciantur. Interea R Agarici optimi albif-
simi, atque in longa rectaq. capillamenta
fissilis, frusta electa: ab his scobē deradito
3 ij. sed quia non facilè per se tunditur, ne-
que etiam cum aliis, propterea quòd in pul-
uerem volatilem resolutus euanescit, ita vt
multum ponderi eius decedat: idè ad sco-
bem Agarici prædictam infunde optimum
vinum, & fac Trochiscos minutos in tepi-
da vmbra exiccandos: exiccatos minutissi-
mè contundito, atque per cribrum excer-
nito angustissimum: excreti deinde Agari-
ci cape pondus, quod requirit compositio,
videlicet 3 xij. & prædicto pulveri sum-
ma diligentia commisceto: quo factò,

R. Opium

Succum Glycyrrhizæ

Myrrham

Acaciam

Gummi

Hypocistida.

Concidito omnia in minutas partes, &
mistis superinfundito vini optimi quātum
dissoluendis atque eliquandis succis satis
fore coniecero: exprimito: postea per ra-
rum colum liquefactam & modicè cale-
factam pulticulam colato, ita vt nihil præ-
ter sordes in colo remaneat. Quod si succi
& liquores isti sordidi & surculis foliisq.
pleni fuerint, ponderi eorum aliquid ad-
dendum esse facilè æstimare quis potest:
quod in sequentibus densatis liquoribus

E 3

etiam

etiam obseruandum est. Deinde

R. Galbanum

Opopanacum & Sagapenum. hæc affuso
optimo vino, modeste supra prunas dissol-
uantur, & perrarum linteum fortiter ex-
primantur: his dissolutis,

R. Tus masculum

Bitumen Iudaicum. terantur quàm minu-
tissimè poterunt, addendo Terebinthinam,
& sincerissimam, aut ex scobe ac sordibus
expressam Styracem: dissoluantur lento
admodum igne, cum mellis despumatisuf-
ficiēti copia; & ita calidam pultriculam po-
stea cum reliquis calentibus misceto, & di-
ligenter rudicula agitato, ne rursus in gra-
mos concrecant Tus & Bitumen, ubi re-
frixerint: quapropter aliquid de contuso-
rum puluere est admiscendum.

Quodd si hoc modo dissoluere, & miscere
diffidas, Bitumen & Tus vnà cum reliquis
aridis tundito, & tantùm Styracem atque
Terebinthinam dissoluito, atque melli
despumato calenti admisceto. his factis,

R. Cinnamomum

Malobathrum [*aut eius succedaneum*]

Casiam fistulam veram

Trochiscos Hedychroi

Spicam Nardi Indicam; & simul tundito
in tenuissimum puluerem:

Postea

R. Crocum

Rheon

Rheon siue Rhaponticum, (id est, quod
hodie Rhabarbarum vocatur;) & vnum-
quodq. seorsum tūdito, deinde iis misceto
Trochiscorum Hedychroi Cinnamomi
Cassiae Spicae Nardi
Crocī & Rheī Pontici, pulueres, diligen-
tissimè:

Postea

R. Mellis optimi & aromatici, quale ē
Lithuania Dantiscum affertur: despume-
tur sedulò: despumati postremò mellis su-
me ꝑ xiiij. ꝫ vj. ex eo modicum infunde in
amplum ahenum ex aurichalco factum, &
insperge paulatim commistos paulo ante
Trochiscorum Hedychroi, Cinnamomi,
Cassiae, Spicae, Croci & Rheī Pontici pul-
ueres; alternis vicibus, mel despumatum
tepidum, atque pulueres iniiciendo: quæ
diligentissimè interim pistillo ligneoagi-
tanda sunt. Cū hæc optimè fuerint com-
mista, & floridum puniceumque colorem
contraxerint, iniicito Lemniam terram
anteà subtilissimè per se, deinde cum vino
tritam, & vnà etiam Chalcitida assatam;
quam hoc modo assabis: Accipe purissimæ
Calcitidis circiter ꝫ iij. eam in fictile non
ita profundū iniectam, supra prunas po-
nito, donec liquefiat & bulliat: deinde
ab igne auferre; & abiicito id quod in su-
perficie durū est atq. rufescit, & ex medio
eius sume ꝫ iij. & cum vino tritam atque

E 6 dissolu-

dissolutam medicamento admisce. Postea paulatim etiam infundito tepefactos liquores & succos quos antea in vino dissoluisti; alternis vicibus, succos, mel & reliquos pulueres, quos primò contriuisi, iniiciens; simul etiam admisce Styracem Terbinthinamque & Opobalsamum; ita ut omnia exactissimè admisceantur: atque sigillatim mel & pulueres commisce, donec vniuersa vnita & in vnā substantiam redacta sint; assiduè agitando, ne grumi aliqui relinquantur, aut nodi.

Postquàm verò optimè totam confectio-
nem miscueris, indito in vas ex densa materia factum, videlicet ex plumbo albo, quod hodie stannum appellant: oportet verò ut tertia aut quarta pars vasis relinquatur vacua, ut efferuescens medicamentum attollere se queat, nec effluat. Reponendum autem est hoc medicamentum, donec feruescat, in tepido & sicco loco: postquam verò subsederit, in frigido & sicco loco conseruandum erit. Porro ego hac ratione præparauī Theriacen: alii verò paulò aliter conficiunt. Sed omnium pessimè faciunt, qui succos & liquores & reliqua omnia simul tundunt, & postea rufum puluerem impuro melli incoquunt. Animadvertendum etiam est, ne vini plus quàm opus sit liquoribus & succis dissoluendis adfundatur. Nam si ultra modum vinū succis ad-

eis addatur, situm contrahet Theriaca: propterea etiam non cōsueui Casiam, & Crocum, & Cinnamomum vino permiscere, sed mel. nam aquosius est vinum nostrate: quod intelligentes quidam ex recentioribus, qui de Compositis medicamentis scripserunt, iubent pro vino accipere coctū multum, hoc est, sapam, passum aut defrutum: quibus tamen non assentior. Nam hęc vina sunt spissiora, quā ut in eis concreti atque densati succi, & liquores dissolui queant. Nam eius tantū rei gratia vinum Antidoto huic permiscere soliti sunt veteres, quos & nos imitabimur.

Hec descriptio est sumpta ex Aëtio: paulò post ponetur ea quam transtuli ex Graco carmine Andromachi senioris.

VIPERAE serpentes sunt in Italia: inde etiam facti ex eis Trochisci petendi sunt.

TROCHISCI Hedychroi, inferius in Trochiscis describentur.

PIPERIS nigri. Andromachus senior, qui inuentor est huius compositionis, hoc loco habet PIPER longum, in Carmine Elegiaco Graco.

SCORDII Cretici. Optimum Scordium nascitur in Creta insula: nos interim nostrate utamur, satis efficaci. Porro verum Scordium herba est Chamadryi similis, odore aliquo Allii; & nullo modo Allium silvestre, ut hactenus magno errore crediderunt: nascitur in Saxonia, quemadmodum & circa Nurembergam.

BYNIAS, id est, *Napus* : quid verò sit *Napus*, dictum est in *Diasatyrio Mesua*, & antea etiam.

MYRRHAE *Troglodytica*. *Troglodyta* populi sunt *Arabibus* vicini : apud quos optima nascitur *Myrrha*.

OPOBALSAMO vero caremus : ideoq; eius loco accipiendum est succedaneum aliquod, veluti est oleum *Garyophyllorum*.

CROCI *Cilicii*, id est, in *Cilicia Asia* regione nati. & idem est quod *Crocus Orientalis*.

RHAPONTICVM hoc loco significat *Rhabbarum* : nam magna illa radix quam hodie *Rhaponticum* vocant, falsò hoc nomen habet.

COMAE sunt folia & flores plantarum.

PIPERIS longi. *Andromachus* senior hoc loco habet *PIPER* nigrum : Iunior verò *Andromachus*, id est, Senioris filius, ordinem nigri & longi *Piperis* inuertit, quem in hac compositione sequimur, paulo post etiam Senioris *Tberiacen* adscripturi.

DICTAMNVS *Creticus* folia habet alba, lanugine obducta, gustu acris ut *Thymus* : offertur rursum ex *Creta* insula ad nos.

CASIA fistula hoc loco significat *Casiam* ligneam veram, qua iam iterum offertur, est q; *Cinnamomo* similis.

POLIUM montanum duplex est : unum pluribus surculis fruticosum, ac humi sparsum : alterum candidius, & rectius se attollens. Maius nascitur apud nos ; minus offertur ex Monte

Monte Pessulano: & ha sunt veri Polii species, & totam hiemem virent, ut Lauendula aut Thymus. Vulgò non habuerunt verum Polium Pharmacopola usque ad hoc tempus.

STYRAX, id est, Storax calamita. Accipienda autem est hoc loco purissima eius resina in micis concreta.

SESELI, id est, Sileris montani. Dicitur autem Massiliense, à pronuncia Massiliensi, in qua prouenit optimum.

THLASPI est species agrestis Nasturtii, quae passim nascitur sicut vias, semine rufo, sapore acri & glutinoso: quod ut habeant diligenter curent Pharmacopola. Vocatur Germanicè Voegecressen.

CHAMÆPITYS vera est Iua. herba est tenuibus foliis, floribus paruis & luteis: nascitur copiosè ad Rhenum in Franconia, in vineis & agris quiescentibus; praesertim Spira, Wuormacia, & Wuirtzburgi, & aliis locis.

MALOBATHRUM est Folium Indum, cuius succedaneum est Spica tam Indica quàm Celtica.

MEV, seu potius Meum non habemus: loco eius sumimus Sefeli Creticum, id est, Beruurt, aut potius Sison hoc loco: inferius enim sequitur Daucus Creticus.

SIGILLUM Lemnium, id est, terra Sigillata, quae signatur in Lemno insula, in qua effoditur hac terra: in cuius defectu sumatur bolus Armenus Lemanticus, [seu Orientalis.]

CHAL-

CHALCITIS hodie non à quouis cognoscitur: est autem Vitrioli nativi species. Hac qui carent, accipere possunt Vitriolum viride optimum, quale est Goslarianum in Saxonia. Porro Andromachus mihi videtur Chalcitida Theriaca miscuisse, nigri coloris gratia: qui color ab omnibus in Theriaca requiritur sine aliqua ratione. Mihi itaque videtur non necessariò eam addi. Nam horribili & eruginoso sapore totam compositionem inficit. At cum ego aliquando in Theriaca compositionem non adiecissem Chalcitida, saporem gratiorem acquisivit hoc medicamentum. Consulantur igitur hac de re Doctores Medici.

AMOMO vero caremus: eius loco accipimus Carpesium, aut Acorum verum, id est, nostrum Calamum aromaticum.

ACORVS verus, est illa radix quam hodie falsò vocant Calamum aromaticum.

ACACIA, succus est fructus ex arbore, & qua distillat gummi Arabicum. Loco eius accipimus silvestrium Prunellorum succum instissatum.

GUMMI vermiculati, id est, Arabici gummi, quod concretum est in grumos vermium figura.

DAVCI Cretici vice accipere licet Seseli Creticum, id est, Beruvuriz; videlicet radicem eius.

SAGAPENVUM hodie vocant Serapinum; quod in Perside optimum provenit. Senior Androma-

dromachus Sagapeni habet 3 iiij.

Iunior verò tantum 3 ij.

ARISTOLOCHIA tenuis, id est, Aristolochia nostra longa vulgaris.

P. C. SCHOL.

Abrotoni] hanc dictionem, in Aëtio à Cor- A
nario verso, non reperiō.

Rhaponticum.] Idipsum à Rhabarbaro B
differre, alibi diximus. Radix autem illa magna qua Rhapontici nomine in officinis passim prostat, Censaurium magnum Dioscoridis est.

Chalcitis.] Chalcitida commodè ac necessariò semper Theriaca immiscendam esse, unà cum L. Fuchsio, & Franc. Apolline censemus: Simulq; somnium esse, aruginosum & horridum eius saporem in Theriaca præ cæteris persentiri, ut imaginantur nonnulli, scimus & dicimus. Rationibus autem hac aliq; qua scholiis profero, confirmare, compendii egestas cum non permittat, in nostrum opus, si fauerint Superi, ea omnia asseruantur.

Theriaca in omnibus antidotis ob multiplicem usum potiores partes obtinet. Est enim famosa & salubris cōtra genera egritudinum plurima. Valet enim ad grauissimas passionēs totius corporis humani: Epilepticis, catalepticis, apoplecticis, cephalalgicis, stomachicis, hemicranicis prodest. Ad raucedinem vocis, & constrictionem pectoris optima est: arteriacis, asthma-

asthmaticis, hæmoptoicis, iëtericis, hydro-
pìcis, peripneumonìcis, iliohs, & vulnera in
intestinis habētibus: Ne phrītìcis, calculo-
* sis & colicis subuenit. Menstrua educit, &
fœtum mortuū expellit. Lepras, & variolas,
* & frigus periodicum, & cæteras passiones
inueteratas emendat. Præcipuè contra om-
nia venena & serpentium morsus & repti-
lium valet. Sed diuersa est eius dosis pro
quantitate & qualitate vniuscuiusque pas-
sionis. Omnem defectionem sensuum re-
leuat. Cor, cerebrum, hepar, stomachum
confortat. Totum corpus incorruptum du-
cit & custodit.

*Theriaca Andromachi Senioris, è car-
mine eiusdem elegiaco translata.*

℞. Trochiscorum Scilliticorum ʒ xlviij.
Trochiscorū Theriacorum Piperis longi
Liquoris Papauerini [*id est, Opii*]
Magmae Hedychroi ana ʒ xxiiij.
Foliorum Rosarum siccarum
Iridis Illyricæ [*id est, Irees*]
Cyanæ Glycyrrhizæ
Seminis Buniadis [*id est, Napi, vulgò Beye-
rische rublein*]
Scordii
Liquoris Balsami [*loco cuius oleum Garyo-
phyllorum*]
Cinnamomi Agarici ana ʒ xij.
Myrrhæ

Myrrhæ Costi Croci Coricii
 Casiæ [*id est, Cassia lignea vera, aut succedanei eius*]
 Nardi Indicæ
 Iunci Arabici [*id est, Schoenanthi*]
 Turis [*videlicet masculi & electi*]
 Piperis candidi Piperis nigri
 Comarum Dictamni [*id est, foliorum & florum Dictamni Cretici viri*]
 Marrubii
 Rhei [*i. quod hodie vocatur Rhabarbarum*]
 Stœchadis
 Petroselini [*id est, seminis eius*]
 Calaminthæ [*i. Calaminthi montani tenui-*
Lachrymæ Terebinthi Libyætiadis (foliis)
 Zingiberis
 Quinque folii [*i. radicum eius*] ana ʒ ʒj.
 Polii [*videlicet montani & albi, quod è Lugduno*
affertur]
 Chamæpityos
 Styracis [*i. Styracis calamita, sincera & electa*]
 Mei [*quod vulgò Meu vocatur*]
 Amomi racemosi [*aut succedanei eius, ut su-*
 Nardi Galaticæ [*id est, Celtica*] (præ)
 Rubricæ Lemniæ [*id est, terre sigillata vera,*
aut Bols Armeni, ut supra]
 Phu Pontici
 Chamædryadis Creticæ [*i. Chamædryos vera*]
 Foliorū Malobathri [*eius loco ponatur Massu*]
 Chalcitidis tostæ
 Radicis Gentiadis [*id est, Gentianæ*]
 Anisi

Anisi Succum Hypocistidis
 Fructus Balsami [*id est, Carpobalsami; pro
 quo etiam succedaneum sumatur, sicut supra
 facta est mentio*]

Gunimi splendidi Seminis Fœniculi
 Cardamomi Indici [*id est, minoris*]
 Seselios tenuis Lachrymæ Nigræ spinæ
 Thlaspios Hyperici Ammios
 Sagapeni ana ʒ iiij.

Castorei Aristolochiæ tenuis
 Seminis Dauri Bituminis
 Liquoris Panacis [*id est, Opopanacis*]
 Centaurii [*videlicet minoris*]
 Chalkanidis pinguis [*id est, Galbani re-
 centis & puri*] ana ʒ ij.

Confice cum vino & melle. Haftenus An-
 dromachus.

Vini autem tantum accipias, quantum li-
 quoribus & succis dissoluendis satis fore
 conieccheris, ut proximè dictum est. Mellis
 verò optimi accipe ℥ xiiij. ʒ iiij. ita detra-
 his Mellis ʒ iiij. de priori Theriaca, quia
 huic defunt Abrotoni & Acori ana ʒ iiij.

Confice autem & hanc Theriacam ut
 proximam.

*Andromachus, Neronis medicus, primùm con-
 didit medicamentum hoc: eiq; declarationem
 heroicis carminibus descriptam, nuncupavit. Sed
 Galenus mutata forma, compositionem reddi-
 dit meliorem.*

TROCHISCI Theriaci, sunt Trochisci
 de vipe-

de vipera siue de Thiro, ut hodie vocant.

MAGMA hedychrom, i. Trochisci hedy-
chroi, quos Auicenna vocat Alindaracaron:
quorum compositionem in tractatu de Trochiscis
inquire.

CYANEÆ, id est, Carneæ vel nigra Gly-
cyrrhiza, seu, ut hodie vocant, Liquiritia, quæ
nigrum colorem habet. Intelligis autem Andro-
machus succum Glycyrrhizæ.

CROCVS Coricius, id est, in Corico Sici-
lia monte nati, hoc est, Croci Orientalis.

LACHRYMÆ Terebinthi Libyæ, id est,
Resina Terebinthina Libyca, in Libya Aphrica
regione nata. Eius loco nos accipere possumus
Laricis resinam, quæ ubique in Germania
Terebinthina improprie vocatur.

MEI loco, quo caremus, possumus accipere
Seseli Creticum, id est, Beruvuriz; aut semen
nigrum & odoratum, quod hodie vocant im-
proprie Amomum, veteres autem Sison.

PHV Ponticum, non est Valeriana vulgaris,
sed ea herba quæ in Hestia vocatur Theriacs-
kraut, vel Gartenseliunck.

MALOBATHRYM non habemus: eius loco
accipe Spica Romana radículas, vel Spica Ro-
mana & Maci ana partes aequales, ut Arabes
precipiunt; vel Cassiam ligneam veram.

RADICIS Gentiadæ, id est, Gentiana, à
Gentio Illyrici rege sic appellata, qui eam pri-
mum inuenisse creditur.

GUMMI splendidi, i. mundi, sinceri & trans-
lucidi,

lucidi, videlicet Gummi Arabici cognominati.

NIGRA vel cerulea spina, est arbor quæ aliàs dicitur Spina Ægyptia: ex qua manat gummi Arabicum. Per lachrymam verò eius Andromachus intelligit succum eius, qui Aicacia vocatur, & fit ex fructu siliquaceo huius spina: eius loco accipimus succum Prunellorum agrestium.

SESELI tenue, est Seseli Creticum, quod ex omnibus speciebus Seselios minimum & tenuissimum est. Germanicè vocatur Berwurtz. Potest tamen etiam vulgare intelligi.

DAUCVS, id est, Daucus Creticus. Hoc loco eius vice accipe semen Pimpinella asstratis, aut radices Seselios Cretici: nihil enim refert, quòd his accipiantur in hanc compositionem. Est autem Seseli Creticum, quod Germ. vocatur Berwurtz.

ARISTOLOCHIA tenuis, est illa quæ apud nos nascitur, longa cognomento: cuius radices gracilitate sua & longitudine imitantur sarmenta vitium.

Theriaca Diatessaron D. Mesue.

R. Gentianæ Baccarum lauri Myrrhæ Aristolochiæ rotundæ ana ℥ ij.
Mellis despumati optimi ℥ ij. id est, ℥ xxiiij.

DIATESSARON, hoc est, ex quatuor simplicibus composita.

ARISTOLOCHIA rotunda, non est illa
radix

radix quam nes Holuvurtz vocamus: sed alia multò maior & tuberosa, intus solida, colore buxi flava, odore & sapore similis Aristolochia longenostri. Afferitur ex Italia & Heluctia.

THERIACA antidotus Diatesflaron ad affectus frigidos, tum cerebri, ut epilepsiam, paralysem, spasmus cynicum: tum ventriculi, ut inflationem, & ab ea dolorem, tardam concoctionem: tum denique hepatis, ut hydropem, cachexiam, obstructionem. Præterea morsui Scorpionis, & potioni veneni confert.

Mithridatium, ex Damocratis Græco carmine in Latinam linguam translatum.

℞. Myrrhæ Arabicæ Troglodytidis
Crocī Agarici Zingiberis
Cinnamomi Spicæ Nardi
Turis [videlicet electi]
Thiaspīos ana ʒ x.
Seseliōs
Opobalsami [aut oleum Garryophyllorum]
Schœni [id est, Squinanthi, ut hodie vocant]
Stœchadis Terebinthinæ Chalbanæ
Costi [videlicet veri & aromatici]
Piperis longi Castorei Pontici
Succi Hypocistidis Styracis bonæ
Opopanacis

Folii

Folii Malobathri recentis [*aut succedanei eius*] ana ʒ viij.

Cassiae nigrae [*lignae aut succedanei eius*]

Polii Piperis albi Scordii

Seminis Dauci Cretici

Fructus Balsami [*aut succedanei eius*]

Cypheos Bdellii ana ʒ viij.

Nardi Celticae purgatae Gummi

Petroselinii [*id est, seminis eius*]

Opii papaueracei

Cardamomi Seminis Foeniculi

Gentianae Foliorum Rosarum

Dictamni Cretici ana ʒ v. boni ponderis

Anisi Arii

Acori [*sive Calami aromatici*]

Phu Sagapeni ana ʒ iiij.

Mei Athamantici Acaciae

Ventris Scinci [*videlicet veri*]

Fructus Hyperici [*id est, summitatum eius*]

ana ʒ ij. ʒ.

Vini quantum sufficit.

Mellis mensuram convenientem.

VINI quantum sufficit, id est, quantum satis est succis & liquoribus dissoluendis.

MELLIS mensuram convenientem.] In

Greco est σύμμιγμα, quod idem significat. Si

autem mellis optimi odorati & dispumati P ix.

ʒ viij. ʒ ij.

CIPHI sunt Trochisci qui ad odorem suffiuntur. eius compositio habetur in tractatu de Trochiscis.

N A R.

NARDVS *Celtica*, est *Spica Romana*.
urgata, id est, à *paleis*, terra & sordibus
indata. Radices eius tantum debent accipi.

ARI, in Græco est *A'ei*, id est, *Arion*,
 quod nomen apud nullum alium auctorem in
Mithridatio scriptum inuenitur. Intelligit au-
 tem *Damocrates* per *Arion*, siue *Arium*, *Aron*,
 id est, *Arum*, quantum ego ratiocinari possum:
 nam *Aron* egregiam facit contra venenata
 medicinam.

ACACIA vera caremus: accipe ergo loco
 eius succum *Prunellorum*, diligenter spissatum;
 ut alium quendam, quem *Doctores* substi-
 tuent. Nos inferius ponemus *Acaciam* succeda-
 ream.

P. C. SCHOL.

Arii.] *Asari* potius legendum esse, ex Græcis
 nonnullis exemplaribus, existimo.

MITHRIDATICVM proximum est
 a qualitate & virtute *Theriaca*, & parum
 differunt: nisi fortè quòd *Theriaca* est
 arum calidior, & potentior contra vene-
 ra serpentum. Curat omnes passiones ca-
 itis virorum vel mulierum, si fuerint ex
 rigiditate: & maxime melancholicis &
 timidis, epilepticis & hemicranicis
 confert, & dolorem supercilii patientibus
 & lachrymantibus oculis: & ad omnia
 capitis vitia vel aurium subuenit. Den-
 tum doloribus & palato, & omnibus vi-
 tiis

F

tiis

tiis oris & maxillarum medetur, si si
 per locum dolentem ponatur, & itidem
 ad modum emplastri ponatur in ten-
 poribus, vnde fit discursio. Synanche
 soluit. Apoplecticis, tussientibus, asthma-
 ticis, hæmoptoicis, peripneumonici-
 & omnibus doloribus qui intra corpus
 humanum fiunt, succurrit: Iliacis, dy-
 sentericis, & lientericis confert; si de-
 tur cum decoctione balaustiorum: Exter-
 sionem humerorum, tetanos siue spasmo-
 patientes, & paralyticos sine mora sana-
 Diaphragmati & hypochondriis subue-
 nit. Renibus & vesicæ opitulatur. Cal-
 culos frangit. Menstrua prouocat, om-
 niaque vitia matricis excludit: Arthriti-
 cam atque Ischias in patientibus, & podag-
 ricis singulare præsidium est. Præcipue
 datur contra venena omnia. Venenatorum
 morsus, siue rabidi canis, seu cuiuscunque
 reptilis, impositum siue bibitum, cum ma-
 gna admiratione emendat. Quotidianis
 riis & quartanariis etiam ante horam ac-
 cessionis cum vino tepido datum, mirifice
 prodest.

*Mithridatium aliud, vt ex Cleopatra
 & Antipatro, Galenus & Aëtius
 exscripserunt.*

℞. Myrrhæ ʒ vij. β. ʒ iiij.
 Nardi tantundem

Croc

Croci	3	vij.	5	iiij.	
Opil	3	iiij.	5	ij.	β.
Styracis	3	v.			
Cinnamomi	3	vij.	5	iiij.	
Castorei	3	vj.	5	j.	
Polii	3	vj.	5	iiij.	
Scordii	3	vij.	5	iiij.	
Zingiberis tantundem.					
Costi	3	vj.	5	iiij.	*
Piperis albi	3	v.	5	ij.	
Piperis longi	3	vj.	5	iiij.	
Seselios	3	v.	5	ij.	*
Abrotoni tantundem					
Petroselini [<i>videlicet seminis</i>]	3	iiij.			
Dauci seminis	3	vj.	5	iiij.	
Cassia	3	v.	5	iiij.	
Turis	3	vj.	5	ij.	
Succi Hypocistidis	3	vj.	5	j.	β.
Nardi Gallicæ	3	iiij.			
Fœniculi seminis	3	iiij.			
Nardi Indicæ	3	iiij.			A
Acori [<i>aut Calami aromatici</i>]					
Phu Pontici		Sagapeni			
Fructus Balsami [<i>aut succedanei eius</i>]					
Hyperici					
Iridis Illyricæ [<i>id est, Irens</i>]	ana	3	ij.		
Rubricæ Lemniæ [<i>leco eius Bolus Lemniti-</i> <i>cus</i>]	3	vj.			
Lumborum Scinci [<i>videlicet veri</i>]					
Cypheos ana tantundem, id est,	3	vj.			
Acaciæ	Gummi	Cardamomi			
	F 2	Pela-			

124 CONFECTIONES

Pelecini ana ʒ ij.
 Thlaspios ʒ vj. ʒ iiij.
 Gentianæ ʒ iiij. Anisi ʒ iiij.
 Rosarum siccarum ʒ iiij.
 Mei Athamantici tantundem
 Schoeni [*id est, Squinanthi*] ʒ vj. ʒ iiij.
 Opopanacis ʒ vj.
 Galbani ʒ vj. ʒ iiij.
 Opobalsami tantundem [*cuius loco, ut su-
 præ, oleum Garryophyllorum*]
 Aristolochiæ [*videlicet rotunda vera*] ʒ j.
 Hyssopi ʒ iiij.
 Marrubii ʒ j.
 Chamæpityos ʒ iiij.
 Libanotidis ʒ v.
 Terebinthinæ ʒ vj. ʒ iiij.
 Mellis Attici quod sufficit.
 Vinum ne addas. Hactenus Cleophrantus
 & Antipater.

Mellis autem despumati optimi & odo-
 rati sume ad totam confectionem lʒ vij. ʒ
 vj. ʒ vj. Vinum ne addatur præcepit Cleo-
 phrantus: idè in aceto sunt dissoluendi
 liquores concreti, ut Sagapenum, Opopa-
 nax & Galbanum. Confice secundum ar-
 tem.

MELLIS Attici nobis copia non fit:
 idèque aliud, quod optimum fuerit, recipien-
 dum erit.

Compositio hac est valdè mendosa in pon-
 deribus apud Aëtium: apud Galenum verdè
 est emen-

est emendatior. Rursum simplicium numero aliqua desunt apud Galenum, quae ex Aëtio confectioni huic restitui. Aëtius hunc Auctorem vocat Cleopatrum, Galenus verò Cleophrantem.

☞ Hic character significat obolum: est autem obolus pondus \varnothing β. scrupuli videlicet dimidium: itaque vj. oboli faciunt 3 j.

NARDVS Indica hoc loco non significat Spicam Nardi Indicam, sed Malobathrum, id est, Folium Indum, quod Nardi est species, & in India gignitur. Aëtius propterea hoc loco pro Nardo Indica habet Phyllon, id est, Folium Indum, cuius loco accipe Casiam ligneam veram, quae Cinnamomo est similis; aut Macis & radicem Spica Romanae ana 3 ij.

ACORI, id est, radicis quae nunc impro-
priè vocatur Calamus aromaticus. *

PELECINI, i. seminis eius. In eius penuria accipe semen Nigella agrestis & cornuta. Est autem omnino similis vera Nigella: nascitur in agris.

LIBANOTIS hic non significat Rosmarinum, sed Angelicam siluestrem minorem. Nam plures sunt Libanotidis species. Semen autem eius accipi debet, quod Cachrys vocatur.

P. C. SCHOL.

Nardi Indicae.] Galenus & Aëtius hic A non Nardi Indica, sed Fol. Malobathri legunt.

F 3

Mithri-

Mithridatium D. Andromachi.

℞. Glycyrrhizæ ʒ vii. β. ∞ iiij.
 Opii ʒ iiij. ∞ ij.
 Castorei ʒ vj.
 Polii ʒ v. ∞ ij.
 Costi ʒ v. ∞ ij.
 Nardi Spicæ ʒ vj. ∞ ij.
 Casia [*videlicet vera*] ʒ v. ∞ ij.
 Turis ʒ vj.
 Sefelios ʒ v. ∞ ij.
 Succu Hypocistidis ʒ vj.
 Acori [*id est, Calami aromatici*] ʒ ij.
 Scordii [*videlicet veri*] ʒ vj. ∞ ij.
 Folii [*loco eius sumatur Macis*] ʒ iiij.
 Gallii ʒ v. ∞ iiij.
 Cypheos ʒ vj. ∞ ij.
 Myrrhæ ʒ vj.
 Croci ʒ vj. ∞ ij.
 Cinnamomi ʒ vj. ∞ ij.
 * Styrcis [*videlicet optima*] ʒ v. ∞ iiij.
 Dauci seminis ʒ vj. ∞ iiij.
 Zingiberis ʒ vj. ∞ ij.
 Phu Pontici ʒ ij.
 Petroselini [*videlicet seminis*] ʒ iiij.
 ∞ iiij.
 Nardi Gallicæ ʒ iiij.
 Fœniculi seminis ʒ iiij.
 Nardi Indicæ ʒ iiij.
 Hyperici ʒ ij.
 Acaciæ

Acaciæ ʒ ij.
 Gentianæ ʒ iiij.
 Anisi ʒ iiij.
 Thlaspios ʒ vj. ʒ iiij.
 Mei Athamantici ʒ iiij.
 Rosarum siccarum ʒ iiij.
 Gummi [*videlicet Arabici*] ʒ ij.
 Cardamomi ʒ iiij.
 Schœni [*id est, Squinanthi*] ʒ vj. ʒ ij.
 Opopanacis ʒ vj. ʒ ij.
 Opobalsami. [*sive olei Caryophyllorum*]
 ʒ vj. ʒ iiij.
 Galbani ʒ vj.
 Scinci [*videlicet veri*] ʒ ij. ʒ ij.
 Terebinthinæ ʒ vj. ʒ ij.
 Vini Chii quod sufficit.

Mellis Attici cocti quod sufficit, hoc est,
 ℞ vj. ʒ iiij. ʒ ij.

FOLIUM duas res significat : Folium
 Nardi videlicet; aut Malobathrum, quod hic
 recipiendum est.

GALLION herba est multis minimisq;
 floribus luteis & odoratis. Est autem spe-
 cies Aspergule : Germanicè vocatur Ran-
 ritzen.

NARDVS Indica hoc loco non significat
 Malobathrum, id est, Folium; sed radicem
 Indica Nardi: nam Nardi partes tres olim in
 usus fuerunt; videlicet Radix, Folium & Spica.
 Antea verò precepit in hanc compositionem
 sumendam esse Spicam Nardi, & Folium,
 F 4 id est,

*id est, Malobathrum: ideò necessariò hoc loco per
Indicam Nardum intelligit radicem Indi
Nardi.*

Esdra antidotus, ex Aëtio.

R. Amomi	℥ xij.
Florum Iunci odorati [<i>id est, florum Schanathi: eorum loco sume summitates Schanathi</i>]	℥ ix.
* Pyrethri	℥ vj.
Croci	℥ xxxvj.
Cinnamomi	℥ vj.
Myrrhæ Troglodyticæ	℥ xij.
Styracis calamitæ	℥ xvij.
Petroselinî	℥ iij.
Seminis Dauci	℥ iij.
Tragacanthæ	℥ vj.
Succi Hypocistidis	℥ ix.
Iridis Illyricæ [<i>id est, Ireos</i>]	℥ xv.
Seminis Fœniculi	℥ vj.
Bdellii	℥ ix.
Turis	℥ j.
Sulphuris viui	℥ vj.
Seminis Hyoscyami albi	℥ xxvij.
Cassie lignæ [<i>aut succedanei eius</i>]	℥ ix.
Seminis Papaveris	℥ xxx.
Spicæ Nardi	℥ xij.
Seminis Rutæ	℥ iij.
Seminis Ocimi	℥ iij.
Rhois Culinarij	℥ lv.
Seminis	

Seminis Anethi	℥ vj.
Asari [<i>id est, radicum eius</i>]	℥ j.
Seminis Cardamomi	℥ vj.
Opii	℥ xxvij.
Euphorbii	℥ vj.
Piperis nigri	℥ xxx.
Rosarum siccarum	℥ ix.
Phylli [<i>id est, Folii</i>]	℥ xij.
Opobalsami [<i>sine olei Garyophyllorum</i>]	℥ xxiiij.
Ventris Mergi	℥ vj.
Iaceæ	℥ xij.
Lycii Indici	℥ xij.
Garyophylli	℥ xij.
Stercoris reperti in aluo Mergi	℥ vj.
Rheu Pontici [<i>i. Rhabarbari</i>]	℥ xij.
Mei Athamantici	℥ vj.
Floris Nerii	℥ iiij. β.
Terræ Cimoliæ	℥ xij.
Succi Artemisiæ	℥ xx.
Foliorum Seridis [<i>i. Cichorea</i>]	℥ ix.
Spicæ Celticæ	℥ xij.
Castorei	℥ iiij.
Costi	℥ xij.
Gentianæ	℥ xij.
Confectionis Hedychroi	℥ ix.
Anisi	℥ vj.
Sisonis	℥ xviiij.
Thymiamatis Ammoniaci	℥ xij.
Foliorum Citri	℥ xij.
Vini veteris odorati quantum satis	
F 5	fuerit

130 CONFECTIONES

fuerit succis & liquoribus resolucendis. Mellis despumati optimi, vt Aëtius scribit, interprete Cornario, libras v. aut vj. Sed nos singulis specierum vnciis ternas vncias mellis adiiciemus. Itaque summe mellis despumati odorati quàm optimi ℥vj. 3 vij. 3 ij β.

Arida omnia minutissimè contundito. Opium verò & Myrrham, Hypocistidem, Bdellium, Lycium, Ammoniacum in vino dissoluito. Tragacantham deinde seorsum per se affuso vino dissoluito. Deinde omnia simul misceto, addendo etiam deaspumatum Artemisię succum. In vniuersum hanc confectionem eodem modo conficies, quo Theriacam: & eodem modo dimittenda est vt efferuescat, non omnino repleto vase.

NICOLAUS Alexandrinus duas habet Esdra compositiones; alteram magnam, alteram verò Hispaniensis cognomento: sed quia confusa & indigesta tantum sunt moles, & numerosis, & nulla harmonia coeuntibus simplicibus constat, ideò nolimus eas hic ascribere, his duabus eius receptis paulò exactiùs compositis contenti.

RHOIS Culinarii, id est, Sumach; vide. licet pulpa eius, sine osseis seminibus.

PHYLLI, id est, Foliis. Cuius loco ponatur Spica Romana, Macis ana 3 vj.

TERRA Cimolia. Eius loco accipe Bolum verum preparatum.

SISON

SISON est semen illud nigrum quod Apio simile est; & vocatur improprie Amomi semen.

THYMIAMA Hammoniacum, i. Gummi Hammoniacum, quod vocant Ammoniacum.

VENTRIS Mergi, id est, Stomachicis Mergi. Germanicè vocatur ein Taucher.

NERION, i. arbor Oleander: pro cuius toribus accipe radices Vincetoxici. Legitur tiam in Aëtio rosarum Rhododaphnes; sed idem est quod flos Nerii: ideò alterum tantum eorum posuimus.

Mirificè contra lethalia venena prodest: aliosque vsus multos habet, quos apud Aëtium libro 13. cap. 101. Paulum libro 7. cap. 11. Actuarius in libro De comp. medic. reperies.

Esdra Antidotus ex Aëuario.

R. Mameræ	℥	j.	
Amomi [eius loco sume nostrum Calamum aromaticum]	℥	ij.	
Iunci odorati [id est, Squinanthi]	℥	β.	
Pyrethri	Θ	viiij.	
Croci	℥	j.	
Myrrhæ	℥	iiij.	
Styracis	℥	β.	Θ ij.
Petroselinū	Θ	iiij.	
Tragacanthæ	℥	j.	
	E	6	Succi

Succi Hypocistidis ʒ iij.
 Ireos ʒ β. ʒ ij.
 Seminis Fœniculi ʒ j.
 Folii [aut succedanei eius] ʒ iij.
 Radicis Ponticæ [id est, Rhabarbari]
 Rosarum siccarum Glycyrrhizæ
 Florum siluestris Punicæ
 Cinnamomi ana ʒ iij.
 Nardi Celticæ ʒ j.
 Mellis despumati ℥ vj. ʒ ix. ʒ vi.

Myrrham & Hypocistidem in vino dissolue modico: Tragacantham verò per se etiam dissolue; & confice secundum artem. Actuarius ponit absurdum conficiendi modum, quem non sequimur.

*Mamera loco sume Doronicum Romanum
 Florum siluestris Punica, i. florum Balaustrorum.*

CONDITA.

Caro Citri Cortices Citri Flores Citri
 Arantia integra Cortices Arantiorum
 Flores Arantiorum Limones.

Limones conditi frequenter pro Chebulis conditis venduntur. Sed facile deprehenditur dolus. Nam Chebuli unum tantum magnum & lignosum habent nucleum; Limones verò multa semina, &c. (lani)

Chebuli Myrobalani Bellerici Myrobalani
 Emblici Myrobalani Citrini Myrobalani
 Indi

Indi Myrobalani.

Omnes quinque Myrobalanorum species iam afferuntur ex India condite.

Nuces moschatę integrę, vt ex India afferuntur.

Iuglandes Citonia Mespila

Pyra moschatella Cerasa

Pruna siluestria Garyophylli

Piper in racemis, vt ex India affertur.

Calamus aromaticus [*id est, verus Acorus*]

Galanga Zingiber Enula campana

Secacul [*id est, Siser: Germanicè Gritzelmorn, Clingelmorn*]

Eringium

Pimpinella [*nostra*]

Crethami [*agrestis radix.*]

CRETHAMVS *agrestis herba est, Eringii propemodum foliis: Germanicè vocatur Sichelmoren, & Sichelkraut: nascitur in agris pinguibus.*

Omnia diligenter Saccharo clarificato condiantur secundum artem.

CONSERVÆ.

Anthos [*id est, flos Rosmarini*]

Boraginis Buglossi

Cichorii Fumi terrę Lauendulæ

Maioranę Melissę Menthę

Nymphę seu Nenupharis

F 7

Primulę

Primulae veris. *Primula veris, idem est quod herba Paralysis.*

Rosarum	Paeoniae
Violarum	Cardui benedicti
Liliorum conuallium	
Florum Tiliae	Euphrasiae
Sambuci	Hyssopi
Betonicae	Scabiosae
	Salviae.

Flores minutissimè incidantur : & singulis libris florum addantur Sacchari albißimi libræ duæ; videlicet qui humidi & mucilaginosi fuerint, vt Boraginis, Buglossi, &c. Siccioribus verò, quales sunt Anthos, Lauendulae, Maioranae, Melissa, Salviae, Menthæ, & similibus, addantur Sacchari albißimi libræ duæ & semis.

Diacitronium simplex.

℞. Carnium Citoniorum vapore aquae dulcis resolutorum, & ad spissitudinem coctorum,

Sacchari albißimi despumati, & ad spissitudinem iustam cocti ana ℞ viij.

Coquantur ad solidam consistentiam; & extendatur in tabulam feruens massa: refrigerata in partes incidatur. Quidam octo ℞ carniū Citoniorum addunt sex ℞ Sacchari clarificati.

Poteris etiam ita facere.

℞. Ci-

℞. Citoniorum excorticatorum & ab inferioribus mundatorum ℥ viij. Sacchari clarificati ℥ iij. Coque Citonia super vaporem aquæ dulcis : deinde vnâ cum Saccharo ad iustam spissitudinem coque.

Peculiare remedium est fluxus, vel vomitus: quoniam stipticat [seu adstringit] & corroborat membra collapsa, debilia. Confortat stomachum, virtutem retentiuam & digestiuam: & summopere excitat gustum. Sed ad fluxum datur ante cibum; & ad vomitum compescendum, post cibum.

Diacitonium compositum

D. Nicolai.

℞. Carnium Citoniorum comminutarum & coctura inspissatarum ℥ iij.

Mellis despumati ℥ iij.

Coquantur simul ad iustam consistentiam: & postquam ab igne deposueris, antequam refrigerentur, insperge subsequentes species in tenuissimum puluerem contritas:

Cinnamomi ℥ j. β.

Zingiberis ℥ j.

Piperis

Galangæ ana ℥ β.

Garyophyllorum

Nucis moschatæ ana ℥ iij.

Spicæ Nardi Ligni Aloës Macis
Carda-

Cardamomi ana ʒ ij.

Zedoariæ ʒ j.

Extendatur tota massa in tabula marmorea, prius rosacea aqua inuncta, in qua aliquid Moschi dissolutum fuerit.

Et quando ut alium soluat conficere volueris, antequam in tabula marmorea extendatur, in vnamquamque lib. adde Scammoneæ ʒ β. quæ bene trita subigatur composito.

MEL habet Nicolaus : ego potius consulerem ut Saccharum loco mellis adderetur.

Quedam exemplaria habent Mellis lib. iij. Sed Nicolai exemplar, quod ad meas manus peruenit, habet lib. iiij. Nam necesse est etiam, ut species suum conseruatium habeant.

Hoc est calidius, & melius ad ea quæ diximus. Resoluit ventositates, remouet foetorem corporis, restituit pristinum colorem; & magis restaurat.

Diacitonium è succo Citoniorum.

℞. Succu Citoniorum despumati ℥ xij.

Mellis optimi despumati

Sacchari albissimi clarificati ana ℥ ij.

Coquantur simul ad iustam spissitudinem: deinde ab igne remotis & adhuc repentibus insperge subsequentium specierum pulueres minutissime tritos, & per cribrum excussos:

℞. Cinna-

℞. Cinnamomi

Nucis moschatæ ana ℥ iiij.

Caryophyllorum Zingiberis

Galangæ ana ℥ ij.

Radicularum Nardi Celticæ

Piperis nigri Ligni Aloës

Macis Zedoariæ Cubebarum

Cardamomi ana ℥ j.

Confice secundum artem.

SYRVI.

Syrupus de Duabus radicibus.

℞. Radicum Petroselinii

Radicum Fœniculi ana ℥ iiij.

Aquæ quantum sufficit

Sacchari clarificati ℞ ij.

Coquantur secundum artem.

VISCERA obstructione laborantia
referat.*Syrupus de Quinque radicibus.*

℞. Radicum Apii Radicum Fœniculi

Radicum Petroselinii Radicum Rusci

Radicum Asparagi ana ℥ iiij. A

Aquæ quantum sufficit.

Sacchari ℞ iiij.

Coquantur secundum artem.

CON-

CONFERT febribus pituitosis & biliosis, & iis incipientibus.

P. C. SCHOL.

A Ana ζ iiij.] Sacchari quod in hunc Syrupum recipitur, perpenſa quantitate, nimiam non eſſe hinc radicum cuiusque unciarum quatuor aſſumptionem, indiſtriẽ Cordus exiſti-
mauit; Fuchſio quamquam ſecus videatur.

*Syrupus Acetofus ſimplex, ex
deſcriptione Meſue.*

R. Aceti vini P iiij.
Sacchari clarificati in aqua P v.
Coquantur ſecundum artem.

Eſt communis ad omnem materiam. Digerit choleram, phlegma & melancholiam: rationeque acetii attenuat craſſos humores, incidit viſcoſos, duros mollit, ineptos euellit: vbique penetrat, oppilationes aperit, prouocat vrinam, putredini reſiſtit, & corrigit malitiam humorum: idcirco in febribus peſtiferis iuuat: Sed ratione remiſſe frigiditatis, tenues & ſubtiles humorum partes inſpiſſat, adæquat calorem, refrigerat, viſcera lenit, & ſitim fedat.

*Syrupus Acetofus compoſitus,
D. Meſue.*

R. Radicum Fœniculi Radicum Apii
Radicum Endiuiræ ana ζ iiij.
Seminis

Seminis Anisi Seminis Fœniculi
 Seminis Apii ana ʒ j. *
 Seminis Endiuix ʒ iiij.
 Quæ quantum sufficit. *

Sacchari optimi ℥ iiij.
 Ceti acerrimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

BILEM crassam & auulso difficilem, ac
 tuitam incîdit, terget: obstructa hepa-
 s, lienis, renum aperit.

Syrupus acetositatis Citri.

℞. Acetositatis mali Citrei per pannum A
 destillatæ ℥ vj.
 Sacchari albissimi ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

RARO habent Pharmacopola Syrupum
 acetositatis Citri verum: nam plerumque ven-
 litur pro eo Syrupus Citreorum conditorum.
 Porro cùm quis bene conficere voluerit, oportet
 ut per filtrum aut pannum destilletur acetosi-
 tas Citreorum, sine ulla vi aut expressione:
 alioqui coagulatur, cùm refrixerit, Syrupus.

P. C. SCHOL.

℞. Acetof. mali Citrei ℥ vj. &c.] ℥ vj. A
 Fuchsius, & Sacch. lib. v. legi vult. Verùm
 cùm Cordus in hac Syrupi descriptione Mesuem
 non sequatur, ut conferenti liquebit, sed suo
 Marte eandem descripserit; frustra conqueri-
 tur

tur Fuchsius. Mesnes autem nomen in scriptio-
eius additum fuisse, ut & Syrupo de Agrest
scriptoris vitio id factum fuisse hinc liquet.
Quare utrobique id ipsum à me deletum est.

Æs t v m ac feruorem bilis flauæ, f-
briumque ardentium & pestilentialium
mitigat: sitim quoque vehementem r-
stinguit.

Syrupus acetositatis Limonum.

Rx. Acetositatis Limonum maturorum
per filtrum destillatæ ℞ vj.
Sacchari albissimi ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

VEHEMENTIUS infrigidat & pen-
trat, quàm Syrupus acetositatis Citri:
valet contra putrefactionem, contra ven-
mes, vehementiam caloris febrilis,
alios crudos humores.

*Syrupus Aranciorum
acetosorum.*

Rx. Succus Aranciorum acetosorum per pan-
num aut filtrum destillati ℞ vj.
Sacchari albissimi ℞ iij.

Coquantur secundum artem.

Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo
Aranciorum dulcium.

Syrupus

Syrupus de Agresta.

Agrestæ l' v.
 Sacchari clarificati l' iij.

Coquantur secundum artem.

AGRESTA est succus unarum immatura-
 rum; qui Græcè vocatur Omphacium; & in-
 status servatur. Hoc autem loco recipienda
 Agresta nondum ad spissitudinem decocta.
 Agresta exprimi debet ex generosissimis uvis,
 sed nos paulò ante maturitatem.

IN magnis æstibus ad sitim restinguen-
 dum mirificè confert: Vomitus & alui
 fluxum biliosum sistit: Febris bi-
 osis succurrit: Gravidarum vomitus
 iam reprimat, ac ventriculum earundem
 emat: Venenisque aduersatur.

Syrupus de Pomis, D. Mesue.

Succi pomorum dulcium
 Succi pomorum acetosorum ana l' v.

Coquantur, despumantur & colentur:
 deinde adde

Sacchari l' iij.

Coquantur secundum artem.

Succus exprimendus est ex optimis pomis siue
 malis, qualia sunt quæ Vveynlingen, siue
 Vveynserlen vocantur, in acetosorum genere.
 & dulcibus etiam sapidissima sunt eligenda.

COR

CORIMbecillum roborat: ob id sy-
copen & cordis tremorem sanat.

Syrupus Granatorum dulcium,
D. Mesue.

℞. Succī Granatorum dulcium 1' v.
Sacchari albiſſimi 1' iij.

Coquantur secundum artem.

MALÉ hodie faciunt Syrupum Granat-
rum, indifferenter cum dulcibus acetosa Gr-
nata miscentes. Oportet enim utrumque Sy-
pum tam acetosum, quàm dulcium Gran-
torum seorsim conficere: nam diversis morbi-
morborumq; accidentibus medentur.

SITIM, tussim, & pleuritidem iuua

Syrupus Granatorum acetosorum,
D. Mesue.

℞. Succī Granatorum acetosorum 1'
Sacchari albiſſimi 1' iij.

Coquantur secundum artem.

FEBRES biliosas, & quæ ex pituitol-
flammam multam invehunt, iuvat.

Syrupus Dinarīi, sine Byzantinus
simplex, D. Mesue.

℞. Succī Endiuīæ Succī Apī ana 1'
Succī

Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut silvestris
ana l' j.

Succi depurentur, & despumentur, dum
maneant l' iiij.

Sacchari optimi l' ij. β.

Coquantur cum facilitate, donec fiat
rupus.

*Q V I D A M differentiam faciunt inter Sy-
rupum Dinarium & Byzantinum seu de Byzanti-
is alterum simplicem, alterum compositum
dicentes. Sed nos simplicem & compositum nomine
distinguimus, utrumque Dinarium seu Byzanti-
num appellantes.*

HUMORES crassos & lentos incidit
que extenuat: obstructions aufert; mor-
boque regio succurrit.

*Syrupus Byzantinus compositus,
D. Mesue.*

Succi Endiviæ veræ

Succi Apii ana l' ij.

Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut silvestris
ana l' j.

In succis decoquantur

lorum Rosarum ʒ ij.

Glycyrrhizæ ʒ iiij.

Seminis Anisi Seminis Fœniculi

Seminis Apii ana ʒ iiij.

Spicæ

Spicæ Nardi Indicæ 3 ij.
 Colaturæ adde Aceti 1' ij.
 Sacchari albiſſimi 1' ij. β.

Coquantur secundum artem diligenter

SYRUPVS Byzantinus compositus, et
 efficacior simplici.

*Syrupus de Artemisia D. Ioan.
 Matthæi de Gradi.*

℞. Artemisiæ M ij.
 Pulegii Calaminthæ
 Origani Melissæ
 Dictamni Cretici Persicariæ
 Sabinæ [id est, Sauina]
 Amaraci [hic accipe Maioranam]
 Chamædryos
 Perforatæ [id est, Hyperici]
 Chamæpityos [id est, Iuxta arthritica]
 Comarū Matricariæ Centauræ minoris
 Rutæ Beronicæ
 Buglossæ Radicum Fœniculi
 Radicum Apii Radicum Petroselin
 Radicum Asparagi Radicum Brusci
 Radicum Saxifragiæ [eius loco accipiantur
 radices Pimpinelle]
 Radicū Enulæ Campanæ Radicū Cype
 Radicum Rubiæ tinctorum Radicū Irec
 Radicum Pæoniæ ana M j.
 Baccarum Iuniperi Seminis Ligustici
 Seminis Petroselini Seminis Apii
 Seminis

Seminis Anisi Seminis Nigellæ
 Carpobalsami [*aut succedanei eius*]
 Costi Radicum Afari
 Radicū Pyrethri Casie lignee aromaticæ
 Cardumeni Calami aromatici

hu [*id est, radice eius*] ana ʒ β.
 quæ quantum sufficit Sacchari ꝑ iiij.
 Coquantur omnia magnâ diligentia,
 secundum artem, ne plus quàm necesse
 sit aromata bulliant.

*Pro vulgari & falso Dictamno hic debet
 poni Dictamnus Creticus; qui singulariter fa-
 cit ad ea ad quæ Syrupus hic est compositus.*

SAXIFRAGIAM Itali vocant eam her-
 bam quam nos Pimpinellam appellamus: &
 huius radix hic debet accipi.

MEDETVR passionibus matricis, &
 retinet eam in proprio loco. Resoluit fri-
 giditates, ventositates, & dolores. Cor-
 roborat nervos, aperit poros, sangui-
 nem corrigit, menstruis imperat, & pro-
 vocat.

*Syrupus de Absinthio maior,
 D. Mesue.*

R. Absinthii Romani l' β.
 Rosarum rubearum ʒ ij.
 Spicæ Indicæ ʒ iiij.
 Vini clari veteris & optimi
 Succi Cydoniorum ana l' ij. β.
 G Mace.

Macerentur in vase marmoreo aut fictili denso per noctem vnam ; deinde decoquantur.

Colaturæ adde Sacchari ℥ ij.

Confice secundum artem.

AB S I N T H I V M Romanum, idest, Absinthium Ponticum, gustu adstringens, & aromaticum : vulgare autem dicitur Rusticum Absinthium.

VENTRICVLVM roborat & iecur aliâque instrumenta nutritionis, appetentiamque excitat. Contra regium morbum prodest. flatus discutit, humoresque per viinam pellit.

Syrupus Infusionis Rosarum.

℞. Infusionis Rosarum ℥ v.

Sacchari clarificati ℥ iiij.

Coquantur cum facilitate.

EST conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor: resistens putredini, conueniens tempore pestilentiaë, & resistens venenositati.

Syrupus Infusionis Violarum.

℞. Infusionis Violarum ℥ v.

Sacchari clarificati ℥ iiij.

Coquantur.

Coquantur cum facilitate.

FEBRIBVS acutis, iecinoris & cor-
dis caloribus, asperitati gutturis, morbo
interali, tussique aridæ succurrit: sitim
extinguit, aluumque emollit.

Infusio Rosarum Mesue.

2. Foliorum Rosarum ℥ j ponantur in
orceo angustiori, & infunde illis aquæ
salidæ lib. iij. aut quantum sufficit, ut ma-
ceant. Macerentur per horas viij. aut xij.
obstructo scilicet orificio: deinde exprime
leniter, & excola infusionem, abiectis
Rosis, & iterum inde recentes rosas, &
infusionem excolatam calefac; & infun-
de rosas: ac obstructo orificio vicei in ca-
lido loco dimitte per horas viij. vel xij.
Postea rursus excola, & colaturam in-
funde aliis recentibus Rosis; & tertio di-
mitte. Et si efficaciorē facere volueris,
etiam quarto recentes Rosas in eodem di-
luto recalefacto macera. Ac postremo, ad-
dato saccharo, Syrupum facito.

Porro quidam tundunt Rosas, quidam verò
integras ponunt. Et tuse quidem celerius vim
suam & colorem in aquam deponunt, ac mi-
norem locum occupant. At Viola cum tundun-
tur, aliquam herbaceam & tædiosam acrimo-
niam acquirunt, hoc est, sy kriügen einen grü-
senden geschmack im mund. Quare consulantur

hac de re Doctores medici.

*Hac infusio dicitur alio nomine Mucharum
& Mucharum, siue ex Violis siue Rosis fiat.*

*Mesue tantum bis iubet Rosas infundi: me-
lius vero est ut saepius recentes abiectis subli-
tuantur.*

Infusio Violarum.

*Infusio Violarum eodem modo fit quae
Rosarum Infusio.*

*Syrupus de Succo Fumi terræ maior
D. Mesue.*

℞. Myrobalanorum Citrinorum

Myrobal. Chebulorum ana ʒ xx

Florum Boraginis Florum Buglossæ

Florum Violarum Absinthii

Cuscutæ ana ʒ j.

Glycyrrhizæ Rosarum ana ʒ iiij

Epithymi Polypodii ana ʒ viij

Prunorum enucleatorum

Passularum enucleatarum ana l ʒ.

Tamarindorum

Pulpæ Casiæ fistulæ ana ʒ ij.

Aquæ p x.

*Coquantur secundum artem ad tertiās
deinde cola: & colaturæ adde*

Succi Fumi terræ depurati

Sacchari albissimi ana p iiij.

Coquan

Coquantur lento igne ad iustam consistentiam, & reponere.

Meum exemplar manu scriptum habet Prurum l'ß. quemadmodum passule.

Syrupus Fumariæ maior ventriculum hepar roborat, obstructions aperit: uris morbos, præcipuè ab humore falso elvstos natos, vt psoriam, lepram, impetiginem, serpiginem curat.

Syrupus de Mentha maior
D. Mesuæ.

℞. Succi Citoniorum muzorum

Succi Citoniorum dulcium

Succi Granatorum acetosorum

Succi Granatorum dulcium

Succi Granatorum muzorum ana l' j. ß.

In succis macerentur per horas xxiiij

Menthæ siccæ l' j. ß.

Rosarum rubearum ʒ ij.

Coquantur deinde cum facilitate, vsque ad medietatis consumptionem: colentur & colaturæ adde

Mellis vel Sacchari l' ij.

Coquantur ad perfectionem: & cum reponis, aromatiza cum Galia moschata vera trita, & in sindone ligata, atque ex orificio vasis suspensa.

MUZORVM, id est, in vini saporem
G 3 acescen-

acescentium : nam *murus* sapor de dulcedine
& acetositate aliquid habet.

Notandum est, si quis cum melle velit hunc
Syrupum conficere, ut accipiat mel odoratum
aromaticum, quale è *Dantisco* aduehitur: vel
tale aliud; ut est quod vocant *virginium mel*,
& *Saxones Krushonich*, quasi aromaticum
mel; & non illud vulgare, flatuosum.

Ventriculum frigidum roborat: ob id
nauseam, vomitum, singultum, fluorem
alui sedat.

Syrupus de Mentha minor
D. Mesue.

R. Succu *Menthæ* depurati l' j.
Succi *Granatorum* dulcium
Succi *Granatorum* acetosorum, ad medie-
tatem coctorum

Sacchari vel Mellis ana l' j.

Coquantur sensim secundum artem.

In hoc quoque Syrupo notandum est, quod
in proximo Syrupo de *Mentha* maiore diximus
de melle.

Eandem ferè cum superiore facultatem
habet.

Syrupus de Calamintha D. Mesue.

R. *Calaminthæ* domesticæ
Calaminthæ silvestris ana ʒ ij.
Ligu-

guftici [*feminae fcilicet*]

auci [videlicet seminis eius]

chœnanthi ana 3 v.

affularum enucleatarum 1' β.

cellis l' ij.

quæ quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

MEL cum additur huic Syrupo, tunc oportet esse optimum & aromaticum mel, ut antea dixi. Idq; in omnibus Syrupis & Oxymelibus observandum est.

POTEST etiam cum Saccharo fieri hic Syrupus, quia pauci optimum & aromaticum mel emere & expetere consueverunt.

DOMESTICA Calamintha, est quæ in
agris & cultis locis nascitur: & vulgò voca-
tur Kornminze.

SILVESTRIS autem Calamintha, est
qua in incultis locis & montibus prouenit, &
appellatur Calamintha montana.

LIENOSIS plurimum confert, quibus durus est lien & pæne irresolubilis; & his qui frigida viscera habent, & asthmate laborant; præsertim in senibus, & in habentibus antiquas tusses. Si quis enim vel pectus, vel ventriculum, vel intestina crassâ, tenaci & irresolubili materiâ plena habeat, hoc Syropo sanatur.

Syrupus de Succo Endiviae simplex.

℞. Succi Endiuizæ depurati l' viij.

G 4

Sacchari

Sacchari Tabarzeth l' v. β.

Coquantur secundum artem.

ENDIVIA vera, est herba sativa, caulibus, foliisque Cichorea similibus, maioribus tamen pinguioribusque, flores etiam similes sunt Cichorea. Allatum est semine eius ex Italia, & iam multis in locis apud nos feritur.

Valet principaliter ad omnes supercalefactiones hepatis, & aliorum membrorum nutritiuorum: & in morbo laterali maximè conuenit.

Syrupus de Endivia compositus.

℞. Endiviæ recentis Boraginis Scariole
Hepaticæ Melissæ Buglossæ Lactucæ
Eupatorii ana m. j.

Seminum frigid. maiorum ana ʒ j.
Santali albi Santali rubri ana ʒ j.
Florum cordialium ana ʒ iiij.

Coquantur secundum artem, in sufficienti quantitate aquæ: deinde cola, & colaturæ adde

Succi Endiviæ depurati l' j.

Vini Granatorum ʒ iiij.

Sacchari albi l' iiij.

Fiat syrupus secundum artem.

VALET præcipuè ad supercalefactiones hepatis, cordis, & aliorum membrorum nutritiuorum: & generaliter confert cuilibet complexionis calidæ, & est aperitiuus

ius oppilationum, & confortatius membrorum debilitatorum à mala complexione calida: est etiam digestius mariarum cholericarum acutarum.

*Syrupus de Cichoreo cum Rhabarbaro,
Nicolai Florentini.*

℞. Endivię domesticę
Endivię silvestris Cichorii
Taraxaci ana m ij.
Cicerbitę Hepaticę Scariolę Lactucę
Fumiterrę Lupulorum ana m j.
Hordei non excorticati ℥ ij.
Vesicarię [id est, Alkekengi]
Glycyrrhię Capillorum Veneris
Ceterach [id est, Asplenti]
Polytrichi Adianthos ana ℥ vi.
Radicum Foeniculi Radicum Apii
Radicum Asparagi ana ℥ ij.

Coquantur in aqua sufficienti, & percolentur; deinde cum Sacchari albi l' iij fiat Syrupus.

Pro cuius vnaquaque libra inter coquendum adiiciantur

Rhabarbari optimi ℥ iiij.
Spicę Nardi ℥ ij.

Colligato in linteolo raro; quod saepe B exprimatur, dum Syrupus consistentiam iustam nanciscatur.

G s

p. c

P. C. SCHOL.

A l' iij.] Hanc Sacchari quantitate huic Syrupo esse indendam, eamq̃ abunde satis esse dicimus & censemus: quamquam Commentatorum nullus, quod sciam, huic mulsi vsus Syrupi pondus vllum exprimat Colonienſiū Diſpenſatoriolo excepto: quod cum l' v. & 3 viij. ſumendas putat, medicamentum nimis imbecille tanta copia reddit: augere & malum, quòd Manipulos viridiorum herbarum (quales hic requiruntur) ſemuncialium tantum, vſ ſunt puerorum, conſtituat.

B Caterum Spica 3 ij. hic quoque ſufficere debent.

VALET contra omnem materiam venenofam, in alterando & mundificando eam, & propriè in anthrace & ſimilibus valet & in febre peſtilentiali. Confortat cor & nutritiuum, mundificat materias peccatam & ſecceſſum, & facit appetere cibum, ac inducit ſomnum.

*Syrupi è Cichoreo Nicolai Florentini, emendata deſcriptio
M. De Lobel.*

ET SI quorundam popularium medicantium, pharmacantium, ac medicaſtrorum fatalis inſcitia fallere ſolita, nulla monita in dignoſcendis non conſideranda utilitatis, Seridis, ſive Intubace; generis cuncti

rectis familiis, audierit; ut non tantum Medicos
tissimos & pharmacopæos probos eluserit, sed
am multis ansam dederit in hunc usque diem, ma-
o agrotantium dispendio, parandi Syrupum e Ci-
choreo D. N. Florentini eum Rhabarbaro e solo succo
chorei satiui, vel aliquot horum refrigeranti-
s temperatum herbis, quæ sane instituto Nicolai
orentini minimè respondebant (præscribitur enim
us Syrupus non modò ad refrigerandum hepar &
scera; sed etiam tum ad hepatis, stomachi, splenis,
iorumque viscerum æstuationes ac inflammatio-
es, tum ad referandas obstructions in febribus
liosis, & ad somnum conciliandum) veruntan-
en amicis quorundam petitionibus, (quia multi
quotidiani usus hic utilissimus Syrupus) negle-
tis herbarum confusis, ambiguis, & barbaris nomi-
ibus, eius secundum intentionem Nicolai, descri-
tionem sic castigamus, secuti ordinis seriem Ron-
telletii.

℞. * Hordei integri ℥ iij. A

Radicum Asparagi

Fœniculi

Paludapii [i. Apii Palustris] ana ℥ ij. B

Glycyrrhizæ ℥ j.

Intybi domestici vel satiui [id est, Endiuia C
vulgatissima, latifolia, officinis vulgò Sca-
riola vocata]

Intybi sylvestris [i. Endiuia sylvestris offici-
narum. perperam recentioribus Lactuca sylvest.]

Cichorei

Taraxaci [i. Dentis leonis] ana M ij.

Cicerbitæ siue Sonchi lenis

Hepaticæ siue Lichen. s Lactucæ satiivæ

Lactucæ sylvestris soporiferæ Fumi terræ D

Lupulorum ana m j.

G 6

Adian.

A dianthi [*sine Capillorum Veneris*]

Polytrichi

Asplenii [*sine Ceterach*]

Cassithæ ana ʒ vj.

Seminis Malicacabi [*sine Alkekengi*] ʒ iii
si recens fuerit; alioqui sufficiet me-
dia quantitas.

Coquantur in aquæ & succi Cichoreæ
æquis partibus in balneo aperto; deinde
exprimantur, clarificentur, & syrupizen-
tur in eodem balneo & vase lapideo au-
vitreo; additis lib. iiij. paulo plus, minus
Sacchari albi.

Sub finem ebullitionis adduntur Rha-
barbari electi ʒ iiij. & Spice Nardi ʒ iiij.
nodulo exceptorum & ligatorum.

* Preponuntur quæ diutius coquenda.

A ʒ iiij.] ex veteri exemplari cum Rondeletio
legimus.

B Palud.] magis aperit quàm Apium hor-
tense.

C Intubi dom.] omnia exemplaria inserunt
Scariolam: quæ tamen eadem est cum Eridinio
aut Intubo domestica.

D Lactuc. fil.] Lactucam agrestem officina
Belgicæ Antuerpiæ facilè sibi procurabunt; ubi
semel sata maximo & importuno proventus
luxuriat; potissimum in hortis nostris & opti-
morum pharmacopœorum Ioannis Coene, Oli-
uerii Driesch, & pia memoria P. Coude-
bergi.

Oxyac.

Oxysacchara simplex, D. Nicolai.

℞. Sacchari albi ℥ j.

Succi Malorum Granatorum acetosorum

℥ viij.

Aceti ℥ iiij.

Coquantur cum facilitate ad ignem in vase stanneo, dum Syrupi crassamentum adsciscat.

Digerit materias cholericas phlegmaticas, quæ grauant stomachum & præcordia, & faciunt tertianas duplas inordinatas, quas vocant erraticas, & similes quartanis duplis.

*Oxysacchara composita D. Nicolai
Præpositi.*

℞. Capillorum Veneris

Linguae ceruinæ [*id est, Phyllitidis*]Scolopendriæ [*id est, Asplenii*]

Polytrichi Hepaticæ Violarum

Radicum Fœniculi Radicum Rusci

Radicum Asparagi

Radicum Graminis ana ℥ j.

Hoc modo confice : In succo Malorum *
Granatorum, herbas & radices triduum
macerato: quarto die parum bullire finito,
cum forti expressione percolato. Postremò cum
Sacchari ℥ ij. ex arte, ad iu. *

G 7

stam

Itam crassitiem concoquito.

Concalefacta corpora potum iuuat: longis febribus, quas sanguis aut bilis creauit, & calori iecinoris auxilio est: & lienis obstructions tollit.

Syrupus de Iuiubis D. Mesue.

℞. Iuiubarum numero LX.

Violarum

Seminis Maluæ ana ʒ v.

Capilli Veneris Hordei mundati

Glycyrrhizæ ana ʒ j.

Seminis Cytoniorum

Seminis Papaueris albi

Seminis Melonum

Seminis Lactuce

Tragacanthæ ana ʒ iiij.

Aquæ fontis ℥ iiij. aut q. s.

Sacchari ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

SYRUPUS iste confert raucitati, tussi & pleuriti di.

Syrupus Violarum D. Mesue.

℞. Violarum ʒ ij.

Seminis Cytoniorum

* Seminis Maluæ ana ʒ viij.

Iuiubarum

Sebesten ana numero xx.

Aquæ

quæ Cucurbitæ quantum sufficit.

Sacchari l' j. ß.

Coquantur secundum artem.

CUCURBITA debet destillari cum adhuc est tenera, antequam indurescere incipiat.

Prodest pleuritidi & tussi à causa calida.

Syrupus de Succo Violarum.

℞. Violarum recentium iamiam lectarum quantitatem satis magnam, & decerpe ab his purpurea foliola, & ab iis virides eorum cauliculos, quoniam herbaceam habent acrimoniam, & floridū colorem habent. Contunde deinde decerpta Violarum folia in mortario marmoreo, & exprime. mox

℞. Expressi succi l' ij.

Sacchari l' iiij.

SACCHARVM prius clarificetur, & ad iustam consistentiam coquatur: amoto deinde ab igne Saccharo, reperi fieri finito, & succum infundito: & rursum lento igne ad spissitudinem coquito; & emicantem in coquendo spumam continuo aufero.

Quidam spumam non auferunt, ne color pereat. Sed citò corrumpitur cū spuma repositus.

Hic Violarum Syrupus in Misnia fit: præsertim Lipsia, ubi eum vocant Succum Violarum.

B I L I S acrimoniam obtundit: ac ob lentorem thoracis vitiiis est aptum.

Syrupus

Syrupus de Præfio D. Mesuæ.

- ℞. Præfii ℥ ij.
 Capilli Veneris
 Hyssopi ℥ j.
 * Calaminthæ Anisi Radicum Apii
 Radicum Fœniculi ana ℥ v.
 Seminis Maluæ
 Seminis Fœnugræci
 Radicis Ireos ana ℥ iij.
 Seminis Lini
 Seminis Cytoniorum ana ℥ ij.
 Passularum enucleatarum ℥ ij.
 * Ficuum siccarum pinguium numero xv.
 Penidiarum l' j.
 * Mellis l' ij.
 Aquæ quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

MEL oportet esse aromaticum & optimum:
 potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Vitiis thoracis & pulmonis diuturnis,
 & à frigido tenaciq̃ humore excitatis,
 atque eradicatu difficilibus succurrit: hinc
 est quòd senibus & asthmaticis plurimum
 conducatur.

Syrupus de Glycyrrhiza, D. Mesuæ.

- ℞. Glycyrrhizæ rasæ ℥ ij.
 Capilli Veneris ℥ j.
 Hyssopi ℥ β.

Aquæ

quæ l' iiij.

Macerentur horis xxiiij. Deinde co-
quantur ad dimidias: colaturæ adde

tellis optimi Penidiarum

acchari ana ℥ viij.

quæ rosarum ℥ vj.

Fiat Syrupus secundum artem.

Thoracem & pulmonem expurgat:
deoque diurnæ tussi & pleuritidi auxi-
liatur.

Syrupus de Hyssopo D. Mesuæ.

℥. Hyssopi aridi Radicum Apii

Radicum Fœniculi Radicum Petroselini

Glycyrrhizæ ana ℥ x.

Hordei mundati ℥ iiij.

Seminis Maluæ Seminis Cytoniorum

Tragacanthæ ana ℥ iij.

Capilli Veneris ℥ vj.

Iuiubarum

Sebesten ana num. xxx.

Passularum magnarum enucleatarum ℥ j.

℥ iiij.

Ficum siccarum

Dactylorum pinguium ana num. x.

Penidiarum albarum l' ij.

Confice secundum artem.

Ad vitia thoracis & pulmonis efficax
est; humoresque excreatu difficiles exte-
nuat & educit.

Syrus.

Syrupus de Eupatorio D. Mesue.

℞. Radicum Fœniculi Radicum Apii
 Radicum Endiuixæ ana ʒ ij.
 Glycyrrhizæ Schoenanthi
 Cuscutæ Absinthii
 Rosarum ana ʒ vj.
 Capilli Veneris Bedeguaris Suchaha
 Florum aut radicum Buglossæ
 Anisi Fœniculi
 Eupatorii ana ʒ v.
 Raues Seni [*id est, Rhabarbari Orientalis*]
 Mastiches ana ʒ iiij.
 Spicæ Nardi Indicæ Asari
 Folii [*pro Folio pone Spicam Romanam*]
 ana ʒ ij.
 Aquæ quantum sufficit, aut l' viij.
 Succii Apii
 Succii Endiuixæ ana l' ij.
 Sacchari l' iiij.

Coquantur secundum artem.

Pro Bedegware & Suchaha, qua hodie non cognoscuntur, licet accipere Carduum Benedictum, & Carolinam, id est, Cardopaciæ radicem.

Eupatorium, quod Mesue semper intelligit, est Gratiola, ut antè etiam dictum fuit aliquoties.

Frigidis iccinoris vitiis, ac eiusdem obstructionibus, aquæ inter cutem, ma-
 loque

que corporis habitui succurrit. Humo-
res enim crassos extenuat, roburque ieci-
ori adiicit. Vrinæ mouet, & hypochon-
diorum tensionem demolitur.

Syrupus de Stœchade simplex.

℞. Florum Stœchadis ʒ xxx.
Thymi Calaminthæ
Origani ana ʒ x.
Anisi ʒ vj.
Passularum enucleatarum ʒ iiij.
quæ quantum sufficit: coquantur secun-
dum artem. Colaturæ adde
Mellis optimi ℞ iiij. β.
Condiatur cum
Cinnamomi Calami aromatici
Zingiberis ana ʒ j. β.
Ligentur in sindone, & in Syrupo su-
pendantur.

Syrupus de Stœchade compositus
D. Mesuæ.

℞. Florum Stœchadis ʒ xxx.
Thymi Calaminthæ
Origani ana ʒ x.
Anisi Pyrethri ana ʒ vij.
Piperis longi ʒ iiij.
Zingiberis ʒ ij.
Passularum enucleatarum ʒ iiij.
Aquæ quantum sufficit
Mellis

Mellis optimi ℞ v.

Coquantur secundum artem lento igne:
colaturæ adde mellis prædictas ℞ v. & cum
reponis, tunc condies sequentibus specie-
bus in sindone rara & munda suspensis.

℞. Cinnamomi Calami aromatici
Spicæ Nardi Indicæ

Croci Zingiberis Piperis nigri

Piperis longi ana ʒ j. ʒ.

Contundantur grosso modo.

*Ego in condiendo Syrupo de Stœchade utroque,
pro Calamo aromatico mallet imponere Schæ-
nanthum aut Galangam: nam vero Calamo
aromatico iam caremus.*

Iuuat omnes affectus frigidos cerebri
& neruorum, vt paralyfim, epilepsiam,
spasnum, spasnum cynicum, tremorem:
ac ventriculum firmat.

Syrupus de Epithymo D. Mesue.

℞. Epithymi ʒ xx.

Myrobalanorum Citrinorum

Myrobalan. Indorum ana ʒ xv.

Emblicorum Bellericorum ana ʒ vj.

Cuscutæ

Fumiterræ ana ʒ x.

Thymi Buglossæ Calaminthæ

Glycyrrhizæ

Polypodii Agarici

Stœchados ana ʒ vj.

Rosæ

osarum Fœniculi

nisi ana ʒ ij. β.

runorum num. xx.

assularum enucleatarum ʒ iiij.

amarindorum ʒ ij. β.

quæ quantum sufficit.

acchari P iiij. Sapæ P ij.

Coquantur secundum artem.

SAPA est mustum optimum ad tertias de-
notum.

ATRAM bilem, & alios humores
stos vacuat: ob id morbos ex his nascen-
tes, elephantiam, cancrum, vlcera mali-
na, fistulosa, pforam, lepram præcauet,
uratque.

Syrupus de Nymphaea D. Francisci
Pedemontani.

℞. Florum Nymphaeæ ʒ ij.

Florum Vngulæ Caballinae aquaticæ

Psyllii integri

Acetosæ ana ʒ j.

Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli

Seminis Cucumeris

Seminis Melonis ana ʒ iiij.

Seminis Lactuæ Seminis Endiuia

Seminis Scariolæ

Seminis Portulacæ ana ʒ ij.

Radicum Fœniculi ʒ j.

Aquæ hordei quantum sufficit.

Sac-

Sacchari ℥ j.

Aceti albi

Succi Granatorum acetosorum ana ʒ ii

Coquantur secundum artem: deinde
aromatizentur cum

* Santali Citrini

Spicæ Nardi Indicæ ana ʒ j.

A Due sunt Nymphaeæ species: altera candida, altera luteum florem habet; & utriusque flores hunc Syrupum ingrediuntur. Nam Autor huius Syrupi eam speciem, quæ albos habet flores, vocat Nenuphar; alteram verò quæ luteos fert flores, appellat Vngulam Caballinam aquaticam, à foliorum figura, & florum colore.

SCARIOLA est species Endiuia, quam nos in Germania vocamus Endiviam, (vulgò Gensdistel,) & habet spinulas in dorso foliorum.

P. C. SCHOL.

Vngula Caballina aquatica.] De Tussilagine hanc in propria sua significatione intelligi posse Euchsius dextrè monet: apud aquas enim aut humentia loca plerumque nascitur.

BILIS flauæ feruorem extinguit: idcirco que mirificè in ardentibus aliisque acutis febribus auxiliatur: somnum quoque conciliat.

Syrupus

Syrupus de Papauere simplex
D. Mesua.

*

.Capita Papaueris albi recentia
 Capita Papaueris nigri recentia ana ʒ lx.
 quæ pluuiialis ℥ iiii.

Coquantur vsquequò remaneat tantum
 quæ P j. β. Colaturæ adde

Sacchari & Penidiarum ana ʒ vj.

Fiat Syrupus secundum artem.

Valet ad catarrhum & tussim, causam
 insomniæ.

Syrupus de Papauere compositus,
D. Mesua.

. Papaueris albi

Papaueris nigri ana ʒ l.

Capillorum Veneris ʒ xv.

Glycyrrhizæ ʒ v.

Uuibæ numero xxx.

Seminis Lactucæ ʒ xl.

Seminis Maluæ

Seminis Cytoniorum ana ʒ vj.

Coquantur in P iiii aque vsque ad duas;
 & cum Sacchari & Penidiarum ana ʒ viij

Fiat Syrupus secundum artem.

VALET ad tussim siccam, phthisin,
 catarrhum, in somniæ causam.

Syrup-

Syrupus de succo Myrtillorum.

A R. Succi Myrtillorum depurati ℞ viij.
 Sacchari clarificati ℞ iiij.

Coquantur secundum artem.

*Curandum est ut adferatur ex Italia, aut
 Narbonensi Gallia Myrtillorum succus, si quis
 velit hunc Syrupum conficere.*

P. C. SCHOL.

A ℞ viij.] *Cum hic Syrupus à Mesues, cui
 erroneè à Cordo adscribebatur, diversus sit; at
 que à Cordo ipso forsitan concinnatus; malè legi
 hic ℞ viij Fuchsius temerè scribit.*

SYRUPUS Myrtillorum ventriculum
 & viscera roborat: ob id fluorem alui an-
 tiquatum sistit; & tussim mitigat.

Syrupus Myrtinus compositus.

R. Myrtillorum ʒ xx.

* Rosarum Santali albi

A Sumach Balauftiorum

* Berberis ana ʒ xv.

* Mespilorum ʒ l.

* Succi Granatorum acidorum vel muzu-
 rum

Succi Pomorum agrestium ana ℞ ij.

Omnia in dictis succis & aqua q. s. co-
 quantur, & fiat Syrupus cum

* Sacchari ℞ iiij. secundum artem.

P. C

P. C. SCHOL.

Rosarum.] Rosas Fuchsius rectè addit, & ordo neglectas; simulq; ana 3 xv legendum, 3 L, atque Sacchari P iij, dextrè ait; ubi ordu 3 xxx, & 3 C, ac Sach. P v, nimis ipserat. Interim in aqua P viij coquit Fuchsius; & succi Granatorum ac Cyloniiorum ana P ß. tantum addit.

Hic Syrupus sistit ventris fluorem, iam antiquum, & sreatum sanguinis.

*Syrupus de succo Acetosæ,
D. Mesuæ.*

℞. Succi Acetosæ depurati l' iij.
Sacchari clarificati l' ij.

Coquantur secundum artem.

FEBRIBVS biliosis & pestilentialibus saluber est: cordis & ventriculi flammæ calorem extinguit, ipsaque roborat.

Syrupus de Succo Boraginis.

℞. Succi Boraginis depurati l' viij.
Florum Boraginis recentium l' j.

Quam modicè efferueant, aut potius horis aliquot in succo clarificato ac calido macerentur; dein colentur, cumque Sacchari l' iij. fiat Syrupus.

H

SVC-

SUCCVS Boraginis prius est clarificandus cum albuminibus ouorum; alioquin plus salis mucilaginosus fieret Syrupus.

P. C. SCHOL.

Stolidos cum hic descripsisset Cordus huius sequentis Syrupi conficiendi modos, ego eodem suo nitori ex arte reddidi. Fecissem quidem et aliis locis quamplurimis, nisi falce alterius messem incidere penitus, minimè consultum visum fuisset.

COR ipsum roborat, eiusque tremorem & syncopen sanat: maniacos & melancholicos iuuat.

Syrupus de Succo Buglossæ.

Rx. Succu Buglossæ depurati ℥ viij.

* Florum Buglossæ recentium ℥ j.

* Sacchari ℥ iiij.

Fiat eodem modo quo præcedens.

Intelligo hic eam Buglossam quæ vulgè vsu est, non illam italicam maiorem.

Succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam fit mucilago, dum tunditur Buglossa. id rufa dimittenda est per noctem in frigido loco & postridie exprimendus succus, atque cum albuminibus ouorum clarificandus.

COR confortat, lætitiâque genera

Syrupus de Lupulo.

* Rx. Succu Lupuli depurati ℥ ij.

Succu

Succi Fumiterræ depurati ℞ j.

*

Sacchari ℞ ij.

+

Coquantur secundum artem.

*Potest etiam hic Syrupus fieri è solo Lupuli
cco, ut Mesue placet in capite De speciebus
solubilis. Expressendus autem est Succus Lu-
puli cum adhuc tenera sunt eius viticula &
paragi.*

Refrigerat, & collectionum imperus
lenit. Bilem regio morbo laborantibus de-
stahit, pituitam in aqua inter cutem exi-
git per aluum.

Iuleb Rosatum.

℞. Aquæ Rosarum ℞ iij.

Sacchari clarificati ℞ ij.

Fiat cum diligentia secundum artem.

FEBRIVM, thoracis, & ventriculi in-
cendium, caloremque flammeum extin-
guat: sitim inexpletam sedat.

Iuleb Violatum.

℞. Aquæ Violarum ℞ iij.

*

Sacchari clarificati ℞ ij.

Coque vt Iuleb Rosatum.

Febres, phlegmonas, pleuritidem, aspe-
ritatem gutturis & thoracis, ac tussim
mitigat.

H 2

Mina

*Mina Cytoniorum simplex,
D. Mesuae.*

℞. Succi Cytoniorum depurati ℥ xij.

Coquantur ad medietatem, & affunde

A Vini veteris optimi ℥ v.

★ Sacchari ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

P. C. SCHOL.

A Vini ℥ v. Sacchari ℥ iij.] *Cordum h
Vini ℥ viij. Sacch. ℥ xij. perperam legentem, e
Fuchsius quoque animaduertit. quare vera
utrobique lectionem reposui.*

VENTRICULUM roborat, & cibum
in eo continet.

*Mina Cytoniorum aromatica,
D. Mesuae.*

℞. Succi Cytoniorum acetosorum ℥ xx

Vini veteris optimi ℥ x.

Mellis despumati optimi ℥ vj.

Potest tamen etiam cum Saccharo fieri

Coquantur ad perfectionem; & aromati-
zantur in sindone ligatis sequentibus:

Cinnamomi electi

Cardamomi minoris [al. maioris] ana

℥ iij.

Garyophyllorum ℥ ij.

Zingiberis Mastiches ana ℥ j. f.

Croc.

Roci 3 ij.
 Aloaloës Macis ana 3 j. β.
 Roschi 3 j.
 Illiæ moschataæ veræ 3 ij.
 Fiat secundum artem.
 Mellis loco Saccharum sumi potest.
 VENTRICULUM, hepar, & cætera
 scera roborat : appetentiam excitat,
 actionem iuuat : vomitum & lenteriam
 dat.

Mel Rosatum D. Mesue.

Rosarum rubearum nondum penitus
 apertarum ℞ ij.
 Mellis optimi ℞ vj.
 Coquantur lento igne secundum artem.
 STOMACHUM confortat & mundi-
 ficat, & est digestium materialium
 phlegmaticarum in stomacho & meseraï-
 cis contentarum.

Mel Rosatum aliud efficacius.

Rosarum Rubearum nondum
 explicitarum contusorum ℞ ij.
 Coquantur in aquæ celestis ℞ iiij.
 Colaturæ fortiter expressæ adde
 Succi Rosarum rubearum depurati
 Mellis optimi despumati ana ℞ iiij.
 Coquantur secundum artem.
 H 3 Oxy-

Oxymel simplex D. Mesue.

℞. Mellis optimi despumati ℥ iij.

Aceti vini acerrimi

Aquæ clarissimæ ana ℥ ij.

Mel cum aqua despumetur iterum diligenter: & cum aqua fuerit consumpta tunc adde acetum; & coque secundum artem.

Humores crassos, lentos ac pituitosos incidit, extenuat, abstergit, atque adeò obstructions aufert, sputum educit, spiritumque faciliorem reddit.

Oxymel compositum, Mesue.

℞. Radicum Fœniculi

Radicum Apii ana ℥ iij.

Radicum Petroselini Radicum Rusci

Radicum Asparagi Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aquæ claræ ℥ vi. aut quantum sufficit. Colaturæ adde

Aceti acerrimi ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Humores crassos & pituitosos incidit, extenuat & abstergit: obstructions tollit iecinoris, lienis ac renum: urinam mouet, sudoremque euocat.

Oxymel

Oxymel Scilliticum simplex

D. Mesua.

℞. Mellis despumati ℥ iij.

Aceti scillitici ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

HUMORES crassos, lentos, auulsi consumaces separat & incidit: ob id confert ventriculi & aliorum viscerum affectibus hos humores sequentibus: ructum acidum sanat, & vesicæ mollicationem, seu urinæ incontinentiam. Asthmaticis quoque prodest.

Oxymel Scilliticum compositum.

℞. Radicum Apii

Radicum Fœniculi ana ℥ iij.

Radicum Petroselini Radicum Ruscæ

Radicum Asparagi Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aquæ ℥ vj. aut q. s. Deinde colentur:

Colaturæ adde

Aceti Scillitici ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ ij.

Fiat secundum artem.

Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit in diuturnis quartanis & quotidianis, quàm Oxymel compositum de radicibus.

H 4

Mel

Mel Anacardinum Azaravii.

℞. Anacardos recentes, terantur, & in aqua coquantur, donec melliginem quandam in rubeo colore fuscā emittant: earum aquæ innatantem auferro, & reponito.

Mel Emblicorum.

Mel Emblicorum, est mel in quo Emblicæ Myrobalani sunt conditi.

Alii ita vocant Emblicorum decoctum, a mellis consistentiam inspissatum.

Mel Passularum.

℞. Vuarum passarum ℥ iiij. Infundantur eis aquæ ℥ xij. aut q. s. & macerentur hori xxij. deinde coquantur ad remanentiam tertię partis. Colentur, & colatura decoquatur ad crassitudinem mellis, & reponatur. hoc decoctum vocatur Mel passularum.

SYRVPORVM TRES SEQVENTES
VALERII CORDI DESCRIPTIONES
NUPER PRIMVM ACCESSERVNT.

Syrupus de Pyris Valerii Cordi.

℞. Succi Pyrorum moschatellinorum
Succi

Succi Pyrorum Palatinorum
 acchari clarificati ana ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Et quoniam Pyra Moschatellina citius
 maturescunt, expressum eorum succum
 clarificatum cum Saccharo decoctum re-
 tones, donec etiam Palatina maturescant.
 Ilemum miscebis.

Syrupus de Cichorio Val. Cordi.

℞. Rad. Fœniculi Cichorii ana ℥ iiij.

Linguae ceruine Scolopendrii

Capillorum Veneris

Trichomanes ana m j.

Aquæ Cichorii Succi eiusdem ana ℥ iiij.

Coquantur omnia secundum artem.

Colaturæ adde Sacchari clarificati ℥ iiij.

Et species sequentes petiæ illigatas
 suspende in Syrupo:

℞. Rhabarbari ℥ ij.

Rad. Spicæ Romanæ ʒ j.

Fiat Syrupus.

Syrupus Refectiuus, Val. Cordi.

℞. Dactylorum enucleatorum

Ficum siccarum pinguium

Xyloceratiorem enucleatorum

Vuarum Cubearum passarum

Vuarum passarum vulgarium maiorum &
 minorum

H 5 Tama-

Tamarindorum enucleatorum ana ℥ iij.

Multi generosi recentis

Succi Cydoniorum ana l' vj.

Incidantur fructus in partes, Passule minores & Xyloceratia modicè contundantur, vnumquodque per se. Deinde misceantur omnia, & in fictili denso affundantur eis succus & mustum, mace- renturque horis xxiiij. Postea coquantur lento igne ad consumptionem tertiæ par- tis, aut ampliùs.

Colaturæ affunde lactis Amygd. cum aqua rosacea l' ij. ex vna libra Amygdala- rum dulcium tritarum expressi.

Clarificetur deinde cum albuminibus quorum xij.

Huic decocto clarificato adde Sacchari clarificati l' iiij.

Coquatur ad perfectionem: & cum repo- nis, tū suspende in Syrupō sequētes species crassiusculè tritas, & in sindone ligatas:

℞ Cinnamomi interioris optimi

Macis Nucis moschatae

Cardamomi Zingiberis

Galangæ Zedoariæ

Garyophyllorum ana ℥ ij.

Ligni Aloës ℥ iiij.

Huiusmodi dilutum vel decoctum fructuum horum, vel alicuius eorum, vocant Arabes Nabuch; quo utuntur pro vino & melle in ca- lidis regionibus.

H V N C

Hunc Syrupum composui diuitibus
quibusdam in chronicis morbis, omnem
ibum & potum auersantibus: & compe-
i mirum in modum vires reficere, alere;
& iam desperatos, refocillatis viribus,
anitati restituere.

R O B.

Rob de Ribes simplex.

R. Succi Ribes ℞ viij.

Coquatur per se ad spissitudinem mellis,
& reponatur.

Rob de Ribes Compositum.

R. Succi Ribes ℞ iiij.

Sacchari optimi ℞ ij.

Coquantur secundum artem.

VENTRICULUM firmat, vomitum
biliosum reprimat, sitim restinguit, alias-
que excretionem biliosas sistit.

Rob de Berberis simplex.

R. Succi Berberis ℞ viij.

Coquatur per se usque ad mellis spissi-
tudinem.

Rob de Berberis compositum.

R. Succi Berberis ℞ iiij.

H 6

Saccha

Sacchari optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

R o b ex Oxyacantha, seu de Berberis
easdem quas præcedens facultates obtinet.

Rob Nucum, D. Mesue.

℞. Succi Corticū viridiū iuglandiū ℥ iiij
Mellis optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Destillationi tenuium humorum à capite
& inflammationem excitantium confert.

Diamorum, descriptione Nicolai.

℞. Succi Mororum Celsi ℥ β.

Succi Mororum Rubi ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ j.

Sapæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

Contra depascentia oris vlcera, ad den-
tium affectus & gingiuarum noxas, atque
ad omnia oris vitia gargarizatum proficit.

Diamoron aliud, D. Val. Cordi.

℞. Succi Mororum Rubi

Succi Mororum Rubi Idæi

Succi Mororum Celsi, siue de arbore,

Succi Fragorum ana ℥ ij.

Mellis despumati optimi ℥ iiij.

Coquan-

Coquantur lento igne secundum artem.

MORORVM omnium succus exprimendus est antequam perueniant ad maturitatem. Morò Mora Rubi Idai & Fraga citius maturefcunt, quàm alia: idèd oportet, vt horum succus colligatur, & cum Saccharo decoctus reponatur, donec alii maturefcant. Sint autem ucci vniuscuiusque l' ij. Sacchari l' j. ad uiamis eorum, id est, Sacchari l' ij.

RUBVS Idæus est ille Rubus, quem nos vocamus Himpen: eius mora siue fructus vocantur Himpeer.

*Medulla siue Pulpa, seu Rob
Cerasorum.*

R. Cerasorum acetosorum quantum volueris: coque per se, sine humore aliquo, & per cribrum setaceum manibus exprime; & ad spissitudinem iustam coque; ac sine Saccharo reponere, vt medullam Prunorum. Poterit qui volet etiam cum Saccharo conficere.

Diamarenatum simplex.

R. Amarena Cerasa quantum libuerit; & cum modico vino coque: cocta per cribrum manibus exprime: expressam deinde pulpam ad spissitudinem coque; & deinde

H 7 R. In-

℞. Inspissatæ pulpæ ℥ xij.

Sacchari clarificati & inspissati ℥ viij.

Confice secundum artem.

AMARENÆ sunt magna Cerasa, gustu
vinosa, quæ Germanicè vocantur Amarellen,
Ammerlinghe, & Amelber.

Diamarenatum compositum.

℞. Diamarenati simplicis iam confecti,
& adhuc calidi ℥ iiij.

Cui insperge sequentes species, in mi-
nutissimum puluerem tritas:

℞. Cinnamomi

Nucis moschatæ ana ℥ j.

Zingiberis Galangæ ana ℥ iiij.

Cardamomi Garyophyllorum

Macis Ligni Aloës ana ℥ ij.

Confice secundum artem.

Ad hunc modum potes etiam facere con-
fectiones ex Cynosbatis, & Cornis, hoc
est, Corni fructibus.

LOHOCH.

Lohoch sanum & expertum,

D. Mesua.

℞. Cinnamomi Hyssopi

Glycyrrhizæ ana ℥ iiij.

Iuiubarum

Seba

cebesten ana numero xxx.

assularum enucleatarum

icum siccarum

Dactylorum pinguium ana ʒ ij.

cenugræci ʒ v.

Capilli Veneris m j.

Anisi Fœniculi Ireos

Seminis Lini

Calaminthæ ana ʒ iiij.

Coquantur secundum artem in aqua
clarissimæ l' iiij. ad consumptionem l' ij.

Colaturæ expressæ adde

Penidiarum l' ij.

Coquantur ad perfectionem : postea
insperge subsequencia, minutissimè in-
cisa & tusa:

℞. Pinearum mundatarum ʒ v.

Amygdalorum dulcium mundatorum

Glycyrrhizæ Tragacanthæ *

Gummi Arabici Amyli ana ʒ iiij. *

Ireos ʒ ij.

Agitentur omnia simul celerissimè, do-
nec albescant.

T v s s r vocisq̃ue asperitati à frigidi-
tate natæ auxilio est : crassos in thorace &
pulmone humores extenuat.

Lohoch de Pino, D. Mesue.

℞. Pinearum ʒ xx. *

Amygdalorum dulcium

Auel-

Auellanarum affatarum

Tragacanthæ Gummi Arabici

Glycyrrhizæ Succi Glycyrrhizæ

Amyli Capilli Veneris

Ireos ana ʒ iiij.

Carnium dactylorum ʒ xxxv.

Amygdalorum amarorum ʒ iiij.

Mellis passularum Butyri recentis

Sacchari Tabarzeth ana ʒ iiij.

Mellis Tabarzeth l' iiij. ʒ j. ʒ iiij.

Conterenda contundantur, & incidenda
incidantur minutissimè, & cum melle ex
cipiantur.

MEL Tabarzeth est optimum, sincerissi-
mum atque odoratissimum mel, quale ex Dan-
tisco afferitur.

P. C. SCHOL.

A Amygd.am. ʒ iiij.] Cum Cordus hic per-
uersè ʒ iiij. posuisset, ʒ iiij. tantum legendas esse
Fuchsio quoque adstipulante, dico.

Tvs si diuturnæ, difficultati spiritus
& asthmatis succurrit: humores in thorace
crassos incidit, & extenuat.

Lohoch de Papauere D. Mesue.

R. Papaueris albi ʒ xxv.

Amygdalorum dulcium Pinearum

Gummi Arabici Tragacanthæ

Succi Glycyrrhizæ ana ʒ x.

Amy.

myli ʒ iij.

Seminis Portulacæ Seminis Lactucæ *

Seminis Cytoniorum ana ʒ iij.

Roci ʒ j. *

enidiarum albarum ʒ iij.

Syrupi de Papauere l' iij.

Omnia contundantur & incidantur; at-
que cum Syrupo excipiantur, secundum
artem. Porro iste Syrupus de Papauere sic
fieri debet:

℞. Caput Papaueris albi recentium

Capitū Papaueris nigri recentiu ana ʒ vj.

Seminis Lactucæ

Florum Violarum ana ʒ j.

Aquæ quantum sufficit, aut l' viij.

Coquantur; & colaturæ adde

Sacchari l' iij.

Coquantur ad spissitudinem.

*Hoc Lohoch de Papauere appellatur etiam
alio nomine Diapapauer.*

Iuuat tussim, & gutturis asperitatem à
catarrho calido, tenui (quem sputum li-
quidum indicat :) cum enim coquit, &
crassat. Confert etiam febribus ardenti-
bus, dolenti thoraci, pleuritidi.

Lohoch de Scilla, D. Mesuæ.

℞. Succi Scillæ

Mellis despumati ana l' j.

Coquantur secundum artem.

SCILL-

SCILLA propriè succum non habet, sed mucilaginem; qua sic est colligenda:

Rx. Scillas crudas tres aut quatuor: eius laminas puriores, plenas & nitidas, in partes incidito cultello eburneo: deinde in pila siue mortario fictili aut lapideo siue marmoreo atterito cum agitaculo, facto ex ligno Guaiaco siue Sando: & deinde exprime, & utere.

E C L E G M A de Scilla, materiam crassam, lentam, coctu difficilem in partibus respiratoriis, expelli facilem strenuè reddit; & natam inde spirandi difficultatem, & thoracis dolorem leuat.

*Lohoch de Pulmone vulpis,
D. Mesue.*

Rx. Pulmonis vulpini siccati

Succi Glycyrrhizæ

Seminis Anisi Seminis Fœniculi

Capilli Veneris ana ʒ j.

Sacchari clarificati ʒ xv.

Conterantur omnia tenuissimè, & cum Saccharo excipiantur.

A B S T E R G I T & consolidat vlcera pe-
ctoris & pulmonis, & præferendum est
aliis remediis in phthisi.

* *Lohoch ad Asthma D. Mesue.*

* Rx. Scillæ affatæ ʒ iij.

Radi.

LENITIVA, ET SOLVT. 187

radicum Ireos 3 ij.
 Ilyssopi
 crassi ana 3 j.
 Myrrhæ rubæ
 croci ana 3 β.
 Cum mellis quantitate sufficienti fiat Lo-
 ch.

Ad asthma & tussim antiquam valet:
 humorem enim crassum tenuat.

LENITIVA,
 ET SOLVTIVA.

Flores Casia fistula solutinae.

℞. Cannas seu filiquas Casia ponderosas,
 & quæ non resonant concussæ: aperi eas,
 & contentam in eis pulpam seu medullam
 cum laminis & seminibus suis diligenter
 euacua: exempta proiice super inuersum
 & angustum cribrum, setis equinis con-
 textum. Cribrum deinde pone supra bul-
 lientis aquæ vaporem, & auerso cochlea-
 ris conuexo Medullam Casia hinc & inde
 ducito, vt per cribrum paulatim excerna-
 tur: & si quid excretum est, aut penetra-
 uerit, confestim subinde auferro, ne plus
 quàm necesse est de vapore imbibat: idque
 tam diu facito, donec quantum voles, col-
 legeris. Porro cùm necessitas requirit, sem-
 per

per recentes exprime Casia flores : repositi enim acefcunt.

Si quis Casia flores siue pulpam magis solutiuam reddere volet , in bullientem aquam proiciat folia Persici , aut flores Persici , & Prunellorum siluestrium , aut omnia hæc simul : horum enim vapor & distillata aqua soluit aluum , [sed debilibus ventriculis non conuenit.]

Mundificat sanguinem , & compescit omnem acuitatem , & sedat sitim , & propriè cum succo Endiuiaæ aut Taraxaci , depurato secundum artem. Mundificat stomachum , & educit choleram & phlegma , sine nocumento & excessu , caret enim mordicatione. Et lenit pectus & guttur , ac resoluit apostemata acuta in eis. Et confert calefactioni renum , sumpta cum diureticis & infusione Glycyrrhizæ , & prohibet generationem lapidis in eis : & confert febribus calidis.

Diacasia cum Manna.

℞. Prunorum Damascenorum ℥ ij.
 Florum Violarum m. j. β.
 Aquæ fontanæ ℥ xvij.

Bulliant secundum artem vsque ad medietatis consumptionem : Cola ; & in colatura dissolue

Pulpæ Casiæ ℥ vj.

Pulpæ

Pulpæ Tamarindorum ℥ j.

Mannæ optimæ Calabrinæ ℥ ij.

Syrupi Violarum ℥ iiij.

Sacchari Candi Sacchari Penidii ana ℥ j.

Sacchari Violati ℥ iiij.

Confice secundum artem.

*Pulpa Tamarindorum fit ut Pulpa Casia,
ive flores Casia.*

Est pro delicatis, qui habent stypti-
um ventrem; non enim est ingrati sapo-
ris, nec molesta, sed salubris: lenit visce-
ra, subducit aluum, purgat choleram, &
mitigat febres.

Casia extracta sine foliis Sene.

R. Prunorum numero xij.

Violarum m. j.

Hordei mundi Anisi Polypodii

Seminis Carthami ana ℥ v.

Capillorum Veneris Thymi

Epithymi ana m. β. *

Pastularum exacinatarum ℥ β.

Seminis Fœniculi ℥ ij.

Seminis Portulacæ

Seminis Maluæ ana ℥ iiij.

Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Fiat horum decoctio in sufficienti quan-
titate aquæ: colentur; in colatura dissolue

Pulpæ Casiæ l' ij.

Pulpæ Tamarindorum ℥ j. *

Cin-

* Cinnamomi ʒ iij.
Sacchari optimi ℞ j.

Coquantur ad perfectionem secundam
artem.

Casia extracta cum foliis Senæ.

℞. Confectionis Casiæ extractæ sine fo-
liis Senæ ℞ ij.

Pulueris foliorum Senæ ʒ ij.

Misce secundum artem.

FACILE soluit: lenit asperitatem in-
testinorum: remouet stypticitatem, &
ventris onus subducit, & morbis chole-
ricis & melancholicis auxilia præbet.

Casia extracta pro clysteribus.

℞. Violarum [id est, florum Violarum]

Violaria [id est, foliorum Violarum]

Maluæ Mercurialis Betæ

Parietariæ ana m j.

Fiat horum decoctio in sufficienti aqua,
cuius beneficio Casia extrahatur, & can-
næ eius interiùs lauentur. Deinde

℞. Pulpæ Casiæ cum hac decoctione ex-
tractæ & ad spissitudinem coctæ ℞ j.

Sacchari ℞ j. β.

Coque ad perfectionem secundum ar-
tem. Quidam addunt Diacridium, siue
Scammoneam. Sed hoc nemo faciat in-
sciis Doctoribus Medicis.

P A R I E

PARIETARIÆ, videlicet vera, quæ
 in macerias & muros nascitur, sub stillicidiis
 Forum; & non siluestris istius herba luteis
 floribus, quæ dicitur Germanicè Tag und nacht.
 Est lenitiua ventriculi, & lenis, &
 est medicina pro delicatis, carens acuita-
 tione & mordicatione, & omni excessu læ-
 sante.

Electuarium Lenitium.

Passularum enucleatarum ℥ ij.
 Adianti nigri Violarum
 Hordei mundi ana m. j.
 Iuubarum Sebesten ana num. xx.
 Glycyrrhizæ ℥ β.
 Prunorum enucleatorum
 Tamarindorum ana ℥ vi.
 Fol. Senæ Polypodii ana ℥ ij.
 Mercurialis m. j. β.

Decoquantur secundum artem in suffi-
 cienti aqua: cola; & in colatura dissolue
 Pulpæ Casiæ Pulpæ Tamarindorum
 Pulpæ Prunorum Sacchari optimi
 Sacchari Violati ana ℥ vi.
 Pulueris Senæ ℥ iij. ℥ iij. β.

Confice secundum artem.

ADIANTUM nigrum, est Capillus Veneris
 verus; qui Lugduno affertur.

Vsvs eius est in febribus humoralibus
 & pleuresi: lenit enim & mollit in-
 testina,

testina, & delet eorum stypticitatem
facile soluit sine molestia & latione cho-
leram phlegmaticam & melancholicam.

*Electuarium Lenitivum de Manna,
Nicolai Alexandrini.*

R. Capillorum Veneris

Scolopendriæ [hoc est, Ceterach vocate]

★ Hepaticæ [hoc est, Lichens] ana ʒ iiij.

Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli

Seminis Melonis Sem. Cucumeris

Violarum ana ʒ j.

Prunorum Damascenorum num. xx.

Coquantur in aqua ad dimidias, deind
percolentur cum expressione: in colatu
dissoluantur

Mannæ optimæ puræ

★ Sacchari Violacei

★ Pulpæ Casiæ recens extractæ ana ʒ iiij.

★ Tamarindorum

Sacchari Rosacei ana ʒ j.

Sacchari albissimi l. iiij.

Concoquantur ad mellis consistentiam
postremò species sequentes iniciantur:

Nucleorum Seminis Melonis

Seminis Cucumeris Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli Florum Violarum

Florum Nymphææ Seminis Lactucæ

Seminis Scariolæ

★ Seminis Portulacæ ana ʒ j.

Rhabar

habbarbari electi

liorum Senæ ana ʒ j. ʒ j.

his accuratè commistis & subactis, con-
ciatur electuarium.

VTILE est ad purgandum sanguinem,
cholera reprimendam & melanco-
am : valet etiam ad hepar calefactum;
corpus vniuersum perpurgat.

*Electuarium de Sebesten, D. Bartholo-
mai Montagnane.*

Sebesten sine nucleis

runorum siccorum enucleatorum

Tamarindorum ana ʒ v.

quæ Violarum l j.

quæ Ireos

quæ Anguriæ ana ʒ vj.

uccis Mercurialis depurati ʒ iiij.

enidiarum ʒ iiij.

Diapruni simplicis l j. β.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Cucumeris Melonis

Citrulli ana ʒ j.

Diagridii ʒ iiij. β.

Caro siue pulpa Sebesten, Prunorum &

Tamarindorum minutissimè teratur, &

cum aquis extrahatur. Semina verò minu-

tissimè incidantur, & reliquis miscean-

tur : & fiat secundum artem Electuarium.

ANGVRIA est Melon magnus, viridis:

I

alio

alio nomine vocatur *Albateca*, siue *Batega*, & *Melon Indicus*. Quidam per aquam *Anguria* intelligunt succum eius, & non malè: nam hic magis aluum lenit.

P. C. SCHOL.

A. *Aquæ Anguriæ.*] *Anguriam* esse *Melonem* seu fructum magnum, ex viridi & subpallidum foris interstinctum, siue variegatum angurimodo, unde illi nomen; oblongum, insipidum cum lauore, semine maiusculo, rubro, vnde cum *Francisci Alexandrini Apolline* existimo & falli *Fuchsum* dico.

CONFERT febribus cholericis interpolatis, & continuis puris, & sedat acuitatem febrium, sitim & vigilias, & etiam amaritudinem remouendo, & educit materias acutas à viis vrialibus & vesica.

*Medulla siue Pulpa Prunorum,
aut Diaprunum simplex.*

℞. *Prunorum* magnorum acetosorum & vinosorum quantitatem, quam volueris, & exemptis nucleis in fictili vitreato magno coquito: deinde per cribrum setaceum exprimito: expressam pulpam iterum lento igne ad perfectam & iustam spissitudinem coquito, & sine *Saccharo* reponito.

Porro si medullam *Prunorum* laxati-

uam

m requiris, ex dulcibus Prunis, aut
anis Hungaricis magnis exiccatis con-
lito.

Medulla Prunorum vinosorum, calo-
m & sitim in febribus mitigat: & me-
is est vt conseruetur sine Saccharo, Ce-
orum modo inspissata.

*Prunum compositum, non laxativum,
D. Nicolai.*

Prunorum Damascenorum electorum
siue Hispanicorum] num. centum.

Coquantur in modica aqua, donec emol-
antur: excola: deinde decoctum eorum
riuatim repones; ipsa verò pruna super
uersum & vasi impositum cribrum po-
antur, & manibus hinc & inde ducan-
ur, & premantur, donec omnis eorum
ulpa penetrauerit, & cutis cum nucleis
antum remaneat. Collectam deinde pul-
am, & excolatum eorum decoctum, in
quo bullierit Violarum $\frac{3}{4}$ β , lento igne ad
pissitudinem coquito. Melius esset, si
Prunorum pulpa per se inspissaretur, & si
cum decocto Prunorum & Violarum Pul-
pa Tamarindorum extraheretur.

Deinde cum inspissaueris,

R. Pulpe inspissatæ l' j.
Sacchari clarificati l' ij.
Pulpæ Tamarindorum

I 2

Pul-

Pulpæ Casiæ ana ʒ j.

Agita omnia simul supra ignem : dein
de insperge subsequentium specierum
puluerem:

R. Santali albi Santali rubri

Spodii Rhabarbari

Cinnamomi ana ʒ iiij.

Rosarum Violarum

Seminis Portulacæ Seminis Scariolæ

Seminis Berberis Succu Glycyrrhizæ

Tragacanthæ ana ʒ ij.

Seminis Cucurbitæ Seminis Cucumeris

Seminis Citrulli

Seminis Melonis ana ʒ j.

Confice secundum artem.

Dicitur etiam hæc confectio Diadama-
scenum ; à Prunis Damascenis quæ capi-

Quidam ponunt Prunorum non nun-
centum, sed lʒ j. verum malè : nam e-
Nicolao Alexandrino omnes alii hæc
compositionem desumpserunt.

Quædam exemplaria non habent Cin-
namomum : sed Nicolaus Alexandrinus
idipsum ponit : & nisi ingrederetur Cinn-
momi pondus, confectio hæc esset man-
ca : nam Nicolaus Alexandrinus scribit
totam confectionem habere lʒ iiij. & ʒ.
sic est. Impressi tamen codices mendo-
sunt : habent enim lʒ ij. & ʒ. Itaque
ciphra 3. posuerunt 2. facili errore, non
tamen condonando.

Nico

Nicolaus Alexandrinus non ponit semen Cucumeris: nam si posuisset, dixisset confectionem habere l' iij ℥ ss. ℥ 3 j. Itaque hac 3 j. seminis Cucumeris, adiecta est à posterioribus: nihil enim refert, cum potius conducatur.

Per semina Cucurbita, Cucumeris, &c. debet intelligi exempta eorum medulla. Idque semper intelligendum est, cum pulveres horum in confectiones quaslibet.

P. C. SCHOL.

Cinnamomi.] Cinnamomum ex hoc medicamento erroneè reiicit Fuchsius, cum vetera plurima exemplaria id contineant: quod rationibus etiam constare, demonstrari posset.

DATV R acutas & peracutas [febres] patientibus, & maximè Caufoni & Synocha, in principio, & in augmento & statu aegritudinis. Et sine Diacridio potest exhiberi in omni hora diei: cum Diacridio vero, in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est solutivum forte.

Diaprunum compositum laxativum,
[sen solutivum,] D. Nicolai.

℞. Diapruni non laxativi adhuc recentis
& calidis l' iiij.

Scammoneæ præparatæ ℥ ij.

Misce, & repone.

℥ 3

Dis-

Diacatholicon Nicolai.

℞. Pulpæ Casiæ fistulæ

Pulpæ Tamarindorum

Senæ mundatæ ana ℥ ij.

Rhabarbari Violarum Polypodii

* Anisi ana ℥ j.

Penidiarum

* Sacchari Candi ana ℥ j.

Glycyrrhizæ Seminis Cucurbitæ

Seminis Citrulli

Seminis Cucumeris

Seminis Melonis ana ℥ ij.

Conterenda conterantur, & seminum
quatuor maiorum nuclei incidantur: po-
steà omnia simul conficiantur cum subse-
quenti syrupo:

* ℞. Polypodii ℥ iiij.

Coquantur in aqua cælesti q. s. addendo
Sacchari optimi l' ij.

*Nicolaus Alexandrinus hanc confecti-
onem vocat Catholicum; è quo desumpta est: is pau-
lò aliter eam describit: sed quia impressum
Nicolai exemplar in hac confecti-
one valdè men-
desum est, malui ex concordia aliorum tradi-
tione hanc adscribere.*

CONFERT acutis & peracutis morbis:
emollit enim, alterat, roburque addit ie-
cinorosis & lienosis.

Ele-

*Electuarium Indum maius,
D. Mesue.*

. Cinnamomi Garyophyllorum
 picæ Indicæ Rosarum
 Cassiæ lignæ veræ [aut succedanei eius]
 Macis
 Cyperi [videlicet rotundi] ana ℥ iiij.
 Santali Citrini ℥ ij. β.
 Ligni Aloës
 Nucis moschatæ ana ℥ ij.
 Turbith optimi ℥ l. [id est, quinquaginta]
 Sacchari
 Penidiarum ana ℥ xx.
 Galangæ
 Cardamomi maioris
 Cardamomi minoris Asari
 Mastiches ana ℥ j. β.
 Diagridii ℥ j. ℥ iiij.
 Omnia terantur, & cum oleo Amygdalino
 dulci fricentur, & cum subsequenti
 syrupo conficiantur:
 R. Succi Cydoniorum
 Succi Granatorum Succi Apii
 Succi Fœniculi, omnium depuratorum
 ana ℥ β.
 Mellis despumati optimi ℥ iiij. ℥ iiij. A
 Decoquantur succi cum melle, ad spissitudinem
 iustam, secundum artem.

I 4 P. C.

P. C. SCHOL.

A l' iij. ʒ iij.] Cum Mellis triplum ad
liquorum pondera Cordus plerumque requi
rat, hic Mellis l' iij. ʒ. posuerat, ingredien
tia Sacchara pulueribus ceteris connumerans
quodalicubi tamen non effecit. Itaque num Sac
chara pulueribus sint annumeranda, ut
ratione Mel quoque triplicandum sit, nihil
hic Euchsus, nihil Dessennius, nihil Apollo fata
dignum; ut nec in Amygdala, Pineas, Dactylo.
recipientibus medicamentis; cum alioquin fu
silibus interdum paginas repleant. Ceterum
(ut hic id obiter dicam) huius iam narrati du
bii, Diaphœnicon admodum est controuersum
[f. decisio incerta.]

EXCREMENTA humorum, maximè
pituitosorum ac putridorum, è ventricu
lo & aliis nutritoriis instrumentis educit:
crassos in iis etiam flatus dissoluit, ma
laque hinc nata sanat; verbi gratia, in
flationem ventriculi, colicos & renum
dolores.

*Electuarium Indum minus,
D. Mesue.*

A ʒ.	Turbith optimi	ʒ	vj.
	Sacchari tantundem		Macis
	Garyophyllorum	Piperis	Zingiberis
	Cinnamomi electi		
			Carda-

Cardamomi maioris

Ulcis moschatae ana ʒ viij.

Scammonae correctae ʒ xij.

Mellis optimi despumati triplum, hoc
est ℞ ij. ʒ j. ʒ j. ★

P. C. SCHOL.

Turbith ʒ viij.] Mihi, Desfennio, alijsq; A
idetur Cordus hic mutilus, Turbith tantum
x drachmas huic medicamento indens, cen-
sum drachmas in Mesue scriptum fuisse dicen-
bus multis. Ego vero cum nulla ratione cen-
sum drachmas admittere queam, medicamenti
prescriptionis ratione habita, qua Indum mi-
nus appellatur, vix quinquaginta drachmas ad-
mittendas esse concedere possum, ut in Indo ma-
iori: nū in ambabus idem Scammonii pondus
contra controuersiam cerneretur. De decem tan-
tum drachmis aut duodecim, deq; viginti quin-
que drachmis legentibus quibusdam exempla-
ribus nunc nihil dico. Tanta est hoc in pondere
hic varietas.

Interim si Turbith pondus (preter Cordi-
mentem) augetur, augenda quoque erit, pro
triplicitatis ratione, mellis quantitas.

HABET intentionem maioris.

Confectio Hamech maior,
D. Mesue.

℞. Myrobal. Citrinorum ʒ iiij.
Chebulorum Indorum
℥ s

Rha-

- Rhabarbari ana \mathfrak{z} ij.
 Agarici Colocynthidis
 Polypodii quercini ana \mathfrak{z} xvij.
 * Absinthii Thymi
 * Senæ ana \mathfrak{z} vj.
 Violarum \mathfrak{z} xij.
 Epithymi \mathfrak{z} ij.
 Anisi Fœniculi
 Rosarum ana \mathfrak{z} vj.
 Succi Fumi terræ \mathfrak{l} j.
 Prunorum num. lx.
 Passularum maiorum enucleatarum \mathfrak{z} vj.

Infundantur omnia in seri quantitate
 sufficienti, & ponantur in vitreato vase
 angusti orificii, bene obturato, & dimit-
 tantur per dies quinque, [aut tres potiùs.]
 Postea ad ignem ferueant vna atque altera
 ebullitione: deinde colentur. In parte
 colaturæ dissolue

- Pulpæ Casiæ \mathfrak{z} iiij.
 * Pulpæ Tamarindorum \mathfrak{z} v.
 Mannæ \mathfrak{z} ij.

Agitentur simul, & adiiciatur

- * Sacchari in altera colaturæ parte clarifi-
 cati \mathfrak{l} j. β .

Coquantur simul ad mellis spissitudi-
 nem: deinde aspergatur subscriptarum spe-
 cierum puluis:

- Scammonæ bonæ \mathfrak{z} j. β .
 Myrobal. Citrinorum Chebulorum
 Indorum ana \mathfrak{z} β .

Belle-

Bellericorum Emblicorum

habarbari

Femini Fumi terre ana 3 iij.

picæ Nardi Indicæ

Anisi ana 3 ij.

Confice secundum artem.

MORBIS omnibus ex flava bile &
 vituita salsa natis, nempe impetigini, sca-
 roici, elephantia & cancro succurrit. In
 summa, omni fœditati cutis à biliosis, &
 adustis humoribus procreatæ conuenit.
 [Melancholicis quoque utiliter datur.]

*Confectio Hameck minor**D. Mesuæ.*

℞. Myrob. nigrorum [id est, Indorum]

Chebulorum

Epithymi ana 3 L.

Fumi terræ Absinthii ana 3 xx

Thymi Calaminthæ

Polypodii quercini

Agarici Glycyrrhizæ

Buglossæ ana 3 x.

Stœchados Arabica

Chamedryos [videlicet vera]

Chamæpityos [id est, Iuxta moschata]

Bedeguaris [eius loco sume Carduum benedi-
ctum]

Anisi ana 3 v.

Prunorum Iujubarum

I 6

Sebe-

Sebesten ana num. LXX.

Passularum enucleatarum ℞ j.

* Decoquantur in aqua sufficienti vsque ad tertias. Colentur, & colaturæ addantur Sape ℞ ij.

Mellis despumati ℞ j.

Scammonæ correctæ ℥ ij.

Coquantur lento igne vsque ad mellis spissitudinem.

PURGAT Melancholiam, & vstos humores alios: ob id confert mania, melancholia, vertigini, obliuioni, & vitio cutis, qualia sunt psora, id est, scabies, morpha, cancer, elephantia, impetigo: & morbus Gallicus.

Diaphœnicon D. Mesue.

℞. Dactylorum Hieron enucleatorum, ac tribus diebus in aceto maceratorum ℥ ij. ℥ ij.

Penidiarum ℥ j. ℥ j.

Amygdalorum [dulcium] ℥ v.

Turbith ℥ v. ℥ ij. β.

* Scammonæ [i. Diagridii] ℥ ij. aliis

℥ iij. ℥ ij.

* Zingiberis Piperis longi

Foliorum Rutæ

Cinnamomi Macis. Ligni Aloës

Anisi Fœniculi Dauci

Galangæ ana ℥ j. ḡ v.

A Mellis despumati triplum, hoc est, ℞ j.

℥ iij. ℥ vj.

Fiat

at secundum artem electuarium.

P. C. SCHOL.

Mirum est in hoc tam frequentis usus, tamq̃
obiosa atque difficilis compositionis medica-
mento, adeò ut etiam à duobus Pharmacopœis
eodem concinnetur modo; mirum inquam,
sic silere, nihilq̃ ferri dicere (ut Euchsium si-
am) Francisc. Apollinem, eundemq̃ tam in-
pidum esse, ut quid per Amygdala absolutè
sic posita, intelligendum; quantum Scammo-
ni (nam admodum diuersa est lectio) quan-
tum Mellis, in quo hoc loco grandior, quàm in
quouis alio medicamento, cardo versari debe-
ret, sumendum sit, nihil Apolline dignum pro-
ferat, aut ridicula indicet atque scribat: cum
tamen plurimis locis, verborum ac vocum in-
genuas multas myriades temerè ac futiliter effun-
dat. Quoniam verò (quantum ad Mellis quan-
tatem attinet) seneque hinc uniuersali regula
abuti velle dicat Franciscus: per quam si Mel-
lis triplum intelligat, nōne libra nouem Mel-
lis hinc sumenda erunt, admodū à tribus procul?
Num igitur ad auctoris mentem compositio-
nem hanc se restituisse, ut inquit, gloriari de-
bet? Hunc itaque, hunc Apollinem consulat
Pharmacopœus oportet, ut radiis eiusdem illu-
minatus (nam undique ferè est sibi similis) un-
dequaque etiam cacuiat atque exorbitet.

Febribus compositis & diuturnis auxi-
liatur. Bilem enim flauam & pituitam du-
cit. Colicis cruciatibus mirificè confert:

item doloribus ventriculi, & aliis malis
ex crudo humore ortis.

Diaphœnicon in forma solida.

Rx. Dactylorum infusorum in aceto tribus
diebus ac noctibus numero vj.

Seminis Ligustici ʒ ij.

Pineorum nucleorum

Amygdalorum dulcium ana ʒ xv.

Turbith ʒ xij.

Diagridii ʒ xj.

Sacchari Candi ʒ ij.

Piperis longi Zingiberis

Foliorum Rutæ

Cinnamomi Macis Fœniculi

Anisi Dauci Galangæ

Ligni Aloës ana ʒ j.

A Sacchari l' j.

Fiat confectio in rotulis, secundum ar-
tem.

*Ista confectio solida Diaphœnicon plerisque
medicis est vsui.*

P. C. SCHOL.

A F j.] Mutilum in hac Sacchari quantitate
esse Cordum, si ad precedentis Diaphœnici,
aliâsve cum Saccharo paratorum medicamen-
torum rationes contuleris, necesse est; Typogra-
phi forsan vitio. In eandem nihilominus na-
sam satis imprudenter, immò pueriliter ceci-
dere

re Fuchsius & nonnulli alii : ita cecum ceco
calatur.

Diafena D. Nicolai.

Senæ ʒ iij.
 Ruellanarum tostatarum num. L.
 Serici tosti ʒ ij.
 Lapidis Armeni loti ʒ j.
 Lapidis Lazuli loti ʒ iij.
 Sacchari ʒ vj.
 Cinnamomi ʒ j.
 Caryophyllorum Galangæ Piperis
 Spicæ Nardi Indicæ Ocymī
 foliorum Caryophyllorum
 Cardamomi
 Croci Zingiberis Zedoariæ
 Florum Rorismarini
 Macropiperis ana ʒ ij.
 Mellis despumati l' ij.

LAPIS ARMEXUS, est similis lapidi Lazuli, sed non est tantopere ceruleus, sed magis viridis.

FOLIA Caryophyllorum sunt similia foliis Lauri, & odorem atque sorem habent Caryophyllorum: eorum loco sume Caryophyllos ipsos.

Succurrit melancholicis, mania vexatis, & quartana tristitiaque affectis, lienosis, & omnibus malis ex atra bile procreatis.

Beno-

Benedicta laxativa D. Nicolai.

℞. Turbith electi

Sacchari ana ʒ x.

A Diagridii Esulæ Hermodactylorum

Rosarum ana ʒ v.

Garyophyllorum

Spicæ Nardi Indicæ

Zingiberis Croci

Saxifragiæ Macropiperis

Amomi [sumatur Acorus verus eius loco,
vel Calamus aromaticus]

Cardamomi minoris Seminis Apii

Salis Gemmei Galangæ Macis

Carui Fœniculi Seminis Asparagi

Seminis Rusci [id est, Brusci]

Granorum solis [id est, Milii solis] ana ʒ j.

Mellis despumati optimi tripulum, hoc

* est, ℞ j. ʒ v. ʒ v.

Confice secundum artem.

*Per semen Asparagi & Rusci intellige carnem
& pulpam eius: reiectis nucleis ossibus.*

P. C. SCHOL.

A Esulæ.] Nullo pacto placent Fuchsi alio-
rumq; sententia, hîc Esula ʒ x. esse sumendas
arbitrantium: etenim cum Cordo ʒ v. suffi-
cere bonaratione dico. Brevis undique esse cogor.HUMORES pituitosos, potissimum
ad articulos decumbentes, elicit. A reni-
bus quoque & vesica purgat.*Electua-*

*Electuarium Eleschof sine Episcopi,
D. Mesue.*

. Scammoneæ Antiochenæ [vel Dia-
gridii]

Urbith optimi ana ʒ vj.

Maryophyllorū Cinnamomi Zingiberis

Iyrob. Emblicorum Nucis moschatae

Polypodii ana ʒ ij. β.

Sacchari ʒ vj.

Mellis despumati triplum, id est ʒ x. ʒ j.

P. C. SCHOL.

Sacchari ʒ vj.] *Præter exempla ex Mesue,*

Præterq̃ rationes, Fuchsius & Franciscus

Alexand. hic ʒ vj. legunt.

BILEM flauam & piritam elicit: fla-
uus quoque expellit: doloribus articulo-
rum, laterisque prodest, itemque colicis
cruciatibus: ad renes etiam & vesicam de-
cumbentes humores expurgat.

Electuarium de Psyllio D. Mesue.

℞. Succi Buglossæ domesticæ

Succi Buglossæ agrestis Succi Endiuia

Succi Apii, omnium coctorum & despu-

matorum ana l' ij.

Succi Fumi terræ ʒ iij.

In quibus macerentur per xxiiij. horas
subsequentia:

℞. Cu-

R. Cuscutæ Anisi Senæ ana ℥ β.
Capilli Veneris m. j.

A Afari ℥ iiij.

Spicæ Nardi Indicæ ℥ ij.

Bulliant aliquantulum, adiiciendo

Violarum ℥ iiij.

Epithymi ℥ ij.

Hæc postquam modicè bullierint, co-
lentur: & colaturæ iniiciantur

Psyllii seminis integri ℥ iiij.

Macerentur per xxiiij horas, singulis
horis agitando: deinde sume expressæ à

Psyllio mucilaginis l' iiij.

Sacchari albissimi l' ij. β.

Coquantur lento igne ad perfectionem,
addendo pulueris

★ Trochiscorum Diarhodon

de Spodio

de Rhabarbaro ana ℥ j.

de Berberis ℥ β.

★ Scammonii in Cytonio malo cocti ℥ iiij.

Confice secundum artem.

*Per Buglossam domesticam potes intelligere
Boraginem, vel magnam illam Italicam Bu-
glossam.*

P. C. SCHOL.

A Afari ℥ iiij.] Sic legendum esse, ritè quoque
Fuchsius monet. Cordus enim, Afari, Spica
ana ℥ ij. perperam hîc legebat.

FLAVAM bilem euocat, febribus ar-
dentibus & curatu difficilibus auxiliatur;
dolori

dolori capitis & vertigini à biliosorum
umorum evaporationibus procreatis,
morbo regio, & iecori supra modum ca-
facto.

Electuarium Rosatum D. Mesue.

℞. Succi Rosarum rubearum perfectarum
℥ iij.

Sacchari Tabarzeth [*id est, albi*] ℥ j. β.

Mannæ puræ & recentis ℥ vj.

Scammoneæ Antiochenæ ℥ j. β.

Coquantur sensim ad ignem mollius-
culum, dum ad mellis consistentiam
usque densescant: deinde insperge

Trochiscorum de Spodio ℥ j.

Trochiscorum de Berberis ℥ iij.

Galliæ moschatæ veræ

Crociana ℥ ij.

Reponatur in vase vitreo.

Est cholagogum clemens: ob id sa-
lubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ,
cephalgia calidæ, vertigini, oculorum
dolori, ictero.

*Electuarium de Succo Rosarum
D. Nicolai.*

℞. Succi Rosarum rubrarum

Sacchari albissimi ana ℥ j. ℥ iij.

Diagridii ℥ j. ℥ iij.

San-

Santali rubri Santali albi
 Santali citrini ana ʒ vj.
 Spodii de Ebore ʒ iiij.
 Caphuræ ʒ j.

Succus Rosarum cum Saccharo ad iustam consistentiam coquatur, deinde tria species adiiciantur.

Hac compositio potest fieri in forma solida.

Expellit flauam bilem citra molestiam: ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febresque tertianas confert.

*Diaturbith cum Rhabarbaro,
 D. Montagnana.*

℞. Turbith optimi
 Hermodactylorum ana ʒ j.
 Rhabarbari ʒ x.
 Diagridii ʒ iiij.
 Santali albi Santali rubri Violarum
 Zingiberis ana ʒ j. β.
 Mastiches Anisi Cinnamomi
 Croci ana ʒ β.
 Sacchari albißimi triplum, hoc est ℞ j.
 ʒ ij. ʒ ij.

Potest fieri in liquida & solida substantia.
 Est Cholagogum, Phlegmagogum, &
 Melanogogum. [Verminosis & hydropicis vtile.]

Dia-

*Diaturbith maius D. Petri de
Tusignano.* *

℞. Turbith optimi ʒ j.
Diagridii
Zingiberis ana ʒ iiij.
Cinnamomi
Caryophyllorum ana ʒ ij.
Galangæ Piperis longi
Macis ana ʒ j.
Sacchari albissimi ʒ viij. ʒ v.
E N V C I T phlegmaticos humores, &
purgat, & calefacit.

*Diaturbith minus Zazaris, ex Mesue **
cap. de Turbith.

℞. Turbith albi & gummofi ʒ x.
Zingiberis ʒ v.
Mastiches ʒ iiij.
Sacchari albissimi ʒ vi. ʒ vj.
LEVITER purgat phlegma à stomacho.

Diacarthamum D. Arnoldi A
de Villanova.

℞. Specierum Diatragacanthi frigidi ʒ β.
Pulpæ Cytoniorum ʒ j.
Medullæ seminis Carthami ʒ iiij.
Zingiberis albi ʒ ij.

Dia.

Diagridii ʒ ij.

B Turbith ʒ vj.

* Mannæ granatę ʒ ij.

Mellis rosati colati ʒ j.

* Hermodactylorum ʒ iiij.

Sacchari albissimi ʒ x. ʒ iiij.

Fiat in liquida substantia.

Cùm autem species reseruare volueris, mel rosatum non conuenit addere.

P V L P A siue caro Cytoniorum hic requiritur exsiccata.

P. C. SCHOL.

A Diacarthamum.] Cùm apud diuersos auctores diuersimodè legatur Diacarthami descriptio, atque hanc quoque ab Arnoldi variare dicat Franciscus Alexander; Arnoldo tamen hanc acceptam feremus, tantisper dum eiusdem genuinam descriptionem Franc. Apollo in Arnoldi nobis libris monstrauerit. Interea quoniam hanc utilem repererint multi, eam conficere Officine possunt.

B Mannæ ʒ ij.] ʒ ij. hic legi debere vel pueri animaduertent. ita ut à tot tantisq; viris (qui alioquin se satis emunctæ natæ esse putant) id non esse olfactum, stupeſcam. Sed innumera huiusmodi hocce in libello restituta conspicias, ab aliis ne cogitata quidem; quorum rationes in aliud tempus seruamus.

PRODEST in euacuatione cholæræ & phlegmatis.

Hicra

Hiera Picra simplex D. Galeni. A

Cinnamomi

Globalsami [*aut succedanei ovis*]

Sari Spicæ Nardi Indicæ Croci

Anistiches Chia ana ʒ vj.

Aloës non lotæ ʒ c.

Mellis despumati ꝑ iiij. ʒ iiij.

Cum hæc confectio magis confortatiua
 quam solutiua esse debeat, cum aloë lota
 conficienda est.

P. C. SCHOL.

*Ut ex ipsissima Galeni mente confectio hac A
 retur, qualiq; modo à peritis medicis hodie
 nunci iubetur: Croci ʒ v. & Aloës ʒ xc. tan-
 tum imponenda sunt.*

CONTRA biliosos, putres, marcidosque
 humores, qui ori ventriculi insederunt, re-
 medio est; item iis quorum faciem pallor
 decolorauit: iis quoque quorum oculis
 obiectæ culicum aut pilorum imagines
 obuersantur. Alui recrementa mediocriter
 mouet, ad iecur vsque progrediens: lædit
 quibus iecur calidius exhibet negotium;
 & stomachum iuuat.

Hiera picra cum Agarico.

℞. Specierum Hieræ simplicis sine Aloë
 Agarici

Agarici Trochiscati ana ʒ iiij.
 Aloës non lotæ ʒ j.
 Mellis despumati ʒ vj.

Hiera Picra composita D. Nicolai.

R. Cinnamomi
 Spicæ Nardi Indicæ
 Croci Schœnanthi Asari
 Xylocassia
 Xylobalsami } quorum loco sumantur sua
 Carpobalsami } cedanea, ut supra.
 Violarum Absinthii Epithymi Agarici
 Rosarum Turbith Colocynthidis
 A Mastiches ana ʒ ij.
 Aloës non lotæ ʒ x. ʒ ij.
 Mellis despumati ʒ viij.

P. C. SCHOL.

A Ana ʒ ij.] Fuchsius ana ʒ ʒ. legi vult, Cor-
 dum reprehendens; cum in idem recidant: con-
 cluduntur enim simplicia omnia unico ana: &
 Aloës ad pondus omnium legunt Nicolai exem-
 plaria. Inaxis itaque est Fuchsi reprehensio.

FACIT ad diuersas capitis, & aurium
 & oculorum distemperantias: stomachum
 quoque optimè purgat: affectiones hepa-
 tis emendat: splenis duritiam & densita-
 tem emollit & extenuat. Renibus & vesi-
 cæ prodest, & matricis distemperantiam
 emendat.

Hiera

*Hieralogodium, seu potius Hiera
Logadii, D. Nicolai.*

. Pulpæ Colocynthidis
 Polypodii ana ʒ ij.
 Ephorbii Polii montani minoris
 Cocci Gnidii ana ʒ j. β. ḡ vj.
 Absinthii
 Myrrhæ Troglodyticæ ana ʒ j. ḡ xij.
 Centauræ minoris Agarici
 Hammoniæ
 Olii [aut succedanei eius]
 Opicæ Nardi Indicæ Scillæ assatæ
 Diacridii ana ʒ j.
 Aloës Comarum Thymi
 Cassiæ lignæ Chamædryos Bdellii
 Prassii ana ʒ ij. ḡ xiiij. **A**
 Cinnamomi Opopanacis Castorei
 Aristolochiæ longæ Leucopiperis
 Macropiperis Melanopiperis Croci
 Petroselinæ Macedonici
 Sagapeni ana ʒ β.
 Hellebori nigri
 Hellebori albi ana ḡ vj.
 Mellis despumati triplum, hoc est ʒ x. .
 ʒ iiij. ʒ j. ḡ iiij.
*Quædam exemplaria habent Colocynthidis
 ʒ ij. sed maximo errore: nos itaque veram com-
 positionem Nicolai Alexandrini sequimur, qui
 habet hanc proportionem.*
K **Cocci**

Cocci Gnidii debent esse 3 j. β. ḡ xij. Alexandrinum Nicolaum sequi volumus impressum, qui habet 3 xvij. & hac compositi habet decimam partem Nicolai: itaque si 3 j. β. & ḡ xij. multiplicantur per decem, erunt 3 xvij.

Nota 3 ij. & ḡ xiiij. sunt decima pars drachmarum nouem: in Nicolao autem Alexandrino impresso non nouem, sed undecim legitur sed hoc factum est vitio librarium, xj. pr ix. ponentium, quamuis impressus codex pr xj. habeat rs. id est undecim per ciphras scriptum. Quod autem legendum sit ix. & non xj. indicat degradatio ponderis in tota hac confectione.

P. C. SCHOL.

A 3 ij. ḡ xiiij.] Fuchsius sinistrè ex Myreps legit hic 3 j. tantum.

B Cocci Gnidii debent esse 3 j. β. ḡ xij.] In Nicol. Alex. non aduertit mendum Cordus. Non enim 3 xvij. sed 3 xvj. legendum esse, & ratio & Myrepsus Fuchsii docent: quare in contextu 3 j. β. ḡ vj. rectè à Cordo posita sunt prater suam ipsiusmet existimationem.

Exterminat diuturnas & inueteratas passionēs, id est, maniam, & omnes melancholias atque epilepsias. Scoromaticos, id est vertiginosos & spumantes, cauducos, & qui sibi præmordent linguam cephalalgicos, hemicranicos, & qui ita vexantur ex capitalibus commotionibus

vivi

videantur quasi demonium habere, qui
 opellantur spatici, data purgat, ne in-
 indium aut lipothymia generetur corpo-
 , quod suprascriptis passionibus subia-
 et; quibus inuitis etiam medetur. Para-
 ticis & tremulis subuenit. Datur indi-
 estis, cardiacis, pleuriticis, hepaticis,
 pleneticis. Elicit menstrua. Nephreti-
 os, arthriticos, & ischiadicos suble-
 at: Venena & venenatas passiones &
 morsus admodum persanat: Lepras &
 arias zermas emendat. Est autem sine
 illo periculo; neque alias molestias in-
 fert accipientibus: daturque de ea ter
 n mense pondus drachmarum trium, cum
 nulsæ cyathis iij. & salis cochleari.

*Hiera Pachii, ex descript. Nicolai
 Alexandrini.*

℞. Stæchados	Marrubii
Chamædryos	Agarici
Colocynthidis	ana ℥ x.
Opopanacis	Sagapeni
Petroselinii	Mali terræ
Piperis albi	ana ℥ v.
Cinnamomi	Spicæ Nardi
Myrrhæ	Folii
Croci	ana ℥ iij.
Mellis despumati triplū, id est ℥ cclxxxv.	
qui faciunt ℥ iij. 3 iij. ℥ v.	
Arida omnia in tenuissimum puluerem	
K 2	tundito:

tundito: liquores verò, opopanax, si-
gapenum, electa & pura in mortario tun-
dito. deinde in feruenti mortario cum
melle despumato feruenti adhuc vnito, &
reliquis misceto, cum omnino leuigat
fuerint. Cum verò mel ad dissoluendo
hos liquores accipies, de suprascriptis
quantitate sumito, nihil addendo.

MALVM terra, id est, radix Aristoloch
rotunda vera.

Scribonius Largus mirum in modum effe-
huius Hiera virtutes, quemadmodum etia
Marcellus. Itaque non abs re fuerit tunc
uti, cum & nos eius efficaciam aliquoties ex-
pertissimus.

✱ hac nota significat Romanis scriptoribus
denarium. Est autem denarius pondus Romani-
num, drachmâ paulò grauius. Nam drachmæ
octo faciunt unciam, cum denarii septem con-
stituunt unciam: non rarò tamen indifferenti
pro drachma accipitur, sed malè.

Compositio hæc sanat morbo comitia-
corruptos, furiosos, scotomaticos, &
phalalgicos: facit ad deprauatam in vtran-
libet partem. Ad Tetanum, & Cynicum
spasmodum, præcipuè verò ad pectoris & li-
teris dolores prodest, ex qualibet causa
factos siue latente & occulta, siue manife-
sta. Præterea neruorum tensionibus miri-
ficè conuenit: Prodest ad articulare
morbum, ad spinæ totius & lumborum
dolorum.

orem. Duritias in mammis mulierum
 in dolore consistentes, ex toto interdum
 mat. Ad stomachicos euidenter conue-
 nit. Remediat enim eos quibus frequen-
 ter acefcit cibus, aut affiduè naufeant aut
 iua abundant. præcipuè verò Melan-
 cholicis benefacit, &c.

*Catharticum Imperiale, D. Nicolai
 Alexandrini.*

Diagridii
 Sacchari ana 3 viij.
 Cinnamomi Nardi
 Saxifragiæ
 Polypodii ana 3 iiij.
 Caryophyllorum
 Zingiberis
 Celticæ [*id est, Spice Celtica*]
 Macropiperis Melanopiperis
 Cardamomi
 Amomi [*eius vice sume nostrum Calamum
 aromaticum*] ana 3 iiij.
 Mellis despumati P j. 3 iiij. 3 vij.

SAXIFRAGIA, quam Græci describunt,
 mediam habet figuram, & magnitudinem in-
 ter Pulegium & Thymum. Germanicè voca-
 tur Stinplei, [*aut Steinpoey.*]

CAPUT optimè purgat, os bene olens
 reddit: ex stomacho & toto corpore
 utramque bilem deducit.

K 3

Pal-

Pulvis medicaminis Turbith,
D. Auicenna.

℞. Zingiberis albi
 Mastiches ana ʒ x.
 Turbith subtiliss. puluerizati ʒ x.
 Sacchari Tabarzeth quantum eorum est.
 Commisceantur.

P V R G A T humores phlegmaticos: da-
 tur pueris, mulieribus, senibus, & humi-
 dis, delicatis & otiosis.

Pulvis Senæ preparata,
D. Montagnana.

℞. Senæ mundatæ ʒ xij.
 Zingiberis
 Macis ana ʒ iij.
 Cinnamomi
 Tartari ana ʒ j. β.

Hæc in puluerem redacta commiscean-
 tur.

Dosis ʒ j. ante cœnam.

P V R G A T caput mirabiliter.

Pulvis aut Tragea laxativa.

℞. Turbith ʒ j.
 Zingiberis Cinnamomi
 Mastiches Galangæ
 Cardamomi minoris

Garyo-

aryophyllorum

nifi Hermodactylorum

iagridii ana ℥ β.

oliorum Senæ ℥ ij.

acchari ℥ iiij.

Misceantur in puluerem contrita.

Purgat choleram, phlegma & melancho-
liam.

Puluis Sternutatorius.

℞. Radicum Pyrethri ℥ β.

Castorei ℥ β.

Hellebori albi

Hellebori nigri ana ℥ j.

Maioranæ m. j.

Misceantur : fiat puluis lege artis.

Nasalia.

℞. Calaminthæ

Maioranæ Radicis Ireos

Seminis Nigellæ Castorei

Seminis Staphysagriæ ana ʒ j.

Hellebori albi Pyrethri

Nucis moschata Myrrhæ rubæ

Euphorbii ana ʒ ij.

In pulueres singula conterantur : dein-
de cum Ladani ʒ vj. & melle modico
formentur nasalìa.

K 4

SVP.

SUPPOSITORIA.

Suppositoria simplicia conficiuntur ex melle & sale simul coctis ad debitam consistentiam.

Species ad Glandes, aut Suppositoria acuta conficienda.

℞. Hellebori albi
 Granorum Colocynthis ana ℥ j. β.
 Esulæ præparatæ
 Hermodactylorum ana ℥ j.
 Specierum Hieræ picræ simplicis Galeni
 ℥ ij.
 Misceantur puluerizata.

PILVLÆ.

Pilulæ Alephanginæ, D. Mesuæ.

℞. Cinnamomi Cubebarum
 Ligni Aloës
 Calami aromatici Macis
 Nucis moschatæ
 Cardamomi
 Caryophyllorum Asari
 Mastiches Schœnanthi
 Spicæ Indicæ
 Carpobalsami [*aut succodanei eius*] ana ℥ j.
 Abstin.

Rosarum ana 3 v.
 Conterantur grosso modo, & infun-
 untur in aquæ P duodecim, & coquantur
 in igne in duplici vase, vsque ad con-
 sumptionem duarum partium, id est, ad
 remanentiam tertiæ partis: deinde expri-
 mantur fortiter, & colentur. In colatu-
 re P duabus dissolue Aloës Succotrinæ
 multoties in vitreo vase lotæ, cum aqua
 uiuali, & iterum siccata, l'j. agitentur
 simul continuè in Sole: deinde addantur
 pulueris Myrrhæ, Mastiches ana 3 v.
 Croci 3 iij. Deinde quod reliquum est
 colati decocti ex aromatibus etiam affun-
 dito, & exiccetur ad Solem vel in stufa,
 admiscendo subinde quod densatum est,
 liquido: & linteo puro vas obtegatur,
 duersus incidentium muscarum & for-
 tium iniurias. Postremò reponatur massa,
 & fiant Pilulæ parvæ, cum necessitas re-
 quirat.

PILULÆ Alephangine compositæ sunt à
 Mesue, ut confortent potius stomachum & ce-
 rebrum, quàm ut alium ducant. Propterea
 Aloën toties lotam requirit, & nullum solu-
 tiuum medicamentum eis admiscet, sed con-
 fortantia omnia, nisi quis solum Asarum ex-
 cipiendum esse contendat.

Iste Pilule ubique sunt in frequenti usu, se-
 rarissimè ut decebat conficiuntur. nam deira-
 bunt pondori & numero aromatum, & augent

K 5

pondus

pondus Aloës : quidam etiam impurissimam Aloën admiscunt , aut ipsius Aloës sordes. Porro miror cur Mesue iubeat ut decoquantur aromata, cū tamen omnia aromata tenuissimis censcent viribus, qua facile inter decoquendum resolvuntur : adeo etiam, ut deinde ipsum decoctum aut colatura, prorsus non sapiat aromata quae incocta fuerant. Sed quia ita preparari hanc massam voluit Mesue, in nulla re immutabimus eius placitum.

Quidam confectioni huius massa Pilularum Alephanginarum consulentes, dimidiam aromatum partem cum aqua decoquunt, & Aloën in colatura dissolunt : alteram autem partem aromatum in minutissimum pulverem redactam, inter exiccandum massae admiscunt; non absurda admodum ratione, si aromata decoctionem sustinerent.

VENIRICVLUM, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putridis, pituitosis purgant, & induratum dolorem dissipant : ventriculum roborant, & concoctionem eius iuuant.

Pilula Assaieret, D. Avicennae.

R. Specierum Hieræ picæ, descriptione

Galenī ʒ j.

Mastiches

Myrobal. Citrinorum ana ʒ β.

Aloës optimæ ʒ ij.

Syrus

rupi de Stœchade q. s.

Fiat Massa

BILEM flauam & pituitam sine mo-
stia è ventriculo potissimùm vacuant.
Quapropter iis qui caputè ventriculo do-
nt, conueniunt; nec non in subtilibus
tarrhis.

Pilula Arabica, D. Nicolai.

Aloës optimæ ℥ iiij.

radicis Bryoniæ

Myrobalanorum Citrinorum

Myrob. Chebulorum Myrob. Indorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorū

Castiches Diacridii Asari

Castorei ana ℥ j.

Croci ℥ iiij.

Succi Fœniculi q. s.

Fiat Massa.

VALENT ad capitis dolorem, ver-
iginem, hemicraniamque. Lætitiā ge-
nerant, mentisque vigorem conseruant:
Visum acuunt, auditumque amissum re-
parant: Ac stomachum à vitiosis humori-
bus purgant.

*Pilula Arthritica sine Arthetica,
D. Nicolai.*

℞. Hermodactylorum Turbith

K 6

Aga-

- Agarici ana ʒ iiij.
 * Colocynthis Casia lignee verae
 Spicae Nardi Indicæ
 Caryophyllorum
 Xylobalsami [aut succedanei eius]
 Carpobalsami [aut succedanei eius]
 * Macis Galangæ
 * Zingiberis Mastiches
 * Assæ foetidæ Fœniculi
 Anisi Saxifragiæ
 Seminis Asparagi
 Seminis Rusci [id est, Brusci]
 Rosarum
 Granorum solis [id est, Milii solis]
 Salis gemmei ana ʒ β.
 * Scammonii ʒ ij.
 Aloës optimæ ad pondus omnium
 Succii Fœniculi q. s.

Fiat Massa.

*Ex Asparagi & Rusci seminibus tantum pul-
 pa illa carnosæ accipi debet, abiectis corneis seu
 ossis seminibus: idq; semper est obseruandum.*

VALENT ad podagram, aliosque ar-
 ticulorum dolores.

Pilula de Agarico D. Mesuæ.

- * ℞. Agarici ʒ iiij.
 Ireos
 * Prassii ana ʒ j. Turbith ʒ v.
 Hieræ picræ ʒ iiij. Colo-

Colocynthis

Carocollæ ana ʒ ij.

Myrrhæ ʒ j.

Sapæ quantum sufficit.

Fiat Massa

Ego consulerem, ut Hierapicra nondum nelle commista acciperetur, hoc est, species eius aromatica cum Aloë tantum mista: intelligenda autem est Hierapicra simplex Galeni.

SAPA est mustum optimum, ad tertias decoctum.

Auxiliantur asthmaticis, & aliis thoracis vitiis à crassis & pituitosis humoribus natis.

Pilula Aurea, D. Nicolai.

R. Aloës Diacridii ana ʒ v.

Rosarum

Seminis Apii ana ʒ ij. β.

Anisi Fœniculi

Mastiches ana ʒ j. β.

Croci

Pulpæ Colocynthis ana ʒ j.

Mucilaginis [seu infusionis] Tragacanthæ q. s.

Fiat Massa.

CAPUT expurgant, aciem oculorum exacuunt, flatus ventriculi & intestinorum dissolunt, ac citra molestiam aluum deliciunt.

K 7

Pilula

Pilula Aggregativa, D. Mesue.

℞. Myrobal. Citrinorum
 Raved. Seni ana ʒ iiij.
 Succī Eupatorii
 * Succī Absinthii ana ʒ iij.
 Diacridii ʒ vj.
 Myrobal. Chebulorum
 Myrobal. Indorum
 Agarici Colocynthidis
 Polypodii ana ʒ ij.
 Turbith optimi
 * Aloës ana ʒ vij.
 Mastiches Rosarum
 Salis gemmei Epithymi
 Anisi Zingiberis ana ʒ j.
 Electuarii de succo Rosarum Mesuæ q. s.
 Fiat Massa.

RAVED Seni, id est, Rhabarbarum Orientale optimum.

SUCCI Eupatorii & Absinthii debent esse inspissati, ut Aloë.

Per Eupatorium hoc loco intelligendum est Eupatorium quod Mesue describit, quod idem est cum Gratiola. Germanicè vocatur Weyssaurin: copiosè nascitur ad Albin. igitur hic erit faciendus eius succus.

VALENT ad diuturnas febres, & vitia capitis, ventriculi & iecinoris. Humores item biliosos & pituitosos educunt.

Pilula

Pilula Benedictæ, D. Nicolai.

℞. Specierum Benedictæ laxatiuæ ʒ vi.

℞. Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

Humores pituitosos, potissimum
in articulos decumbentes, eliciunt: à re-
bus quoque & vesica purgant.

*Pilula Cochiae D. Rhasis 9 ad
Almansorem.*

℞. Specierum Hieræ picræ Rhasis ʒ x.

Colocynthidis ʒ iij. ʒ j.

Scammoneæ ʒ ij. β.

Turbith Stœchadis ana ʒ v.

Syrupi de Stœchade quantum sufficit.

Fiat Massa.

STOECHAS cum simpliciter & indefinite
ponitur, semper est intelligenda Stœchas Arabica.

Cephalicæ [Pilulæ] rectius appellan-
tur, quòd scilicet caput magna efficacia
expurgent, ex eoque ac nervis humores
crassos euacuent.

*Hiera picra Rhasis, 9. ad Almansor.
ad faciendum Pilulas Cochias.*

℞. Rosarum rubearum

Spicæ Nardi Indicæ

Mastiches

Xylo-

Xylobalsami *[aut succedanei eius]*

Carpobalsami *[aut succedanei eius]*

Cinnamomi

★ Xylocasia veræ *[id est, Casia lignea]*

Afari *[videlicet radicum eius]* ana ʒ j. ʒ vj.

Aloës ʒ vj. ʒ ij.

Fiat Puluis.

Pilula de Colocynthide, D. Mesue.

R. Pulpæ Colocynthidis ʒ vj.

Myrobal. nigrorum *[id est, Indorum]*

Myrobal. Citrinorum

Sagapeni Bdellii mollis

★ Sarcocollæ ana ʒ v.

Aloës ʒ vj.

Nigellæ Cymini Carmeni

Origani Persici

Nasturtii albi Salis gemmei

Absinthii ana ʒ j.

Succi Porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

CYMINVM Carmenum, id est, Orientale, ex Carmania regione.

ORIGANVM Persicum, idem est quod Creticum Origanum, & est Maiorana simile.

NASTURTIVM album, id est, Thlaspi, Germanicè Wegekressen: significat etiam Merreisch.

VALENT ad affectus pituitosos & melancholicos, vt alphas curatu difficiles, & iuncturarum dolores.

Pilula

*Pilula de Eupatorio maiores
D. Mesua.*

Myrobal. Citrinorum
Succi Eupatorii Mesuae
Succi Absinthii ana ʒ iiij.
Raued Seni [id est, Rhabarbari] ʒ iiij. ʒ.
Mastiches ʒ j.
Croci ʒ ʒ.
Aloës bonæ ʒ v.
Succi Endiuiae quantum sufficit.

Fiat Massa.

MIRIFICE profunt in febribus in-
termittentibus biliosis, morbo regio, ic-
terici minorisque obstructionibus.

Pilula de Euphorbio D. Mesua.

ʒ. Euphorbii
Colocynthis Agarici
Bdellii mollis
Sagapeni ana ʒ ij.
Aloës ʒ v.
Succi Porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

Ad emittendam hydropicorum flauam
aquam, & materiam tumoris discuti-
dam valent: Opem quoque afferunt lum-
borum doloribus, & podagrae humida
causa concitatæ.

Pilula

Pilula Foetida maiores, D. Mesuae.

℞. Sagapeni Hammoniaci
 Opopanacis
 Bdellii mollis Colocynthis
 Seminis Rutæ
 Aloës Epithymi ana ʒ v.
 Hermodactylorum
 Esulæ minoris ana ʒ ij.
 Scammonææ ʒ iiij.
 Cinnamomi Spicæ Nardi Indicæ
 Croci Castorei ana ʒ j.
 Turbith ʒ iiij.
 Zingiberis ʒ j. β.
 Euphorbii ʒ ij.
 Succī Porri [præsertim foliorum] q. s.
 Fiat Massa.

VACVANT pituitam crassam, crudam: ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, doli spinæ & aliarum iuncturarum, ventriculi, colico, alphis, elephantia, & albaras.

Pilula Foetida, D. Rhafis.

℞. Specierum Hieræ picæ Rhafis ʒ x.
 Colocynthis interioris ʒ v.
 Euphorbii ʒ ij. β.
 Castorei Piperis Assæ foetidæ
 Saga-

Opopanax Scitaragi
 Scitaragi ana 3 i.
 Scitaragi ana 3 v.
 Gummi, siue lachrymæ & liquores omnes
 insati, in succo Rutæ q. s. dissoluantur:
 inde admistis reliquis fiat Massa.

SEITARAGI, siue Seytari Indum, est
 herba similis Thlaspi maiori, id est Merretich:
 atque vocatur Lepidium maius: Germanicè,
 Grosse Kressen, Psafferwurtx, Romischkressen, &
 Taurkressen: accipiendæ autem sunt radices
 us, aut semina.

ELATERIVM, id est, succus fructuum
 Cucumeris asinini exsiccatus.

Pilula de Fumo terræ, D. Auicenna.

Myrobal. Citrinorum
 Myrobal. Chebulorum
 Myrob. nigrorum [id est, Indorum] ana 3 v.
 Aloës 3 vij.
 Scammonæ 3 v.

Succi Fumi terræ clarificari quantum suf-
 ficit, ut formetur ter hæc massa: nam
 cum primò fuerit siccata massa, plus
 succi est addendum; & rursus exicce-
 tur; idque tertio est faciendum.

EDVCUNT è corpore humores bilio-
 sos, acres & falsos: ideoque aduersus om-
 nia cutis vitia valent.

Pilula

*Pilula de Hermodactylis maiores,
D. Mesuæ.*

℞. Hermodactylorum
Myrobal. Citrinorum
Aloës Turbith Colocynthidis
Bdellii mollis Sagapeni ana ʒ vj.
Castorei Sarcocollæ Euphorbii
Opopanacis Seminis Rutæ
Seminis Apii ana ʒ iij.
Crocī ʒ j. β.
Succi Caulium quantum sufficit.
Fiat Massa.

Aduersus podagram & arthritin profunt.

Pilula Indæ Haly, D. Mesuæ.

* ℞. Myrobal. nigrorum [*id est, Indorum*]
* Hellebori nigri Polypodii ana ʒ v.
Epithymi Stœchados ana ʒ vj.
Agarici Lapidis Lazuli loti
* Colocynthidis
* Salis Indi [*aut Salis gemmei*] ana ʒ iij.
Succi Eupatorii inspissati
Spicæ Indicæ ana ʒ ij.
Garyophyllorum ʒ j.
Hieræ picræ simplicis Galeni ʒ xij.
Succi Apii quantum sufficit.
Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos,
can-

ancrum, elephantiam, albos nigros cutu
tu difficiles, melancholicum morbum,
inde ortum timorem & mœrorem,
martanam, icterum spleneticum, & do-
rem splenis.

*Pilula Hieræ simplicis, Galeni,
lib. 6. Tuenda val.*

℞. Aloës 3 L.

A

Cinnamomi

Xylobalsami [aut succedanei eius]

Asari Spicæ Nardi Indicæ Croci

Mastiches Chiæ ana 3 iij.

Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

P. C. SCHOL.

*Pilulis his, ut ex Galeni ipsissima sententia A
conficiantur, & voluti apud peritiores hodie
usus obtinuit, Aloës 3 xlv. & Croci 3 ij. β.
tantum hîc indenda sunt.*

ADVERSUS vitia ventriculi ex humo-
ribus biliosis & pituitosis nata, profunt.

*Pilula de Hieræ composita,
D. Nicolai.*

℞. Cinnamomi

Spicæ Nardi Indicæ Croci

Schœnanthi Asari Xylocastie

Xylobalsami [aut succedanei eius]

Carpo-

Carpobalsami [aut succedanei eius]

Violarum Absinthii

Epithymi Agarici

Rosarum Turbith Colocynthis

Mastiches ana ʒ j. [al. ʒ ij.]

★ Aloës ad pondus omnium, hoc est ʒ ij.

Fiat Massa cum aqua Endiuiae.

OPem ferunt vitiis capitis, nervorum-
que ab humoribus pituitosis procreatis.

Pilula Hieræ, cum Agarico.

℞. Specierum Hieræ simplicis Galeni

Agarici Trochiscati ana ʒ iiij.

Aloës bonæ ʒ j.

Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

AUXILIANTVR stomachicis, asth-
maticis, & aliis stomachi ac thoracis vitiis
à crassis & pituitosis humoribus natis.

*Pilula de Lapide Lazuli, siue Cyaneæ,
D. Mesuæ.*

℞. Lapidis Lazuli abluti ʒ vj.

Epithymi Polypodi ana ʒ viij.

Scammonæ Hellebori nigri

Salis Indi, aut Gemmei ana ʒ ij. ℞.

Agarici ʒ viij.

Garyophyllorum Anisi ana ʒ iiij.

★ Specierum Hieræ simplicis Galen ʒ xv.
Succi

Acci Endiuix quantum sufficit.

Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos,
bile vsta natos.

Pilula de Lapide Armenio,

D. Mesue.

Lapidis Armenii loti & præparati

hieræ picæ ana ʒ v.

bithymi Agarici

glypodii ana ʒ viij. *

cammonæ coctæ in Cytonio ʒ iiij.

myophyllorum ʒ j.

olis Indi [aut Gemmei] ʒ j. β.

cum succo Endiuix conficiatur Massa.

MELANCHOLIAM, & bilem vstam

multiplicem vtramque clemēter vacuant:

id morbis inde natis conferunt.

Pilula de Mezereo D. Mesue.

Foliorum Mezerei præparatorum ʒ v.

Myrobal. Citrinorum ʒ iiij.

Myrobal. Chebulorum ʒ iiij.

Confice cum Thereniabin vel Tama-
indis in aqua Endiuix dissolutis q. s.

THERENIABIN siue Tereniabin, est
Manna Orientalis, que Græcis vocatur Droso-
meli & Aëromeli.

SEROSVM excrementum valenter pur-
gant, seu aquas: ob id hydrofem sanant.

Pilula

Pilula Lucis maiores, D. Mesue.

R. Rosarum Violarum Absinthii
 Colocynthis Turbith Cubebarum
 Calami aromatici
 Nucis Moschatae
 Spicae Nardi Indicae Epithymi
 Carpobalsami [*aut succedanei eius*]
 Xylobalsami [*aut succedanei eius*]
 Seselios Seminis Rutae
 Schoenanthi Asari
 Mastiches Garyophyllorum
 Cinnamomi
 Anisi Foeniculi Apii
 Cassiae lignae [*videlicet verae*]
 Croci Macis ana ʒ ij.
 Myrobal. Citrinorum
 Myrobal. Chebulorum
 Myrobal. Indorum
 Myrobal. Bellericorum
 Myrobal. Emblicorum
 Raved Seni [*hoc est, Rabarbari*] ana ʒ
 Agarici Senae ana ʒ v.
 Euphrasiae ʒ viij.
 Aloës Succotrinae ad pondus omnium
 id est ʒ viij. & ʒ ij.
 * Succo Foeniculi quantum sufficit.
 Fiat Massa.
 EXCREMENTA capitis pituita
 educunt, visumque roborant.

Pil.

Pilule Lucis minores, D. Mesue.

℞. Xylobalsami [aut succedanei eius]
 Carpobalsami [aut succedanei eius] ana ʒ j.
 Chelidonia [videlicet maioris radicis] ʒ v.
 Rosarum Violarum Absinthii
 Suphragiae ana ʒ iij.
 Sennae Epithymi
 Myrobal. Citrinorum
 Myrobal. Chebulorum
 Myrobal. Indorum
 Myrobal. Bellericorum
 Myrobal. Emblicorum
 Agarici Colocynthidis
 Schœnanthi Lycii
 Lapidis Lazuli loti ana ʒ ij. β.
 Aloës optimæ ad pondus omnium
 Succii Fœniculi aut Chelidonia quantum
 sufficit.

Fiat Massa.

Idem quod priora possunt; atram ta-
 men bilem magis vacuant.

*Pilule Mastichinae Petri de Ebano, A
 sine Conciliatoris.*

℞. Mastiches ʒ iiij.
 Agarici optimi ʒ iij.
 Aloës electæ ʒ x.
 Infundatur Agaricus in Aceto & Oxy-
 melle

- * melle simplici liquidiusculo per diem & noctem, & rursus exicceretur: deinde formetur Massa cum succo Artemisiæ, aut cum Syrupo de Stœchade.

P. C. SCHOL.

- A *Eo quod Cordus bis eandem pilularum harum descriptionem posuerat, ponderibus tantum in altera quadruplicatis, nos unam earum tamquam frustraneam expunximus.*

Præservant stomachum ab omni ægitudine: leniter purgant, & maximè confortant, & non permittunt humores corrumpi; & qui eis utuntur, præservantur à doloribus stomachi, capitis, ventris, & matricis: conferunt tristibus & melancholicis: & vitia matricis corrigunt.

*Pilule de Aloë & Mastiche,
D. Nicolai.*

℞. Aloës ʒ j. Mastiches ʒ β.
 Garyophyllorum
 Rosarum rubearum ana ʒ j.
 Croci Diacridii ana ʒ ij.

Conformetur Massa cum succo Fœniculi aut Absinthii.

Respiciunt virtutem naturalem: purgant incolumiter stomachum à phlegmate & à cholera.

Pilule

Pilule de Aloë lota.

℞ Aloës lotæ cum succo Rosarum rubearum ʒ j.

garici Trochiscati ʒ iiij.

lastiches ʒ ij.

pecierum Diamoschi dulcis ʒ β.

Cum vino Maluatico cogantur in massam.

VENTRICULUM, cerebrum, viscera reliqua, oculos, uterum putridis humoribus purgant, & roborant.

Pilule de Rhabarbaro,

D. Mesue.

℞ Raved Seni [idest, Rhabarbari] ʒ iiij.

Succi Glycyrrhizæ Succi Absinthii

Mastiches ana ʒ j.

Myrobal. Citrinorum ʒ ij. β.

seminis Apii

seminis Fœniculi ana ʒ β.

Trochiscorum diarhodon ʒ iiij. β.

Hieræ picræ simplicis ʒ x.

Aquæ Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

IN febribus diuturnis, iccinoris obstructionibus, & aquæ inter cutem initiis conferunt.

L 2

Pilula

*Pilula Pestilenciales Ruffi, quæ aliter
De tribus vocantur.*

R. Aloës electæ ℥ ij.
 * Myrrhæ optimæ ℥ j.
 * Croci sinceri ℥ β.

Confice cum vino aromatico.

MIRIFICÆ aduersus pestiferæ lui
 contagia populatim grassantia pōllent
 Humores etiam ventriculo infarctos edu
 cunt.

*Pilula de Sarcocolla Haly,
D. Mesuæ.*

R. Sarcocollæ ℥ iiij.
 Turbith ℥ iiij.
 Colocynthidos
 Zingiberis ana ℥ j. β.
 Salis Gemmei ℥ j.
 Aquæ Rosarum q. s. Fiat Massa.

PITUITAM vacuant: ob id pituitosi
 affectibus commodant.

* *Pilula Sine quibus esse nolo,
D. Nicolai.*

R. Aloës optimæ lotæ ℥ xiiij.
 Myrobal. Citrinorum
 Myrobal. Chebulorum

Myro

Myrobal. nigrorum [*id est, Indorum*]
 Myrobal. Bellericorum
 Myrobal. Emblicorum
 Habarbari Mastiches Absinthii
 Rosarum Violarum Senę Agarici
 Muscutę ana ʒ j.
 Scammoneę præparatę ʒ vj. β.
 Dissoluatur Scammonea in succo Fœ-
 culi sufficienti; & cum hac dissoluta
 Scammonea formetur Massa.
 Mirabiliter purgant choleram, phleg-
 ma & melancholiam: valent propriè ad
 Cataractas, & obscuritates oculorum, vi-
 sum custodientes: & aurium dolorem sa-
 nant, & iliosis conferunt.

Pilula Stomachicę Alkindi, D. Mesuę.

Myrobal. Citrinorum
 Myrobal. nigrorum
 Myrobal. Chebulorum ana ʒ iij.
 Rosarum Mastiches ana ʒ ij.
 Cardamomi Ligni Aloës
 Santali Citrini Cubebarum
 Caryophyllorum Schœnanthi
 Lucis moschatę ana ʒ j. ★
 Maues Seni [*id est Rhabarbari*] ʒ β.
 Turbith ʒ vij.
 Aloës ad pondus omnium.
 Fiat Massa [cum vino odorifero &
 melle.]

L ʒ Cere-

Cerebrum, & ventriculum corruptis humoribus purgant, ventriculum roborant, concoctionem iuvant, appetentiam excitant.

Pilule Stomachicae D. Mesue.

℞. Myrobal. Citrinorum Aloës
Turbethi ana ʒ x.
Rosarum Spica Indica
Mastiches ana ʒ ij. β.
Anisi ʒ j. β.
Salis Indii [aut salis Gemmei]
Croci ana ʒ j.

Formetur Massa cum succo Absinthii.

Biliosos & pituitosos vacuant humores, eos potissimum qui caput & ventriculum obsident.

*Pilule Imperiales Magistrales,
sen incerti auctoris.*

℞. Cinnamomi
Amomi [eius loco sumatur Acorus verus]
Anisi Mastiches
Cardamomi minoris
Zingiberis Zedoariae Maceris
Nucis Moschatae
Garyophyllorum Croci
Cubebarum Ligni Aloës Turbethi
Terentiabin [id est, Mannæ] Agarici
Folio

Foliorum Senæ

Spicæ Indicæ [*addant alii*]

Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. Indorum

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ʒ j.

Rhapontici veri [*id est, Rhabarbari,*] ad
pondus omnium

Aloës quantum totum æquat.

Conficiantur cum Syrupo Rosato aut
Violato.

MODICVM solunt; & plurimum
confortant stomachum, & omnia inte-
stina frigida: muniunt virtutes naturales,
remouent frigiditatem, clarificant san-
guinem & spiritum.

Pilula de Opopanace D. Mesua.

℞. Opopanacis Hermodactylorum

Sagapeni Bdellii mollis Ammoniaci

Colocynthidos ana ʒ v.

Crocii Castorei

Myrrhæ rubræ Zingiberis

Piperis nigri Macropiperis [*id est, longi*]

Cassie lignæ Myrobal. Citrinorum

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ʒ j.

Scammonæ ʒ ij.

Turbethi ʒ iiij.

Aloës ʒ xij.

L 4

Cogan-

Cogantur in massam cum infusione
gummi in aqua caulium.

VALENT ad paralyfim, spasum cy-
nicum, gonagram, podagram, & aliorum
articulorum dolores, morbosque partium
neruofarum frigidos.

Pilule de Quinque generibus Myrobal.
D. Nicolai.

R. Quinque genera Myrobalanorum
Agarici Diacridii Colocynthidos
A Senæ ana ʒ β.
Epithymi Turbethi Anisi
Marathri [seu Fœniculi] Mastiches
Lapidis Lazuli præparati ana ʒ ij.
Aloës ʒ j.

Formetur massa cum succo Absinthii.

P. C. SCHOL.

A Ana ʒ β.] Cum Cordus hic ana ʒ β. depra-
uatè posuisset, Fuchsius a què malè ʒ ij. β. le-
gendum putat.

EDVCUNT humorem cholericum,
phlegmaticum & melancholicum; & cla-
rificant sanguinem.

Pilule de Octo rebus, siue Octomera,
D. Nicolai.

R. Aloës Diacridii ana ʒ ij.
Interioris Colocynthidis Epithymi
Aga-

Agarici Mastiches Dauci Cretici
Myrob. Chebulorum Absinthii ana ʒj.
Cum succo Solani conformetur massa.

PURGANT humores crassos à capite:
visum clarificant; & cataractas oculorum
prohibent.

Pilule de Serapino, D. Mesue.

ʒ. Sagapeni Ammoniaci Opopanacis
Bdellii ana ʒ ij. Sem. Apii Ammios *
Harmalæ [*id est, seminis Ruta siluestris*]
Anisi ana ʒ j.
Acori [*id est, Calami aromatici*]
Cassie lignee veræ Calaminthæ A
Centaurii [*minoris scilicet*]
Polii Costi Salis gemmei ana ʒ β. *
Aloës ʒ vj. Colocynthidos ʒ v.
Cogantur in massam cum aqua aut suc-
co Matricariæ.

NOTATO: Ingreditur secundum Mesue
Seitaragum Indum. sed Clementius Clementi-
nus loco eius posuit Cassiam ligneam.

P. C. SCHOL.

Cassie] Seitaragi Indi (quod Lepidium hoc A
loco interpretandum) apud Mesuem legi, rectè
olfecit Fuchsius; fallig. Cordum & Clementi-
num dextrè censet.

POLLENT ad ischiadem, podagram,
& reliquarum iuncturarum dolorem, ac
etiam vteri; mensesque promouent.

L 5

Pilula

Pilula de Bdellio maiores, D. Mesua.

R. Bdellii ʒ xij. Amnios ʒ iij.
 Myrob. Chebulorum Myrob. Indorum
 Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorū

* Conchularum venerearum adustarum

Succini aut Karabæ ana ʒ ij. β.

Maceretur Bdellium in succo foliorum
 Porri, & conficiatur massa.

VALENT ad fluxum hæmorrhoidum &
 vlcera in eis, & ad menses immodicos.

Pilula de Cynoglossa D. Nicolai.

* R. Cynoglossæ rad. Opii

Seminis Hyoscyami ana ʒ iiij.

Myrrhæ Troglodyticæ ʒ vj.

Turis masculi ʒ v.

Garyophyllorum ʒ ij.

Cinnamomi Styracis rubei ana ʒ ij.

Cum aqua rosarum conficiatur massa.

MAGNAM vim obtinet in tenuibus fi-
 stendis destillationibus, ac doloribus mi-
 tigandis.

Pilula Bechicæ.

R. Pineorum nucleorum

* Amygdalorum ana ʒ j. β.

Glycyrrhizæ ʒ vj.

Succi

Succi Glycyrrhizæ ʒ iiij.

Cum aqua Rosarum conformetur massa.

ADVERSUS tussim veterem pollent,
& gutturis ac faucium asperitatem.

Pilula Alephangine D. Valerii Cordi.

℞. Myrobalan. Chebulatorum

Myrobalan. Citrinorum

Myrobalan. Indorum

Myrobalan. Bellericorum

Myrobalan. Emblicorum ana ʒ ʒ.

Acori veri Galangæ Zedoariæ

Doronici Romani Radicularum Asari

Dictamni nostratis radicem Absinthii

Rosarum ana ʒ iiij.

Contundantur omnia crassiusculè, &
Myrobalani per se macerentur priùs in
aquæ clarissimæ fontanæ ℞ iiij. per horas
xxiiij. deinde coquantur donec ferè tertia
pars aquæ sit in vaporem resoluta: postea
coque etiam radices & aromata lento igne
in duplici vase, cum aquæ clarissimæ ℞ vj.
& affunde his antea costas Myrobalanos
cum suo iusculo: vltimò Rosas adiicien-
do, coquantur vsque ad tertias. Coletur
postea validè exprimendo. Hinc in cola-
tura dissolue

Aloës optimæ & lotæ, ac rursus exiccat
℞ iiij.

Ponantur omnia in vitrea patina ad so-

L 6 lens

lem, aut in stufam; & agitentur fapiffimè,
 vt concrefcens in margine Aloë liquido
 commifceatur: cùm verò mellis fpiffitudi-
 nem fuerint cōfecuta, tunc adde fequentiū
 fpecierum puluerem minutiffimè tritum:

℞. Galagæ Cyperi Zedoariæ Doronici
 Ligni Aloës Cinnamomi Schœnanthi
 Nardi Celticæ radicularum

Nucis Moſchatae

Macis Cubearum Cardamomi

Garyophyllorum ana 3 iiij.

Maffiches

Succini [*id eſt, Caraba*] ana 3 vj.

Myrrhæ Croci ana 3 iiij.

Agitentur optimè cùm Aloë fpecies, &
 fiat maſſa cum diligentia.

MYROBALANI omnes hoc pondus de-
 bent habere, exemptis nucleis ſive lignis.

PILVLAE iſtæ Alephangine ſunt effica-
 ciores prioribus. Relinquimus tamen
 unicuique liberum arbitrium, alterutram vel
 utramque componendi.

Hoc loco non debet poni Diſtamnus Creti-
 cus, ſed radices Diptamni, quæ vulgò in uſu
 ſunt, & propriè cortex radicum eius. Germani-
 cè vocatur Aſchuvuriz, propterea quòd folia
 eius ſunt ſimilia Fraxino ardori: & hæc eſt vera
 Fraxinella, vulgò ab Italis dicta.

Aloën lauandi modus in poſtrema huius li-
 bri parte, quæ eſt De preparatione ſimplicium
 medic. docebitur.

TRO-

TROCHISCI.

Trochisci de Vipera, D. Andromachi.

Carnis viperinæ, cū anetho, sale & aqua
coctæ ℥ viij.

anis tritici purissimi, triti & cribrati, ℥ ij. *

Formentur trochisci cum iusculo, in

quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ; &

ungantur cum Opobalsamo, aut Oleo

lacis aut Garyophyllorum, aut Nucis

moschata: sed Oleum Garyophyllorum

propius accedit ad naturam Balsami. Sic

mentur in loco vmbroso, libero, ventoque

perflabili.

VIPERA est serpens, quem recentiores vo-

unt Tirum, Itali verò Marassam & Scurzio-

em, ut scribit Nicolaus Leoniceus. Ingre-

ssuntur autem hi Trochisci in Theriacam. Apud

is verò nondum licuit videre hoc serpentum

nus. Igitur ex Italia peti debent veri Tro-

chisci de Vipera.

Trochisci Scillitici Andromachi.

Scillæ assatæ P j.

arinæ Orobi ℥ viij.

Formentur Trochisci secundum artem.

L 7

Tro-

Trochisci Hedychroi, D. Aëtii.

R. Mari [sive Maiorana, aut loco eius Dictamni Cretici]

Asari Sampfuchi

Aspalathi [eius loco sumatur semē Agni casti]

Opobalsami [eius loco accipiat Oleum Garyophyllorum]

Schœnanthi

Calami aromatici [eius loco sumatur Galāga]

Phu Pontici ana ʒ j. ʒ xv.

Xylobalsami Cinnamomi

Costi ana ʒ j. β.

Myrrhæ Troglodyticæ

Folii [aut succedanei eius]

Spicæ Nardi Indicæ Croci

Cassia ana ʒ iiij. β. ʒ xv.

Amomi [aut succedanei eius] ʒ ij. ʒ xiiij.

* Mastiches ʒ β. ʒ vij. β.

Vini veteris odorati dulcis quantum sufficit : formentur Trochisci.

MARVUM herba est non dissimilis Maiorana : Eius loco accipitur Dictamnus Creticus.

SAMPSUCHVS, id est, Maiorana. Quidam habent Amaracum, quod idem est. Non enim debet hoc loco accipi Matricaria, aut Centaurea foetida, quæ etiam vocatur Amaracus.

ASPALATHVS est cortex quidam odoratus. Eius loco accipe Lignum Aloës, aut Santalum Citrinum odoratissimum, aut semen Agni casti.

FOLIUM

FOLIUM] Pro Folio sume Spica Romana
adicum, Macis, ana partes aequales.

Hi Trochisci appellantur ab Arabibus Alin-
aracaron; à recentioribus verò, ut Nicolao,
sunt parum immutati, & vocantur Diacoralli.

Trochisci Hedychroi, D. Galeni.

℥. Corticum radicum Aspalathi [ipsius lo-
co sumatur semen Agnicasti]

Calami aromatici [sume eius loco Galangā]

Costi Asari Xylobalsami Phu

Amaraci [hic significat Maioranam]

Mastiches ana 3 vj.

Schœnanthi Cinnamomi ana 3 xij.

Amomi Casia *

Rheu pontici [eius loco sume Rhabarbarum]

ana 3 xv.

Nardi Indicæ

Folii ana 3 xvj. *

Myrrhæ Croci ana 3 xij. *

Omnia subtilissimè trita cum vino Fa-

lerno, in Trochiscos formentur: qui in

umbra exsiccentur, & Opobalsamo aut

Oleo Garyophyllorum inuncti reponan-

tur.

G A L E N U S in libello De Theriaca ad Pam-

philianum scripto, ad hunc modum precipit

conficiendos esse Hedychroos Trochiscos. Sunt

enim proximis non ignaviores.

Pro Aspalatho, quo caremus, licet accipere
semen

semen Agnicasti, aut Lignum aloës, aut Santalum citrinum odoratum. Oportet etiam diligenter advertere, ne pro Aspalatho Aspalium legatur aut accipiatur.

Pro Amomo vero, quo caremus, pone Carpesum, aut vocatum Calamum aromaticum.

Pro vino Falerno, accipe aliud quodvis vinum generosissimum.

P. C. SCHOL.

Troch. horum descriptionem in Cordo vitiatâ positam, hîc ex Andernaci versione restitui.

Trochisci Hedychroi alii, Galeni.

Rz. Mari Amaraci [id est, Majorana]
 Afari Aspalathi ana 3 ij.
 Schœni [id est, Squinantibi]
 Calami odorati Phu Pontici
 Xylobalsami [aut succedanei eius]
 Opobalsami [aut succedanei eius]
 Cinnamomi Costi ana 5 iij.
 Myrrhæ
 Folii Malobathri [aut succedanei eius]
 Nardi Indicæ Croci
 Casiæ ana 3 vj.
 Amomi [aut succedanei eius] 3 xij.
 Mastiches Chiæ 5 j.
 Vini Falerni quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & in umbra exiccantur, Opobalsamo aut oleo Garyophyllorumuncti.

Pro

TROCHISCI. 257

Pro Maro, sume Diſſamnum Crelicum.

ASPALATHI loco ſume Lignum Aloës,
& Santalum Citrinum, aut ſemen Agni Ca-
, ut Galenus de Succedaneis dicit.

Pro Calamo, ſume Galangam.

Pro Opobalſamo, ſume oleum Garyophyl-
um.

Pro Malobathro, ſume Spica Romana radi-
; aut Spica Romana Radicum, & Macis
na partes aquales.

CASIA, id eſt, Caſia lignea aromatica, A
nilis Cinnamomo.

AMOMI loco ſume vocatum Calamum
romaticum.

MASTICHE Chia, id eſt, Maſtix è Chio
ſula, qua eſt optima.

HÆC eſt genuina Hedychroi compositio,
& Galenus dicit; & hac debet ingredi Theria-
um Andromachi ſenioris.

GALENVS primo libro de Antidotis ad
unc modum carmine deſcribit compositiorem
Hedychroi magmatis, ubi Theriaca compositio-
em docet. Non tamen diligenter diſtinguit pon-
era rerum. Nam omnia coniungit coniunctio-
ibus copulatiuis, & x̄, hoc eſt, QVÆ & ET.

Trochisci Cyphi, D. Damocratis. A

℞. Carnium Vuæ paſſæ albæ & pinguiſ-
ſimæ

Cerebinthinæ coctæ ana ʒ xxiiij.

Myr.

Myrrhæ

Schœni [*id est, Schœnanthi*] ana ʒ xij.

Calami vnguentarii ʒ ix.

Cinnamomi ʒ iiij.

B Bdelii Onychis Nardi Spicæ

Casię optimæ [*quæ est similis Cinamomo*]

Cyperi purgati

Arceuthidum maximarum & pinguiſſi-
marum ana ʒ iiij.

Aspalathi ʒ ij. β. Croci ʒ j.

Mellis optimi

Vini ana quantum satis est ad formandum
& incorporandum.*MELLIS & Vini parum debet addi, vi-
tantum cum his conficiantur Trochisci.**CARNES Vuæ passa atque Iuniperi bac-
cas recentes & pingues minutissimè conscindito
tunditoq; deinde Bdelium Myrrhamq; affuse
vino diluito: postea reliqua omnia in tenuissi-
mum puluerem redigito: ac demum adhibito
modico mellis despumati optimi, Trochiscos for-
mato.**Arabes hos Trochiscos vocant Cochion.**Per Vuas passas hîc intellige eas quas vocant
Vuas Cybibas, vulgò Cibeben.**TEREBINTHINÆ cocta. Quomodo
coquatur Resina Terebinthina, ostendam infe-
rius in tractatu De præparatione medicamen-
torum.**CALAMVS vnguentarius, id est, aroma-
ticus verus; pro quo sume Galangam; quia
hodie*

hodie caremus vero Calamo aromatico.

ONYCHIS, id est, Blatta Byzantia
eleſta.

CYPERVM purgatum precipit accipien-
dum, quoniam plerumque febris sordidis sunt
obſta radices eiuſ.

ARCEVTHIDES, sunt bacca Iuniperi.
hic autem debent accipi Iuniperi magna gran-
des bacca: quoniam autem caremus ipsis, vul-
garis & minoris Iuniperi baccas accipere licet.

Pro Aſpalatho ſumatur ſemen Agni Caſti,
ex mente Galeni de Succedaneis.

P. C. SCHOL.

Troch. hi apud Galenum leguntur l. 2. Antid. A

Onychis, Bdellii.] Fuchſius unà cum B
Corda duas hic diſtinctas res legit, intelligit ac
deſendit mordicus. Matthiolus verò atque
Franciſcus contrà, unà cum Andernaco &
Mariano Rota Galeni interpretibus pro unica
eademque re, ambas eas voces intelligendas eſſe
ſtrenuè contendunt, & Vnguim Bdellii tanquàm
Bdellium ungui ſimile, legendum eſſe ſentiunt
atque volunt.

Trochiſci Ramich, D. Meſue.

R. Succı Acetofæ [aut loco eiſ ſucci Cydo-
niorum auſterorum] ʒ xvj.

Rofarum ʒ j.

Granorum Myrti ʒ ij.

Bulliant parum, & colentur: colaturæ
addan-

addantur Gallarum iamiam tenuissimè
tritarum ℥ ij.

Coquantur denuò aliquantulum: dein-
de inspergatur sequentium specierum mi-
nutilsimus & optimè commistus pulvis:

R. Rosarum ℥ j.

Santali Machoziri ℥ j. 3. ij.

Gummi Arabici ℥ j. 3. iiij.

Carnium Sumach Spodii ana ℥ j.

* Succi Agrestæ 3 vij.

* Succi granorum Myrti multum tritorum
3 iiij.

* Ligni Aloës

Garyophyllorum

Mastiches [al. Macis]

Nucis Moschatæ ana 3 iiij.

Misceantur omnia optimè, deinde ex-
siccantur: exsiccata rursus in tenuissimum
pulverem terantur; & formentur Trochisci
subtiles, cum Camphoræ aureo vno, &
aqua Rosarum q. s. Exsiccantur in umbra
libera: exsiccati reponantur.

VENTRICULUM, cor, hepar, im-
becilla firment: & lubrica viscera ac inte-
stina, choleram morbum sistunt, acrimo-
niam obtundunt, animum reddunt tran-
quillum, omnem hæmorrhagiam cohi-
bent: ob quam naribus sanguine fluenti-
bus flando impelluntur, aliis medicamen-
tis miscentur.

Tro.

Trochisci de Cappare, D. Mesue.

2. Corticum radicum Capparis
 seminis Agni Casti ana 3 vj.
 seminis Nigellæ veræ Calaminthæ
 succi Eupatorii, idest, Gratiolæ]
 Alcori *
 Amygdalorum amarorum
 sem. Nasturtii Ammoniacy
 foliorum Rutæ
 Radicis Aristolochiæ rotundæ veræ ana
 3 ij.
 Cyperi
 Scolopendriæ ana 3 j.
 Formentur Trochisci cum Hammonia-
 co prædicto in aceto dissoluto, & exiccati
 reponantur.

SCOLOPENDRION est Ceterach, &
 non Lingua ceruina.

P. C. SCHOL.

Troch. de Capp.] Compositionem hanc A
 apud Cordum mancam esse cum Euchsus me-
 ritiò conqueratur, nos enim hic ex vetustis par-
 tim exemplaribus, partim ex Minoritarum in
 Mesuem (ex quibus pleraque alia) restitutio-
 nibus, sue integritati reposuimus. Qui, in-
 quam, Fraterculi hoc nomine herclè plurimum
 laudis ac præmii merentur, quòd extra profes-
 sionem etiam ea in re plura præstiterint soli,
 quàm innumeri alii; quamquam eos cassitare
 quas-

quandoque, & iudicio carcere interdum satis sit in confesso: laborem interim indefessum, quem in restituendo impenderunt, negotiumque ipsum tam ingens, tantiq; commodi nobis prestitum haud exosculari, magnisq; efferre praconiis non debemus. Immerito itaque nimisq; quam deceat, à quibusdam exagitantur boni fratres.

Ad splenis duritiem & flatus eius distillandos valent.

*Trochisci de Eupatorio
D. Mesue.*

Rx. Tereniabin [idest, Manne]

Succi Eupatorii ana ʒ j.

* Rosarum ʒ β. Spodii ʒ iiij. β.

Spicae Nardi Indicæ ʒ iiij.

Rhabarbari Asari

Anisi ana ʒ ij. β.

Formentur Trochisci cum aqua Cuscutæ, & in umbra libera ventoq; perflata exiccati reponantur.

Pro Spodio sumatur Ebur combustum.

EUPATORIUM Mesue, intelligendum est Gratiola.

OBSTRUCTIONEM & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydroperem.

Tro-

Trochisci Diani, seu potiùs, Diaion, A
D. Nicolai.

Florum Violarum viridium 3 v.
Ani 3 iij.
Papaveris albi 3 ij. 3 j.
Rhabbari 3 j. 3 ij.
Plantaginis 3 j. *
Sami [loco eius Olei Gargophyllorū] 3 j.
Rhodostagmatis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

DIANI, vel DIAVI, aliàs vocantur
Trochisci, sed corrupto nomine.

PER VIOLAS, hoc loco oportet intelli- B
Violas albas, quæ hodie vocantur Cheyri
rini, vulgò Gelbe Violen.

Per Balsamum intelligitur Opobalsamum.

RHODOSTAGMA, id est, Aqua Ro-
um.

P. C. SCHOL.

Troch. Diani.] Horum Troch. duas descri- A
ones in idem recidentes, alterius pondere
tuum triplicato, mendoq; in Rhabbari pon-
e sublato, temerè Cordus posuerat. Mancè
ibidem 3 j. quod & Fuchsius ritè ani-
duerterat, positus erat, cum 3 j. 3 ij. ut
titui, legendum sit.

Per Violas.] Malè id sentit Cordus, ut & B
Fuchsius docet: non enim Dialencoion, hoc
, ex Violis albis, quas Cheyri vocamus, sed
Dia-

Diaion, hoc est, ex Violis nigris seu Martiis dictis, appellantur hi Trochisci. Viola itaque Martie viuentes hic intelligenda veniunt.

EXCALFACTIONES mitigant, al-
umque emolliunt.

Trochisci de Lacca, D. Mesue.

℞. Laccæ mundatæ

Succi Glycyrrhizæ

Absinthii

Berberis

Succi Eupatorii [*id est, Gratiola*]

Rhabarbari

Aristolochiæ longæ

Costi

Asari

Amygdalorum amarorum

Rubæ Tinctorum

Anisi

Apii

Schœnanthi ana ʒ j.

Formantur Trochisci dragmæ pondere
cum aqua Eupatorii.

*Mesue intelligit suum Eupatorium, id est,
Gratiolam.*

Trochisci de Lacca valent ad obstructio-
nes hepatis & lienis, & inde natas febres
varias antiquas, & ascitem per vrinas mo-
uent.

Trochisci Diarhodon D. Nicolai.

℞. Rosarum viridium ʒ iiij.

Spodii [*id est, Eboris combusti*] ʒ ij.

San

TROCHISCI.

265

Santali rubri ʒ j. ʒ. ʒ vij.

Santali albi ʒ j. ʒ xij.

Croci ʒ ij. ʒ viij.

Camphoræ ʒ xij.

Aquæ Rosarum quantum sufficit, formentur Trochisci.

Ista compositio debet administrari in magnis confectionibus ipsius Nicolai.

Trochisci de Rhabarbaro D. Mesue.

R. Raved boni [id est, Rhabarbari] ʒ x.

Succi Eupatorii [id est, Gratiolæ] ʒ iiij.

Rosarum ʒ iiij.

Spicæ Nardi Indicæ Anisi

Rubiæ tinctorum Seminis Apii

Absinthii Asari ana ʒ j.

Amygdalarum amararum ʒ iiij.

Formentur Trochisci aurei vnus pondere, cum aqua Cuscutæ.

VALENT ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inueteratos eiusdem, & hydropem, & icterum, & formæ corruptionem.

Trochisci de Berberis D. Mesue.

R. Berberis ʒ ij.

Spodii Xyloaloës

Seminis Accosæ Mastiches

M Galliæ

266 TROCHISCI.

Gallię Moschatæ veræ

* Spicæ Nardi Indicæ ana ʒ i.

Rosarum ʒ v.

Gummi Arabici ʒ iiij.

Aquę Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

TROCHISCI de Berberis seu Oxy-
canthæ valent ad intemperiem calidam
fluorem alui, & hepatis dolorem.

*Trochisci Gallię Moschatæ,
D. Mesuæ.*

Rx. Xyloaloës crudi ʒ v.

Ambraë ʒ iiij. Moschi ʒ j.

Mucilaginis Tragacanthę cum aqua
Rosarum factę quantum sufficit.

Formentur Trochisci parui.

CEREBRVM, corque roborant: vo-
mitum & alui profluuium sistunt: oris a-
que adeò corporis totius odorem con-
mendant.

*Trochisci Aliptę Moschatę,
D. Nicolai.*

* Rx. Ladani purissimi ʒ iiij.

Styracis Calamitæ ʒ j. ʒ.

Styracis rubrę ʒ j.

Ligni Aloës ʒ ij. Ambraë ʒ j.

Camphoræ ʒ j. Moschi ʒ ʒ. ʒ.
Aqua

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

STYRAX rubra, hic non significat Thymia-
ma, aridum illud & nigrum corticem; sed
resinam Syracis; quæ subrusa aut flava est,
id est, optima Syrax.

VALENT pueris patientibus asthma
& constrictionem pectoris, & etiam non
valentibus lac retinere. Fit inde optimum
fumigium & odoriferum: & assumuntur
etiam ad pretiosissimas medicinas.

*Trochisci de Agarico D. Mesue,
cap. de Agarico ex Haly.*

℞. Agarici electi ℥ iij.

Salis gemmei ℥ j.

Syrupi acetosi simplicis quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & reponantur in
calido siccoque loco.

PURGANT ex cerebro & capite phleg-
ma crassum cum cholera mistum. Et præ-
cipuè educunt ex pectore crassos humores,
putridos & viscosos.

*Agaricus Trochiscatus D. Mesue,
cap. de Agarico ex Galeno.*

℞. Agarici electi ℥ iij.

Vini infusionis Zingiberis q. s.

Formentur Trochisci.

M 2

Tro-

Trochisci de Charabe, D. Mesua.

℞. Charabis aureos ʒj.
 Cornu cerui vsti
 Gummi Arabici assati
 Corallii rubri vsti Tragacanthæ
 Acaciæ Hypocistidis
 Balaustiorum florum
 Mastiches Laccæ
 Papaueris nigri assati ana aureos ij.
 Turis Croci
 Opii ana aureum j. β.
 Mucilaginis Psyllii quantum sufficit.
 Formentur Trochisci.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

TROCHISCI de Charabe, siue ex
 Succino, inuenti sunt ad restinguendum
 sanguinem vndecumque fluentem, men-
 strua, sputum, fluxum sanguineum, &
 hæmorrhoidalem: & consolidant vlcera
 pectoris & pulmonis.

Trochisci de Myrrha, D. Rhasis.

℞. Myrrhæ ʒ iij.
 Lupinorum ʒ v.
 Foliorum Rutæ Menthastræ
 Pulegii ceruini Cymini
 Rubiæ tinctorum Assæ foetidæ
 Sagapeni Opopanacis ana ʒ ij.
 Succo

Succi Artemisiæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

MENTHASTRUM est silvestris Men-
tha, pilosis & hirsutis foliis.

PVLEGIVM Cerninum, idest, Dicta-
mnus Creticus.

PROVOCANT menstrua; & sedant
passiones, quæ ex retentione menstruorum
proueniunt.

Trochisci de Alkekengi, D. Mesua.

R. Fructuum Alkekengi ʒ iij.

Seminis Citrulli Seminis Albatechæ

Seminis Cucurbitæ ana ʒ iij. β.

Boli Armeniaci

Gummi Arabici

Turis.

Sanguinis Draconis Papaueris albi

Amygdalorum amarorum

Succi Glycyrrhiæ

Tragacanthæ Amyli

Pinearum ana ʒ vj.

Seminis Apii Charabis

Boli [aut eius loco Terra sigillata]

Hyoscyami Opii ana ʒ ij.

Succi Alkekengi quantum satis fuerit ad
formandum Trochiscos.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

ALBATECHA, siue Batega, est Melon
magnus Indus, viridis & subniger.

TROCHISCI Alkekengi seu Halica-
M 3. cabi

tabi valent ad renum & vesicæ vlcera, &
natam inde dysuriam.

Trochisci de Rosis, D. Rhafis.

- * R. Rosarum 3 iiij.
- * Ligni Aloës
- * Spicæ Nardi Indicæ Mastiches
- Cassia lignea [*aut succedanei eius*]
- Florum Squinanthi Cinnamomi
- Abinthii ana 3 j.
- Vini veteris quantum ad formandum Tro-
- chiscos satis fuerit.

SUNT efficaces ad multos affectus, præ-
sertim ad ventriculi dolorem, malam co-
ctionem, febres antiquas, hydropem in-
cipientem, & illos maximè quibus for-
ma corrumpitur.

Trochisci de Camphora, Mesua.

- R. Rosarum 3 iiij.
- Spodii Glycyrrhizæ ana 3 ij.
- Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli
- Seminis Cucumeris
- Seminis Melonis
- Tragacanthæ Croci
- Gummi Arabici
- Spicæ Nardi Indicæ ana 3 j.
- Santali citrini 3 ij. β.
- Ligni Aloës Cardamomi Amyli
- Cam-

Camphoræ ana ʒ ij.

Sacchari Tabarzeth

Armeniabin [*id est, Manna*] ana ʒ iiij.

Mucilaginis Psyllii cum Aqua Rosacea factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

TROCHISCI Camphoræ conferunt ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim inexplenam: icterum quoque ac phthisim & hecticam curant.

Trochisci de terra sigillata,

D. Mesuæ.

℞. Sanguinis Draconis

Gummi Arabici assati

Trochiscorum Ramich

Rosarum rubrarum Seminis Rosarum

Amyli assati Spodii Acaciæ

Lapidis Hæmatitidis Hypocistidis

Florum Balaustiorum Boli Armeniaci

Terræ sigillatæ [*vel Boli Armeni*]

Corallii rubri Charabis ana ʒ ij.

Margaritarum Tragacanthæ

Papaueris nigri ana ʒ j. β.

Seminis Portulacæ assati

Cornu ceruini vsti Turis

Gallarum Cypressi

Croci ana ʒ ij.

M 4

Aquæ

Aquæ Arnoglossæ quantum sufficit.

* Formentur Trochisci.

Et quandoque adduntur Opii ʒ ij.

SPODII.] *Pro Spodio sumæ Ebur combustum preparatum.*

SEMEN Rosarum hîc significat Antheram, id est, luteos apices, qui sunt in Rosis: hi exsiccati rubescunt.

GALLÆ Cypressi, etiam vocantur Nuces Cypressi.

P. C. SCHOL.

Mesues exemplaria Gallas absolute scriptas habent.

SUNT admodum efficaces ad sputum sanguinis, cum aqua Plantaginis poti; ad fluorem verò sanguinis è naribus, fronti illiti; ad menses immodicos, utero injecti vel pubi illiti; ad mictum sanguinis, in vesicam injecti, & ad alias hæmorrhagias, parti sanguine fluenti impositi.

Trochisci de Spodio, Mesue.

R. Rosarum rubearum ʒ xij.

Spodii ʒ x. Seminis acetosæ ʒ vj.

* Seminis Portulacæ

Coriandri præparati & tosti

Pulpæ Sumach ana ʒ ij. β.

* Amyli assi Florum Balaustiorum

Baccarum Berberis ana ʒ ij.

Gummi Arabici assati ʒ j.

Agre-

Agrestæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

VALENT ad febres biliosas cum alui-
luore: inflammationem ventriculi & he-
patis, & sitim continuam sedant.

Trochisci de Absinthio, D. Mesue.

℞. Rosarum Absinthii

ana ʒ ij.

Claued [*id est, Rhabarbari*]

Ucci Eupatorii [*id est, Gratiola*]

Sari Seminis Apii

amygdalorum amarorum

Spicæ Nardi Indicæ Mastiches

oli ana ʒ j.

Ucci Endiuia quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

Pro Folio accipe radices Spica Romana, aut
radicum Spica Romana & Macis ana partes
quales.

OBSTRUCTIONES ventriculi & he-
patis, & ab his dolorem, & febres anti-
uas tollunt: oictas partes reliquasque
nutritorias roborant; ac appetentiam ex-
citant.

Trochisci Alhandal, D. Mesue.

℞. Pulpæ Colocynthidis ʒ x.

A.

Incidantur minutissimè, & fricentur

cum Olei Rosacei ʒ j.

M ʒ

Deinde

Deinde sume Tragacanthæ
Gummi Arabici Bdellii ana ʒ vj.

Macerentur hæc in Aqua Rosacea, donec liquefiant & dissoluantur: deinde cum parte resolutarum lachrymarum formantur ex prædicta Colocynthide Trochisci: qui siccentur, & cum fuerint siccati, contundantur minutissimè; & rursus formantur Trochisci cum reliquo diluto lachrymarum, atque reponantur.

Trochisci Colocynthidos in Hieram Hermetis, & Compositiones alias iniiciendi loco Colocynthidos: suntq; salubriores quàm ipsa Colocynthidis.

P. C. SCHOL.

§ x.] Cordum hîc falli Bernardus Desse-
nius in suis illis verbosis Commentariis, mi-
serè exclamat, eò quòd § x. pro ʒ x. ut ipse
inquit, hîc posuerit: cum ipsemet hac in re
(ut & plerisque aliis locis) iudicio vacuus, toto
erret cælo. Verùm in alio Dispensariolo Sena-
tus sui iussu emisso, dextrè respicit, à suis
collegis forsân monitus. Proinde quid Fuschius,
artis nostræ (ut & plurimis aliis locis liquet)
nescius, in Pharmaceuticas rationes, hoc lo-
co suis annotationibus imaginando deliret,
nescio. Mihi breuitati studendum est.

Trochisci Beckii albi.

Rx. Sacchari albillimi ꝑ j.
Sacchari Candi optimi

Sac-

TROCHISCI.

275

acchari Penidii ana ℥ iiij.

cos ℥ j. 5 vij.

myli ℥ ij. β.

Mucilaginis Tragacanthæ albissimæ cum
Aqua Rosacea factæ quantum suf-
ficit.

Formentur Trochisci parui, & signen-
tur.

AUXILIANTUR tussiculosis, & dif-
falter spirantibus.

Trochisci Bechii nigri.

1. Succi Glycyrrhizæ ℥ iiij.

tyracis Calamitæ ℥ j. β.

acchari Candi ℥ ij. β.

pecierum Diaireos Salomonis

pecierum Lohoch sani ana ℥ β.

acchari Penidii ℥ β.

acchari albissimi ℥ ij. ℥ iiij.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua Hys-
sopi factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & signentur.

ABSCISSÆ vocis iacturam resar-
uiunt: & prosunt his qui patiuntur tussim
calidam & siccam: leniunt pectus, & fa-
cilitant sputum.

M 6

TRO-

TROCHISCORVM DVÆ

SEQUENTES VALERII CORDI

*descriptiones nuper his ultimis
editionibus accesserunt.**Trochisci de Lacca Val. Cordi.*

℞. Laccæ electæ ℥ iiij.

Ligni Guaiaci scobina in minimam scobem seu rasuram detriti ℥ j.

Coquatur lignum Guaiacum in ℥ iiij aquæ celestis ad consumptionem ferè dimidiæ partis : In colatura deinde coquito rad. Rubiæ tinctorum ℥ iiij. donec remaneat ℥ j β. Dein iterum colato, & colaturæ iniice prædictas ℥ iiij Laccæ ; & ad ignem coquito, donec Lacca dissolvatur. Postea colato & exprimito, & abiice superfluitates Laccæ. Colaturam dein ad spissitudinem aliquam coquito ; & insperge sequentes pulveres :

℞. Aristolochiæ longæ

Radiciſ concauæ

Rhabarbari Costi veri ana ℥ ij.

Zedoariæ Galangæ Asari radicem

Curcumæ Cinnamomi Ligni Aloës

Nucis moschatæ Schœnanthi ana ℥ j.

Samphoræ ℥ j.

Misceantur omnia optimè, & formen-
tur Trochisci drachmæ vnius pondere.

℞. a.

RADIX *concaua*, *Holuvuriz*, qua falso
appellatur *Aristolochia rotunda*.

Hos Trochiseos composui aliquibus
obstructione splenis hepatisque laboran-
tibus; & præsentis auxilio id malum cura-
uerunt.

Trochisci de Succino, Valerii Cordi.

℞. Ambræ excellentissimæ
Succini albissimi ana ʒ j.
Succini Phalerni
Succini cerei ana ʒ iiij.
Succini nigri Camphoræ
Margaritarum non perforatarum
Margaritarum perforatarum ana ʒ ij.
Onychis Dentaliorum
Entaliorum Umbilici marini
Lapidum cancrorum
Synodontum Ligni Aloës
Cinnamomi
chœnanthi Nucis moschatæ
Cubebæ
Cardamomi Croci
Cyperii rotundi
Zedoariæ Doronici ana ʒ j.

Conterantur omnia minutissime, &
conficiantur Trochisci cum mucilagine
Tragacanthæ albissimæ in aqua Maiorane
dissoluta.

AMBRA est Succinum Orientale.

M. 7

S. v. c.

SUCCINUM est quod Arabibus vocatur Carabe, Germanis Agstein sine Bernstein: Sudanis, Gensor: Gallis, Ambra. Est enim Succinum nihil aliud quam Ambra Germanica.

Phalernum, id est, flavum & clarissimum, & omnino pellucidum.

Cereum, id est, quod cera colorem habet, non adeo pellucidum est.

Nigrum Succinum alio nomine vocatur Gaggates lapis, Germanicè Suvarizer Agstein, oder Suvarizer Bernstein.

Inter emendum album Succinum, vitare oportet scobem & ramenta: nam hæc solent pro albo Carabe vendi. Cum enim Cereum aut Phalernum Succinum tornatur, candida ramenta remittit. Ideoq; integras glebas candidi Succini emere oportet. Est enim valde pretiosum.

Onychis, id est, Blatta Byzantie.

Vmbilici marini, Germanicè Meerbonen.

Lapidum Cancrorum, id est, quos vocant Oculos cancerorum.

Synodontes lapides sunt in capite Synodontis piscis inuenti: qui si haberi non possunt, quoniam piscis marinus est, pro iis occipiantur lapilli qui bini inveniuntur in capitibus piscium fluuiatilium, quos Raulperszken Germanicè vocant.

Hæ Trochisci faciunt ad calculum, ad tumentem ventriculum, vertiginem, epilepsiam, apoplexiam, tremorem & imbecillitatem.

illitatem cordis, ad paralyſim, ſi dentur
in aquis appropriatis, cum Betonicæ flo-
ribus, aut Lauendulæ, aut Tiliæ: & ad
ſuffocationes & ſtrangulationes vteri va-
lent.

OLEA.

Oleum ex ligno Iuniperi.

Fictile vas in foueam ponatur: ſupra id
aliud fictile anguſti orificii inuerſum po-
natur, recentibus Iuniperi lignis minu-
timque inciſis plenum: cui ſubducatur la-
mina ferrea foraminibus peruia, vt deſtil-
let liquor, & ne ligni ſegmenta delaban-
tur. Bene autem aptentur, & luto ſapien-
tiæ circumlinantur fictilium orificia, ne
quidquam exſpiret. Poſteà inferius fictile
uſque ad collum ſuperioris obruito terra,
& facto pauimento ignem circa & ſupra
fictile ſuperius accendito; atque ardere
ſinito aliquot horas. Poſtremò liquorem
qui deſtillauit, aufero. Cuius uſus eſt
purgandis ſordidis vlceribus.

EMENDAT cutis infectiones, ſerpi-
ginem, cancrum, vlcera maligna, qualia
quæ in tibiis & cruribus quorundam,
malum mortuum recentiores vocant.

Oleum

Oleum ex Iuniperi baccis.

Oleum è Iuniperi baccis elicitur per artem distillandi, ut Vinum sublimatum. Quia verò minoris emitur quàm ut ab aliquo Pharmacopola preparari queat, confectionem eius non indicabimus.

*Oleum Nardinum simplex,
D. Mesue.*

*R. Spicæ Nardi aromaticæ ℥ iij.
Vini Aque ana ℥ ij. β.
Olei Sesamini ℥ j. β.*

Coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua in vaporem resoluantur: coletur deinde Oleum; & colatum reponatur, abiecta Nardi Spica.

Vas duplex, Græcè vocatur DIPLOMA: constat duobus crateribus, altero alteri imposito, ita ut in unum aromata & oleum coniiciantur; in alterum verò aqua fundatur, que subiectis prunis calefacta suo tepore unguenta & olea decoquit. Est autem hoc notandum in omnibus aromaticis oleis qua decoquuntur.

CALEFACIT, tenuat, digerit, modicè adstringit: proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, vteri magno-

ignoperè iuuat: naribus iniectum, caput
ergat, corporis colorem & odorem com-
mendat.

*Oleum Nardinum compositum,
D. Mesua.*

Spicę Indicę ℥ iij.
Sampsuchi [*id est, Maiorana*] ℥ ij.
Sylualoës Enulę Folii Indi
alami aromatici [*eius loco sumatur Galāga*]
oliolum Lauri
yperici Schœnanthi

Cardumeni ana ℥ j. β. *

Contundantur omnia grosso modo:
deinde affunde illis

quę fontanę
Vini ana quantũ sufficit, i. circiter ℥ xiiij. *

Olei Sesamini ℥ vj.

Macerentur per noctem: deinde coquan-
tur in Diplomate, id est, duplici vase, se-
cundum artem.

PRO Folio Indo, recipe Spica Romana
adicum, Macis ana ℥ vj. [*non ℥ vj.*]

Oleum Costinum, D. Mesua.

Costi amari [*optimi & veri*] ℥ ij. *

Cassię [*aut saccidanei eius*] ℥ j.

Summitatum Sampsuchi ℥ ij. *

Vini quantum sufficit

Olei

* Olei Sefamini ℞ ij.

Macerentur duabus noctibus, deinde coquantur in duplici vase secundum artem.

CASIA, *Aromatica vera*, & *Cinnamomo similis accipi debet.*

CALEFACIT, obstructa aperit, nervosum genus roborat, ut nervos, musculos, tendones, ligamenta, ventriculum: præter hæc, hepar & capillos. Canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat.

Oleum de Piperibus, D. Mesua.

℞. Macropiperis [*id est, longi*]

Melanopiperis [*id est, nigri*]

A Leucopiperis [*id est, albi*] ana ʒ iiij.

Myrobal. Chebulorum

Myrob. Bellericorū Myrob. Emblicorum

Myrobal. Indorum ana ʒ v.

Radicum Apii

Radicum Fœniculi ana ʒ iiij. β.

Sagapeni Opopanacis

B Ammoniacy ana ʒ ij. β.

C Turbith albi ʒ ij. Zingiberis ʒ iiij.

Caulis foliorum recentium

Thymi viridis Rutę viridis ana m. j.

Coquantur secundum artem in aquę quantitate sufficienti ad tertias. Colaturę adde olei de Cherua ℞ ij. & iterum coque ad consumptionem aquę.

P. C.

P. C. SCHOL.

Ana 3 iij.] *Cordus malè* 3 iij. *hic ha-* A
nat.

Ammoniacy.] *Hyoscyami fœdè in Cordo* B
ebatur.

3 iij.] 3 xij. *vitiosè Cordus scripserat, ut C*
c omnia vitè à Fuchſio quoquæ dicuntur:
namquam à Monachis hausta eſſe non dubi-
m.

I v v A T morbos neruorum frigidos, vt
 paralyſin, ſpaſmum, ſpaſmum cynicum,
 tremorem, epilepſiam: adhæc iſchiadem,
 cæteras arthritidis differentias, & vteri,
 vli, renum, veſicæ affectus frigidos, quia
 ſolefacit, tenuat, terget: ob id obſtru-
 ctiones aperit, calculum frangit.

Oleum Mandragora, D. Nicolai.

2. Olei P v.

Succi malorum Mandragoræ 3 viij.

Succi capitum Papaueris hortenſis 3 vj.

Succi Hyoſcyami albi 3 iiij.

Succi Violarum

Succi Cicutæ tenerrimæ ana 3 ij.

Opii Styraçis ana 3 j.

Confice ſic: miſce ſimul omnes ſuccos
 oleo; atque in vitreo vaſe, obſtructo ori-
 ſcio, Soli exponito per decem dies. Vnde-
 cimo die coquantur in duplici vaſe vſque
 ad con-

ad consumptionem succorum : deinde ubi refrigerari cœperit, cola : & colato oleo adde Styracem & Opium ; & confice secundum artem.

STYRAX quidem sincerus & purus facile in oleo dissolvitur :

OPIVM verò sincerum in oleo dissolui non potest. Igitur tenuissimè tritum inspergatur oleo, & sæpè misceatur : nam nisi in aqua aut vino dissolvatur, non commiscebitur oleo.

Non habentur apud nos *Mandragora* pomma : ergo loco succi *Mandragora* pomorum accipe infra scriptam decoctionem :

R. radicum *Mandragora*, id est, Corticum radicum eius l j. Contundantur, & coquantur in aqua sufficiente ; & colatum decoctum succis adde.

Ad nimios dolores capitis valet, & phreneticis malè dormientibus, fronti illitum, & naribus iniectum, vehementer opitulatur : pulsibus brachiorum & plantis pedū illitum, quocumque modo vigiliis fatigatū celerrimè obdormiscere facit.

Oleum Mastichinum, D. Mesue.

R. Olei Rosacei ℥ xij.
Vini odoriferi ℥ iiij.
Mastiches electæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem usque ad consumptionem vini.

CERE.

CEREBRVM, nervos, iuncturas, ventriculum, hepar corroborat: tumores duros lenit, dolores sedat.

Oleum de Euphorbio D. Mesua.

℞ Euphorbii ℥ β.
 Olei Cheyrini ℥ v.
 Vini odoriferi tantundem. Coque secundum artem usque ad consumptionem vini.
 Iuvat maximè frigidus cerebri & nervorum affectus, cephalalgiam, hemiplegiam, lethargum, naribus immixtum. Articulorum quoque & hepatis, & splenis dolores, illitum lenit.

*Oleum Castorei, D. Iacobi
 de Manliis.*

℞ Castorei Styracis calamitæ
 Galbani Euphorbii
 Casia lignæ veræ Crocī
 Opopanacis
 Carpobalsami [aut succedanei eius]
 Spicæ Nardi Indicæ ★
 Costi ana ℥ iij.
 Cyperi Schœnanthi Macropiperis
 Melanopiperis Sabinæ
 Pyrethri ana ℥ ij. β.
 Olei P iij.
 Vini odoriferi P ij.

Cor-

Confice sic : Galbanum & Opopanacem in vino seorsim dissolue : deinde reliqua omnia contusa cum oleo & vino coquito ad consumptionem vini in duplici vase. Postea cola, & dissolutum & expressum Galbanum cum Opopanace oleo adfunde : & iterum coque ad consumptionem vini : & repone, sæpius miscens in posterum, ut Galbanum & Opopanax in vasis fundo subsidentes, oleo commisceantur.

Est optimum contra omnes aggritudines frigidas, præsertim nervorum & iuncturarum : medetur paralyfi, spasmo, tetano ; & sedat acerrimos rigores, & frigora febrium, si spina dorsi linatur.

*Oleum Scorpionum simplex,
D. Mesua.*

- * R. Scorpiones numero xx. vel xxx. secundum eorum magnitudines.

Olei Amygdalorum amarorum P ij.

- * Macerentur in vase vitreo stricti orificii per dies xxx caniculares ad solem, vel pluribus diebus : postea colatum ad usus reponere.

LAPIDEM renum & vesicæ frangit & expellit, lumbis, pubi, peritonæo illitum, aut per meatum urinarium injectum.

Oleum

*Oleum Scorpionum compositum,
D. Mesue.*

℞. Aristolochiæ rotundæ

Gentianæ Cyperi

Porticorum radicum Capparis ana ℥ j.

Olei Amygdalorum amarorum ℞ j. β.

Macerentur in oleo contusæ radices ad solem feruidum diebus viginti : deinde decoquantur aliquantulum in duplici vase, ciniectis ad vltimum Scorpionibus num. xv. postea iterum serenis diebus xxx ad solem macerentur. Postremo excolatum oleum reponatur.

ARISTOLOCHIA rotunda non est *Holvvurtz*, sed radix lutei coloris, odore & sapore Aristolochia longa. Affertur ex Italia.

VALET contra venena, & pestilentiam.

Oleum Formicarum, Nicolai.

℞. Formicarum alatarum quantum vis
Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem diebus xl. postea excolatum oleum reponere.

VALET ad confortandum coitum, unguendo partes destinatas generationi.

Oleum

Oleum Lumbricorum terrestrium.

℞. Vermium terræ P . β.

Olei oliuarum P ij. Vini ℥ ij.

Bulliant omnia simul, & fiat oleum: deinde percoletur & reseruetur.

N E R V O S in frigidatos confortat; & vtile est doloribus iuncturarum.

Oleum Vulpinum, D. Mesua.

℞. Vulpem, detracta pelle, & abiectis interaneis: incidatur in partes, & coquatur in Aquæ fontanæ &

Aquæ marinæ ana P iij. ℥ iiij.

Olei veteris clari P iij. ℥ ix.

Salis ℥ iiij. Intercoquendum adiace

Anethi Thymi ana P j.

Coquantur autem quousque ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur: deinde coletur oleum, & excolatum ad vsus suos reseruetur.

Qui prope mare non habitant, sumant aquam salſam, id est, Muriam; siue aquam fontium salſorum, ubi salina fuerint. Porrò ad coquendam Vulpem non sufficit aquarum præscriptarum quantitas: idè accipe quantum abunde satis fuerit, & fortiter ultimò oleum exprime.

A D podagras, reliquâsque arthritidis spe.

ecies, ac dorsi, renumque dolorem est
ficacissimum.

Oleum de Cappare.

Corticis radicis Capparis ʒ j.

Corticis Tamarisci

oliorum Tamarisci

seminis Agni casti

colopendriæ [id est, *Asplenii*]

yperici ana ʒ ij.

luta ʒ j. Aceti

ini optimi ana ʒ ij. *

Olei maturi ℥ j.

Coquantur in duplici vase usque ad con-
sumptionem vini & aceti.

VALET duritiei, oppilationi, & dolo-
ri splenis, ac omni eius agitudine.

Oleum de Lateribus, D. Mesue.

2. Laterem aut regulam rufam antiquis-
simam, ex rufo luto ductam: eam con-
fringe in frusta mediocria, & in prunis
vrito, donec tota excanduerint: deinde
è prunis exempta fragmēta restinguito
in oleo claro veteri, & dimittito quous-
que se oleo impleuerint: postea oleo
exempta in tenuissimum pulverem con-
tundito, atque in Retortam aut Cucur-
bitam vitream indito, & secundum
N artem

artem luto chymistico iuncturas vitre-
rum claudito, & subtus accensis pruni
oleum elcito; & elicited reponito.

CONVENIT omnibus morbis frigi-
dis. Est enim calidum, penetrativum, re-
solutivum: mollit dura, & discutit tum-
da. Opitulatur his qui patiuntur epilep-
siam, vertiginem, obliuionem, paralyse-
spasmus, dolorem dorsi & genuum, pe-
dagram, vel alios iuncturarum & neruo-
rum morbos: medetur spleni, vesicæ &
renibus.

Oleum Terebinthinae.

℞. Resinæ Terebinthinæ aut Lariceæ
quam in Germania Terebinthinam voca-
mus, ꝑ iiij.

Eam pone in capace Retortam, si-
Cucurbitam vitream, & per artem desti-
latoriæ elice eius oleum, ita vt Cucu-
bita aut Retorta arenæ imponatur. Prim-
autem cum aqua exhibit oleum tenue & cla-
rum, secundò aurei coloris, ultimò fi-
scum & crassum. Horum vnumquodque
per se auferro, & reponito.

CONFERT omnibus ægitudinibus
frigidis, & maximè nervorum.

*Oleum Tartari, seu Vini Facum
exsiccatarum.*

℞. Tartari puri ꝑ iiij.

Pon

Pone in ollam, & vre in fornace cum
terribus aut regulis aut fictilibus, vel
per se, donec omninò excandescat Tarta-
rum. Postea impone in sacculum lanco-
anno factum, & suspende in cellario:
nam destillabit ex eo clarus quidam li-
quor; quem repone. Porro reverà hic hu-
mor non est oleum, sed acerrima aqua.
VALET ad faciem tergendam, &
rurugandam.

Oleum Cydoniorum, D. Mesue.

℞. Cydoniorum non excorticorum
succum Cydoniorum ana quantum sufficit.
Incidito Cydonia; & impone in vas vi-
treum, & affunde succum. Affunde etiam
oleum omphacinum, hoc est, immatu-
rum, ut excedat eius quantitas succi men-
suram. Postea stringe vasis orificium, &
ad Solem omnia macera, aut in astuario
diebus quindecim: deinde coque in dupli-
ci vase, & abiice posthac Cydonia, & adde
recentia: & rursus macera & coque: in-
de etiam tertio recentia Cydonia im-
pone; & prædicto modo omnia perage.
Tum repone diligenter obstructum, ne
exspiret.

*Hodie tanta diligentia non fit hoc oleum:
igitur rogo ut maiorem diligentiam impen-
dant.*

Est optimum contra debilitatem stomachi, vomitum & fluxum: sistit sudorem: restaurat resolutionem, lapsas vires: corroborat nervos & vires: confortat digestiuam.

Oleum Sampsuchinum.

℞. Foliorum Sampsuchi m. iiij.

Serpylli m. ij.

Foliorum Myrti m. j.

Abrotoni Sisymbrii ana m. β.

Cassiae lignae verae ℥ ij.

Olei omphacini quantum sufficit.

Concidito & contundito omnia, & vitreo vasi impone; ac infunde oleum, ut supra species emineat. Tum obstructo vasis orificio macera ad solem vel in aestuario diebus octo. Postea exprime, & expressum oleum infunde recentibus speciebus: & hoc etiam tertio facito.

Folia vera Myrti accipi debent, quae ex Italia & Narbonensi Gallia afferuntur.

SISYMBRIUM, id est, Mentha aquatica. Est & aliud Sisymbrium in montibus nascens, multo odoratius: quod melius esset, si ubique haberi posset.

OMPHACINUM, id est, ex immaturis oliuis expressum.

LASSITUDINI utile est; & morbis cerebri & nervorum prodest: ob id in balneo

balneo inunctum, paralyſim iuuat, & ſpaſ-
mum cynicum, vulgò torturam oris, na-
ribus iniectum: & auribus immiſſum, à
ſtutinnitum diſſipat: menſes ciet: ac
morſui ſcorpionis prodeſt.

Oleum Vitellorum ouorum.

R̄. Oua recentia numero centum; coquito
donec penitus indurentur. poſtea vi-
tellos eorum exime, & comminutos *
aſſa in ſartagine, mouendo donec ruſe-
ſcant, & pinguedinem quandam remit-
tant: deinde oſſam feruentem iniice in
ſacculum pilis contextum, & exprime:
quodque expreſſum fuerit oleum, re-
pone.

EXPERIENTIA plurima probatum
eſt, cutim expurgare: impetiginem, ſerpi-
ginem, & alia cutis vitia perſanare: ca-
pillos regnere: & vlcera maligna & fi-
ſtuuloſa curare.

Oleum Hyperici, Iacobi de Manliis. *

R̄. Summitatum Hyperici iamiam matu-
reſcentis ʒ iij.

Macerentur in vino odorifero diebus iij.
Bulliant deinde in vaſe duplici, obthura-
to orificio vaſis. Poſtea exprime; & re-
centis Hyperici par pondus iniice; & ite-

N; rum

rum macera, & coque, & exprime. Tum etiam terriò recens Hypericum adde: & si vinum minuitur, adde aliquid. Postea

* R. Terebinthinæ claræ ℥ iij.

Olei veteris clari ℥ vj. Croci ʒ j.

Coquantur in duplici vase vsque ad consumptionem vini: postea exprime, & a sedimento purgatum oleum repone.

CALIDUM est & ficcum, stypticum: ob id cōsolidat vulnera incisorum nervorum, & combustionem ignis: sedat dolores femoris & vesicæ: & prouocat urinam.

Oleum Irinura.

R. Olei ℥ vj. Vini ℥ j.

Lauetur oleum ter in aqua calida: deinde effusa aqua, adde vinum; & insperge Macis ℥ iij.

Cardamomi Zedoariæ ana ℥ ij.

Macerentur in loco aliquo calido, obstructo vasis orificio per dies octo: postea in duplici vase coquito, vsque ad consumptionem vini dimidii. Postea exprime oleum; & insperge ei puluerem subtilem

Iridis Illyricæ ℥ ij.

Macera, vt prius, diebus octo: deinde exprime oleum, & recentis Iridis confusæ par pondus iniicito: tunc rursus ad solem aut loco calido diebus viij macerato, &

, & rursum exprime. Postremò etiam
 tertio exprime, & aliam Iridem adde, &
 similiter omnia perage: deinde in dupli-
 cato vase oleum vnà cum vltimò insperfa Iri-
 dem aliquamdiu coquito. Ad vltimum dein-
 de exprime, & reponè oleum: cumque vi-
 deris albis subsidere ad fundum vasis Iridis
 conluerem, leuiter cola.

*Cùm ita permutatur crebrò Iris, oleo singu-
 vicibus aliquid decedit: ideo boni ponderis
 vj. olei accipiantur.*

ATTENUAT, resoluit, maturat, & di-
 scit malos humores phlegmaticos pe-
 toris & pulmonis: faciliat sputum &
 anhelitum: sedat tussim & frigidos dolo-
 res hepatis, splenis, & maximè matricis:
 resoluit dura apostemata, & mollit duri-
 ties: & confert spasmo, doloribus iun-
 cturarum, & fœtori narium.

*Oleum Iridum, D. Nicolai
 Alexandrini.*

A

℞. Olei sextarios x.
 Aquæ sextarios iiij.
 Radicum Iridis ℞ iiij. ℥ iiij.
 Crini domestici radicis ℥ xv.
 Cyperi viridis radicem ℥ vj.
 Helenii ℥ iiij. Anchusæ ℥ ij.
 Cinnami Assæ Spicæ ana ℥ j.
 Contundantur radices & alix species;
 N 4 & ma-

& macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad solem vel loco calido, obstructo vasis orificio: postea supra lentas prunas in duplici vase coquito, donec aqua consumpta fuerit; deinde refrigerari finito. Vltimò exprimito; & cùm aliquid subsederit, sensim excolato oleum.

Nicolai Alexandrini Latinum & impressum exemplar ita tradit huius olei confectionem.

SEXTARIUS Romanus, mensura est quæ habet olei uncias ponderales xvj. 3 v. 3 j.

CRINON domesticum, id est, Liliū odoratum album, quod in hortis plantatur.

Non ubiq³ habentur radices Cyperi virides: idèò aridas sume, & vino asperge tritas.

HELENII, id est, Enula Campanæ, videlicet radicem eius.

ANCHUSA, est Buglossa silvestris, rubra radice, quam aliqui hodie non rectè Alcantham vocant. Tinguuntur ea radice unguenta, & cera.

B CINNAMUM, idem est quod Cinnamonum.

C ASSÆ] Ego hîc non dulcem Assam, sed fœtidam ponerem: licet tamen utriusque 3 ß accipere.

P. C. SCHOL.

A Oleum Irinum Nicol. Alex.] Cùm Myrepsi descriptio ab hac Nicolai diuersa sit, reuerè Euchsîus hanc erroneam dicit.

Cin-

Cinnamum.] *Cinnamomum* imò legendum: B
aliquantulum nempe differunt, ut alibi dixi-
mus.

Alfæ.] Num buius loco *Casie*, cum *Fuchſio*, C
 legendum ſit, videndum Interea fallitur *Cor-*
dus, *Azam* hîc fœtidam intelligendam pu-

VSVRPATVR ad diuturnum catar-
 rhum, naribus illitum. Ozanas & putre-
 dines narium aufert: tinnitum aurium,
 cum aceto & ruta & amygdalis amaris
 commiſtum, & auribus iniectum, tollit:
 aſthmaticis, gargarismo adhibito, opi-
 tulatur: hæmorrhoidas veteres inunctum,
 ſue colo iniectum, educit.

Oleum Moſchelinum, D. Nicolai.

℞. Olei puri ꝑ viij.

Aquæ ꝑ iiij.

Folii [aut ſuccedanei eius]

Spicæ Nardi Indicæ

Coſti [odorati & veri]

Mastiſches ana ʒ iiij.

Styracis calamitæ Croci

Myrrhæ Troglodyticæ

Xylocinnamomi [in eius penuria corticis Cin- B
 namomi]

Casie lignæ veræ ana ʒ j. β.

Carpobalaſami [aut ſuccedanei eius]

Garyophyllorum Bdellii ana ʒ j.

N s Mo.

C Moschi ʒ vj.

Nuces Indicas num. iij.

Confice sic : Folium, aut eius succedaneum, Myrrham, Casiam, Carpobalsamum, & Bdellium tere, & per biduum in aqua & oleo macera : postea coque supra lentum ignem in duplici vase, vsque ad consumptionem aquæ : deinde reliqua omnia in tenuissimum puluerem redacta insperge, excolato & expresso oleo ; & iterum macera, & coque parumper : ultimo deinde Moschum admisce ; & repone, & pátete vt aromata subsidant. Ea interdum oleo commisce, agitato vase.

Ex Nicolao Alexandrino desumptum est hoc oleum : apud quem non puri, sed Punici olei legitur, id est, in Aphrica nati, quod omnium optimum & dulcissimum existit.

Pro Folio sume radicularum Spica Roxana, Macis ana ʒ j. ꝑ.

Pro Xylocinnamomo sume Cinnamomum electum.

D Nux Indica híc non significat grandem illam nucem qua ubique Indica nux vocatur, sed nucem Moschatam. Nam veteres Græci eam appellauit Caryon siue Carydion Indicon, id est, Nucem siue Nuculam Indicam: vocatur etiam Caryon Myrsicon, id est, Nux unguentaria siue odorata : & Moschocaryon, hoc est, Moschata nux. Quod diligenter in hoc oleo notandum est.

P. C.

P. C. SCHOL.

Aqua] *Fuchsius vinum aqua loco sumen. A*
lum satis aptè dicit.

Xylocinnamomi] *Nicolai Alexandrini B*
rexemplar Xylocinnamilegit.

Moschi 3 vj.] *Nimia certè quantitate: C*
quare forsàn 3 iij. legenda erunt, ut pro duo-
bus ij. inferiùs in unum contractis, u scriptores
olim cecutientes legerint.

Nux Indica.] *Nuces Indicas hodie passim D*
vocatas Fuchsius hoc loco intelligendas, non
Nuces Moschatas vulgò appellatas, contendit:
eo quòd hasce veteribus Grecis cognitatas non
fuisse constet. Verùm id ipsum & de Garryophyl-
lis ac Moscho, hanc compositionem quoque in-
redientibus, dici posset: quod non perpendit
Fuchsius. Posterioris etenim seculi composi-
tionem hanc esse, quod omnia hic commemorata
cognovit, est indubitatum.

Est optimum ad omnem frigiditatem
 corporis, potissimùm ventriculi, & ad
 dolorem lateris, foris inunctum. Stran-
 guriolis & colicis, & ad omne nervorum
 vitium illitum optimè facit. Miscetur
 epithematibus & emplastris quæ ad sto-
 machi & renum affectiones adsciscuntur.

Oleum Ruta.

R. Rutæ recentis incisæ & confusæ quan-
 tum

N 6

tum libuerit, pone in vase vitreo; & affunde olei veteris clarissimi sufficientem mensuram; & macera ad solem, aut in loco calido aliquo, diebus quindecim: deinde in duplici vase coquito, & abiecta Ruta recentem iniicito, & iterum quindecim diebus macerato: postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recentem Rutam iniice; macera quoque & cola.

Ita debet preparari oleum hoc & aliquot sequentia.

E S T calidum, apertiuum, resolutiuum, & mitigatiuum dolorum: calefacit renes, vesicam, matricem; & sedat dolores eorum, & maximè colicam, si venter vngatur, & fiat ex eo solo clyster: præterea opitulatur nervis, confert spasmis, & expellit frigidos humores.

Oleum Anethinum.

Oleum Anethinum fit ex floribus & foliis Anethi, & oleo veteri claro, eodem modo quo Rutaceum Oleum.

S E D A T dolores, aperit poros, & resoluit vapores & apostemata, tumores & durities: & mitigat dolores & rigores febrium: prouocat somnum & sudorem.

Oleum

Oleum Chamæmelinum.

Oleum Chamæmelinum siue Chamomillæ, vt vocant, fit ex floribus Chamæmeli, id est, Chamomillæ, & oleo veteri claro, vt Rutaceum oleum.

VALET ad plura: aperit poros, resolvit vapores, sistit fluentes humores, corrigi-
git malas qualitates, confert nervis & membris nervosis; & apprimè mitigat dolores.

Oleum Lilinum.

Oleum Lilinum, siue Liliorum, fit ex liliis albis odoratis recentibus, & oleo veteri claro, vt oleum Rutaceum.

SEDAT frigidos dolores pectoris, renum, vesicæ, matricis, & colicam: est nimis calidum, resolutivum: mitigat tussim, & efficaciter resolvit, & citius maturat apostemata.

Oleum Narcissinum.

Oleum Narcissinum fit primo Vere ex recentibus floribus albi Narcissi, qui vocatur Germanicè Mertzenblum, Weyssmornungsblû, weyßaprillenblum, Weyß Josephsstebe. Fit vt Rutaceum.

N 7

VA-

V A L E T ad emolliendas vuluæ duritias,
præclusionesque.

Oleum Ligustrinum, D. Mesue.

Oleum Ligustrinum, quod Græci vocant Cyprinum, Arabes autem oleum de Alcanna, fit ex floribus recentibus Ligustri, florente vite, aut paulo pòst, & oleo veteri clarissimo, ad modum Rutacei olei.

Ligustrum est arbuscula salicis ferè folio floribus parvis candidis, veluti spumosis & mucosis: Germanicè vocatur Reynweyden & Muntholz. Nasceitur copiosè ad Rhenum, & in Misnia, Hessia, Sueuia, Wittenbergenfi agro, Thuringia, & circa Nurembergam, non longè à Kalckreut.

P A R T E S nervosas roborat, & capillos à canitie vindicat.

Oleum Sambucinum,

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci, & oleo veteri clarissimo, quemadmodum etiam oleum Rutaceum.

L E N I T, abstergit, & mundificat cutim: medetur icteritiæ, & maximè hepati infirmo, oppilato: & plurimùm confert doloribus iuncturarum.

Oleum Iasminum.

Oleum Iasminum, quod Arabes vocant Iasc.

Iasminum, & oleum de Zambach, fit ex
 floribus Iasminis, siue Iaseminis, siue
 Zambachi, & oleo veteri claro, vt oleum
 Rutaceum.

*Est Iasma flos similis Violis aut Cheyri, ad-
 odum odoratus: nascitur in frutice, qui mul-
 tis viticulis ascendit pergulas & concamera-
 tiones, vt vitis. Colitur in Italia & Gallia.*

OPITVLATVR corporibus quæ ca-
 tarrhionem laxationemque desiderant.

Oleum Cheyrinum.

Oleum Cheyrinum fit ex Leucoiis lu-
 teis, hoc est, ex Cheyris citrinis, & oleo
 veteri claro, vt Rutaceum oleum.

Cheyri Germanicè dicuntur Gelbe-Viole.

DOLORES neruorum aliarumque par-
 tium corporis mitigat, eaque quæ in tho-
 race, renibus & vesica sunt, discutit.

Oleum Myrtillorum.

Oleum Myrtillorum fit ex Myrtillis,
 hoc est, baccis veræ Myrti, & oleo om-
 niacino, hoc est, immaturo, eodem mo-
 do quo Rutaceum.

*Myrtus vera apud nos non nascitur: neque
 habemus semper virides Myrtillos, sed aridos:
 ut plurimum enim ex Hispania & Italia af-
 feruntur: idè necesse est vt vino odorato assper-
 antur.*

R I-

REFRIGERAT & adstringit: ideoq. cœliacis affectibus subuenit: sanat igne ambusta: pustulas erumpentes illitu emendat: attritus hyeme concitatos, & intertrigines illitum corrigit. Sedis rimas, condylomata, luxatos artus persanat, & sudores coërcet.

Oleum Myrtinum.

Oleum Myrtinum fit ex foliis veræ Myrti, & oleo Omphacino, id est, immaturo: quemadmodum oleum Myrtillorum.

Quoniam verò Myrti vera recentia folia apud nos haberi nequeunt, idè sume folia Myrti vera quæ ex Italia & Narbonensi Gallia & Candia afferuntur denuò, & asperge ea confusa vino veteri odorato, ut dictum est proxime in oleo Myrtillorum.

CEREBRUM, nervos, cor & ventriculum roborat.

Oleum Menthae.

Oleum Menthae fit ex Mentha crispa sativa, & oleo omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Myrtinum aut Rutaceum oleum.

VENTRICULUM refrigeratum & imbecillum calefacit: firmat nauseam, vomitum-

mentumque reprimat : appetentiam exci-
tat, coctionemque iuvat.

Oleum Absinthii.

Oleum Absinthii fit ex Absinthio Pon-
tico, & oleo omphacino claro, quemad-
modum oleum Rutaceum.

Absinthium Ponticum nos non habemus,
quod videlicet non adeò calidum est, sed sua-
rioris odoris, & valdè adstringens. Nostrium
verò Absinthium siue rusticum Absinthium
validius est; & nihil ferè adstringit, ut etiam
Galenus scribit: idèò corrigendum est cum
rosis, quæ dimidium eius pondus aquant.

CALEFACIT, ac roborat ea quæ
sunt refrigerata, potissimum verò ven-
triculum: excitat appetentiam, obstru-
ctiones aufert, lumbricosque enecat.

Oleum Rosaceum.

Oleum Rosaceum siue Rosarum, fit ex
Rosarum rubearum nondum penitus aper-
tarum decerptis foliis, & oleo Omphaci-
no, id est, immaturo, eodem modo quo
Rutaceum oleum.

REFRIGERAT & astringit: inflammatio-
nibus præsidio est, æstuantem ventricu-
lum restinguit; erosiones intestinorum
clysteribus inditum, & dolores dentium,
si eo colluantur, sanat.

Oleum

Oleum Violaceum.

Oleum Violaceum siue Violarum, fit ex floribus Violarum [Martiarum,] & oleo Omphacino, id est, immaturo, quemadmodum Rutaceum & Rosaceum.

REFRIGERAT, incandescentibus inflammationum feruoribus vtile est.

Oleum Nenupharis albi.

Hoc oleum fit ex recentibus floribus Nenupharis, quæ albos flores producit; & oleo Omphacino, quemadmodum Violaceum.

NYMPHÆATVM oleum vires habet Violati: refrigerat tamen magis quam Violatum, & minus quam Papauerinum: hypnoticis, & intemperaturam partium, vt renum, calidam sanantibus vtiliter miscetur; & Veneris tentiginem prohibet, genitali inunctum: somnum etiam conciliat.

Oleum Nenupharis Citrini.

Hoc oleum fit ex luteis, siue Citrinis Nymphææ, hoc est, Nenupharis floribus, & oleo Omphacino, vt Violaceum oleum.

Oleum

Oleum Populinum.

Populinum oleum fit primo Vere ex
 folliculis Populi arboris contusis, & oleo ve-
 ri claro, loto in aqua calida aliquoties,
 eodem modo quo Rutaceum aut Anethi-
 num oleum.

*Oleum Populinum, D. Nicolai
 Alexandrini.*

Olei ℥ lxxxvj. (faciunt P vij. ℥ ij.)
 vini ℥ iiij.

Gemmarum Populi arboris recentium,
 Veris initio collectarum P iiij.

Gemmae Populi diutissimè terantur, &
 macerentur in vino & oleo diebus septem,
 & quotidie sæpè agitentur. Octava deinde
 die supra lentas prunas in duplici vase
 coquito, vsque ad consumptionem vi-
 ni: deinde exprimatur oleum: & repo-
 natur.

Porro hoc oleum efficacius erit, si se-
 cundò & tertio recentes Populi gemmae
 addantur.

Gemma Populi, id est, oculi Populi.

EXPEDIT ad capitis dolorem, arthriticis,
 nephriticis, & podagricis, & ubicumque
 dolor fit.

Oleum

Oleum Amygdalorum dulcium.

R. Amygdala dulcia sicca, non tamen rancida: contendantur minutissimè: postea in sartagine aliquantulum torrefacias, affuso aquæ Rosaceæ modico: postea prælo exprime.

LENIT asperitates pectoris, gutturis & pulmonis, duritiem & siccitatem iuncturarum: est suaue in cibis; & confert hecticis & phthisicis: impinguat, auget sperma: sedat tussim & ardorem urinæ, vesicæ & vulvæ excoriatæ, cum fistula injectum.

Oleum Amygdalorum amarorum.

Fit hoc Oleum eodem modo quo ex dulcibus Amygdalis.

APERIT oppilationes, & discutit ventositates & vapores: sed potissimum medetur surditati, sibilo & dolori aurium: lenit duritiem neruorum, & delet maculas faciei.

Oleum Balaninum.

Oleum Balaninum fit ex Balano Myrepica, id est, Glande vnguentaria, quam Arabes vocant Granum Ben. Fit autem ex
tuso

so affatoque, affusa Rosacea aqua, fru-
ctu isto.

*Fructus hic ipse Auellana magnitudinem
bet, colorem candicantem, & figuram ut
urimum triangularem. Cortice tenui claudis
guem quendam nucleum, fungosa & alba
nica inuolutum. Affertur ex Syria & Ara-
a.*

OLEVM Balaninum repurgat macu-
as, varos, lentigines, cicatricum nigri-
as, fucos: aluum soluit; sed ventricu-
o aduersatur: dolores aurium emendat.
tem si sonant aures, vel strepitum, aut
bilum edunt, cum adipe infusum auxi-
iatur. *

Oleum de Cherua.

Oleum hoc fit ex pingui quodam semi-
ne, quod Arabes Cherua, Græci Crorona,
Latini Ricinum vocant. Fit autem eodem
modo quo oleum Amygdalorum.

*Planta que semen hoc producit, vocatur à
recentioribus Cataputia maior, ab Italis Pal-
ma Christi, & Mira solis; à Germanis Wun-
derbaum, Zeckensame, & Heydnisch Sprinc-
kerner.*

PRODEST pforis, vlceribus capitis
erumpentibus, sedis inflammationibus,
vuluis quæ occlusæ conuersæque strangu-
lant, cicatricibus fœdis, aurium dolori-
bus:

bus : potu aluum ciet , si quis aquis grauat-
tur : lumbricos eiicit.

Oleum Papaueris.

E semine vtriusque Papaueris tam albi
quàm nigri exprimitur oleum , eodem
modo quo ex Amygdalis, Balano Myre-
pica, & Cherua.

IMPINGVAT, asperam arteriam le-
nit ; febrium ardorem mitigat , & inso-
mnia.

Oleum Hyoscyami.

Hoc oleum exprimitur ex Hyoscyami
semine, eodem modo quo ex Papauere.

Oleum Spicae.

Oleum Spicae fit per destillationem, ex
maiori Lauendula, quæ Spica vocatur.

*Hoc oleum apud nos maioribus sumptibus fit,
quàm in Gallia Narbonensi: ideo potius emen-
dum est à mercatoribus, qui illud è Gallia af-
ferunt.*

CALEFACIT, ac discutit.

Oleum Laurinum.

Oleum Laurinum apud nos non facile
fieri potest: quoniam verò in magna co-
pia

olia affertur ex Italia & aliunde, ideò facile
emittitur à Materialistis.

CALIDUM est & apertivum : mitigat
colicam & frigidos dolores ventris, sto-
machi, capitis, hepatis, splenis, renum,
matricis, nervorum, iuncturarum : deni-
que omnibus ægitudinibus frigidis con-
fert.

Oleum Sesaminum.

OLEUM Sesaminum exprimitur è Se-
sami semine, eodem modo quo de sem.
Papaveris.

*Sesamum verum affertur ex Alexandria
Ægypti Venetias ; nunc ex Italia & Hispania:
unde ematur sincerum ; nam adulteratur oleo
Nucum & Papaveris ; sed odore & sapore faci-
le deprehenditur à peritis dolus.*

OLEUM Sesaminum impinguat, auget
sperma, lenit guttur & omnem asperita-
tem & duritiem : & clarificat vocem.

Petroleum Flavum.

PETROLEUM clarum, quoddam est
album, quoddam verò aurei coloris. De-
fluit autem ex petris in Italia & plerisque
aliis locis, unde ad nos affertur.

CALEFACIT, siccatur : essentiæ re-
nuitate in altum penetrat, digerit: proinde
mate-

materiam omnem excrementosam consumit: ob id epilepsiae, paralyfi, vertigini obliuioni, & lienis, renum, vesicae, ueteri, neruorum, articulorum omnium, & reliquarum partium neruosarum doloribus frigidis maiorem in modum confert.

Petroleum nigrum.

Petroleum nigrum, siue Naphtha nigra, crassius est quam flauum. Gignitur autem in agro Borchdorpiano & Brunsvicensi in Saxonia.

PETROLEVM, *id est*, Naphtha.

OPOBALSAMVM SVCCEDANEVM
PRETIOSVM EVRICII CORDI,
*qui Valerii pater fuit, huic libro ex
Valerii Cordi scriptis nuper
additum.*

R. Iridis Illyricae
Zarnabi longi [*id est*, Zedoaria]
Zarnabi rotundi [*id est*, Zurumbeth]
Cubebarum Cardamomi maioris
Cardamomi minoris Agallochi
Olei Benzoi ana 3 iiij.
Garyophyllorum
Nucis moschatae Macis
Arceuthidum [*id est*, gran. Iuniperi]
Cassiae Cinnamomi Santali citrini
Ben.

enzoi ana ʒ ij.

roci Afari

aioranę Schœnanthi

ardi Celticæ rad. Rosarum rubearum

yperii longi &

rotundi ana ʒ j.

amphoræ ʒ ij. Moschi ʒ j.

Hæc omnia trita macerentur in vino

henano ter sublimato, diebus octo. Po-

eà diligentissimè distillentur in balneo.

distillatæ deinde aquæ quæ primò exiue-

t, cape ʒ vj. in quibus dissolue optimæ,

mundidissimæ, electæque Myrrhæ ʒ ij.

et tenuissima & praestantissima pars Myr-

rhæ, aquæ vitæ miscetur: crassior verò

statar fecis subsidet, quæ nequaquam est

paranda aut excolanda: quoniam in fun-

do dimissa ipsam Opobalsamum aliquot

annis conseruabit incorruptum.

VNGVENTA.

*Vnguentum Agrippæ Regis,
D. Nicolai.*

Radicum Bryoniæ P ij.

Radicum Cucumeris asinini P j.

cillæ P β. Ireos ʒ iij.

Radicum Filicis Radicum Ebuli

Tribulorum aquaticorum ana ʒ ij.

O Ceræ

Ceræ albissimæ ℥ xv.

Olei albissimi ℥ iij.

Radices omnes istæ recentes incisæ
contusæ macerentur in oleo per dies octo
deinde coquantur, postea exprimantur
& in colato oleo & expressio resoluatur
cera, & fiat vnguentum secundum artem.

*Apud Nicolaum Alexandrinum inuenitur
idem vnguentum: sed impressi codices non ha-
bent radices Filicis & Ebuli, & Tribulos.*

Oportet omnes istas radices & tribulos
recentes. quod si necessitas urgeat, & non sit
ad manus recentes; tunc sume siccatas, & a-
funde vini optimi ℥ iij.

A TRIBULI aquatici siue marini, sunt
Wassernusse: & ipsi fructus accipi debent.

P. C. SCHOL.

A Tribuli aquatici.] Desfennius verò con-
trà, non fructus, sed radices hic intelligendas es-
putat.

HYDROPICTIS, omnibusque corpo-
ris œdematis succurrit. Nervi mal-
fanat, urinas mouet: extrinsecus illitum
ventrem subducit, dolorique renum utile

*Vnguentum Apostolorum,
D. Auicenna.*

℞. Terebinthinæ

Ceræ albæ

Resinæ

Ham.

ammoniaci ana ʒ xliij.
 stolochiæ longæ Turis masculi
 bellii ana ʒ vj.
 mirrhæ Galbani ana ʒ iiij.
 popanacis Floris æris ana ʒ ij.
 thargyrii ʒ ix.
 ei, si fuerit æstas l ij.
 hieme autem l iiij.
 et quantum satis est ad Hammonia-
 cum, Galbanum, & Opopanacum dis-
 soluenda.

Confice secundum artem.

FLOS Æris propriè significat grana que-
 m parua, que è partibus æris prosiliunt, cum
 frigerantur effusa aqua panes anei: hoc ta-
 m loco solet poni viride æris.

E s t efficax contra vulnera & vlcera
 officilia, & fistulas: consumit carnem
 corruptuam, & consumptam restaurat, du-
 um mollit: & plagas sanat.

Vnguentum Aregon, D. Nicolai.

Rosmarini Maioranæ
 radicis Iari Serpylli Rutæ
 ad. Cucumeris asinini ana ʒ iiij. β.
 oliorum Lauri Saluiæ
 abinæ ana ʒ iiij.
 ulicariæ maioris
 ulicariæ minoris ana ʒ iiij.
 adicum Bryoniæ ʒ iiij.
 O 2 Lau-

- * Laureolæ ℥ iiij. β.
- * Nepetæ ℥ iiij.
- * Mastiches
- * Olibani ana ℥ j. β.
- * Pyrethri
- * Euphorbii ana ℥ j.
- Zingiberis
- * Piperis ana ℥ iiij. β.
- Adipis vrsini
- * Olei Laurini ana ℥ iiij.
- Olei moschellini ℥ β.
- Petrolei clari ℥ j.
- Butyri ℥ iiij.
- Olei communis l' v.

Herbæ & radices Maio mense collectæ, in oleo macerentur diebus septem deinde coquantur; additis, circa coctura medium, siccis reliquis: tum colentur. Colato oleo adiiice reliqua, & Cera l' j. ℥ iiij.

OLEVM debet esse purum & vetus. Porri auctores non ponunt certam mensuram olei: quidam iubent accipi l' v. vel quantum sufficit. Sed tantum herbarum & radicum pondus & quantitas, non potest bullire in l' v. olei: ideo accipe olei l' medicinales sex, & affunde aqua etiam aliquot libras; & coque ad consumptionem aqua, & cola.

IARVS est vera Serpentaria: pro qua ponitur Aron recenter effossum.

PVLICARIA, id est, Conyza, Germanici

re vocatur *Duruvurtz*, & est similis *Enula*
campane in foliis, caulibus & floribus; sed
 multo minor. Nascitur humidis locis, & exic-
 cis aquis, circa stagna.

LAVREOLA, est planta similis *Thy-*
elae, id est, planta in qua nascitur *Coccum*
gnidium. Eius loco sume radices vel folia *Coc-*
Gnidiis.

OLEVM Moschellinum suo loco descri-
 um est.

P. C. SCHOL.

Et affande aqua.] *Cacutis Cordus* in aqua A
nguentum coquens, cum in vino coquendum
 se ratio dicitur.

Caterum cum unguentum istud in ponderi-
 us mirè corruptum undique legatur, nos idi-
 sum, quantum nunc licuit, restituimus.

PRODEST malis corporis frigidis,
 conuulsionibus, resolutionibus partium.
 Item dolori colico, renum, articulo-
 rumque.

Vnguentum Martiatum,
D. Nicolii.

A

g. Cerae albæ ℥ ij.

Olei ℥ viij. [aut quantum sufficit.]

Roris marini

Foliorum Lauri ana ℥ viij.

Rutæ ℥ viij. [al. ℥ iij.]

Tamarisci [foliorum scilicet] ℥ vj.

O 3

Maio-

Maioranæ Sabinæ
 Balsamitæ Saluæ
 Ocymi Polii [*videlicet veri*]
 Calaminthæ Artemisiæ Enulæ
 Betonicæ Brancæ vrsinæ Spargulæ
 Herbæ venti Pimpinellæ Agrimonii
 Absinthii Herbæ paralyfis
 Herbæ sanctæ Mariæ
 Cimarum Sambuci
 Herbæ Crassulæ Millefolii
 Semperuius Chamædryos Centaurea
 Centumneruiæ Fragulæ Tetrabit
 Quinquefolii ana ζ iiij. β .
 Radicum Hibisci [*id est, Althææ*]
 Cymini Myrthæ ana ζ iiij.
 Fœnugraci ζ j. β .
 Butyri ζ j. ζ ij.
 Vrticæ Violarum
 Papaueris nigri
 Menthæ Saracenicæ Menthæ crispæ
 Lapathioli Polytrichi Carduncelli
 Matris filuæ Maturellæ
 Herbæ moschatæ
 Alleluija Lingulæ ceruinæ Crispulæ
 Camphoratæ Styracis calamitæ
 Medullæ ceruinæ ana ζ β .
 Adipis vrsini Adipis gallinacci
 Mastiches Turis ana ζ j.
 Olei Nardini ζ ij.

Herbæ omnes in Maio mense colligan-
 tur, & incisæ macerentur in vino odorise-

10 per

per dies septem : octauo deinde die co-
antur , donec ferè consumatur vinum :
stea cola : & colaturę expressa adde
eum , & coque denuò donec consumatur
um : mox adde ceram & reliqua secun-
m artem.

In hoc unguento multa sunt herbarum no-
ina , qua apud probatos Auctores nusquam
ueniuntur : id:òq; aliquis non facillè ea in-
pretabitur.

NICOLAUS Prapostius loco Maiorana
ter Esbrium , alii autem habent utrumque.
d non constat quid sit Esbrium : alii enim
cunt Maioranam esse , alii Saluiam : sed
utrumque ingreditur hoc unguentum , tam
Maiorana quàm Salvia.

BALSAMITA , id est , Mentha aqua-
ca.

BRANCA vrsina vera , que Romana co-
nominatur , accipi debet , qua habet radices
longas , multas , glutinosas , sapore Tragacan-
the Et alio nomine vocatur Acanthus : que
verò Germanicè vocatur Berncluvv , & ha-
et Anehi umbellam , & semina odore &
apore cicnicum , nihil enim est quàm Branca
vrsina; nam semper illam Romanam Brancam
vrsinam intelligunt auctores omnes. Est autem
urbana & hortensis herba Branca vrsina
vera.

SPARGULA , id est , Gallion : Germa-
nicè vocatur Ranzien & Sprengelblum Her-
ba est

ba est denso, numerofo, cōferio & odorato flore.

C PIMPINELLA, quā Auctor intelli-
git, est Sanguisorba, quæ Germanicè Bluißdrof-
flein vocatur.

HERBA Paralysis, id est, Himelschuffel.

D HERBA Sanctæ Mariæ, secundum inter-
pretationem omnium, est Persicaria.

HERBA Crasula pinguis habet folia:
nascitur in muris & in cœtis: Germanicè vo-
catur Fettehenne, siue Donnerkaut.

CENTVMNERVIA. i. Plantago maior.

TETRAHIT, id est, herba Iudaica,
quam dicant esse Orobum.

LUMINARIS maioris auctor Ioannes
Iacobus Manlius, pro Cymino & Myrtha ha-
bet Cimarrum Myrti. Sed nescio quā bene:
non tamen improbo. Porro Nicolai Alexan-
drini impressum exemplar habet Cymini &
Myrtha: sed Nicolaus Præpositus pro Myrtha
habet Myrrham; sed malè.

LAPATHIOLVM, id est, Acetosa.

POLYTRICHON, herba est ex specie-
bus Capilli Veneris.

MENHA Saracenica, Germanicè voca-
tur Unser Fräuen Mintze. Herba habet folia
oblonga, Lapathio minora, & in summis cau-
libus aureos flores in corymbis dispositos, ferè ut
Tanacetum: tota odoratissima est.

GARDVNCELLVS, id est, herba Tur-
cha: quam nos in Germania vocamus Car-
dium benedictum.

MA-

MATRIS SILVA, id est Periclymenum: Germanicè vocatur Speklilien: ascendit arbor ut Vitis: flores habet longos, reflexos, & odorati Lili. Nuremberga in hortis colunt, cum alibi veniat spontè in silvis.

MATVRELLA, id est, Phu; id est, Vaticaiana maior. Impressi codices Nicolai Alexandri non habent Maturellam, sed Marathrum, id est, Fœniculum: sed malè.

ALLELVIA, id est, Trifolium acetosum: Germanicè Buchampfer vocatur.

CRISPULA quæ sit herba, non constat sententiaribus: alii enim Buphthalmum, alii herbam Cancris sic vocant, nec indicant figuram herbe Cancris: ego autem ponerem eius loco Buphthalmum, id est, Cotulam maiorem, in fœtidam.

HERBA MOSCHATA duas habet species: una habet veluti acus longas, & est Rorismarum Ciconia; altera est parva, & non habet acus, sed est herba admodum parva: folia habet similia Cōcaua radici, id est, Holuvuriz: odorem habet in Maio mense Musci. Nascitur in umbrosis locis iuxta Concauam radicem, id est Holuvuriz. In Maio tantum reperitur. Germanicè vocatur Bisemkraut.

CAMPHORATA est Abrotonum, quia odore accedit ad Camphoram: quidam dicunt se Abrotonum silvestre siue album; sed penitus inde est: efficacius tamen est vulgare Abrotonum.

Nicolaus Alexandrinus paulò aliter describit hoc unguentum, ut codices impressi ostendunt. ideoq; & eius modum subiungemus: nam variatur ponderum ordo & quantitas.

ADVERSUS frigida corporis mala, et solutionem coxendicum, nephritim, convulsionem, & id genus alia valet: tumores reprimat, durities emollit, liuoremque cutis emendat.

*Unguentum Martiatum magnum.
D. Nicolai Alexandrini.*

℞. Cerae albæ ℥ ix. Olei sextarios vi.
Pet. varò Coud. Cera ℥ xij. Olei sextar. lxxv.
 Rosmarini Foliorum Lauri ana ℥ ij. β
 * Amaraci ℥ ij.
 Esbrii Sabinæ
 Balsamitæ Ocymi
 Elelisphaci [*id est, Salvia*]
 Polii [*scilicet veri*]
 Calaminthes Artemisæ Enulæ
 Betonice Brancæ ursinæ
 Herbae venti
 Pimpinellæ Argemoniæ Absinthii
 Herbae paralytis
 Herbae Sanctæ Mariæ
 Cimarum Sambuci Herbae Crassulæ
 Semperuiæ Millefolii
 Chamædryos Centaureæ
 Centumneriæ Fragulæ
 Quia.

quinquefolii
 Erbæ Tetrahit ana ℞ j. β.
 Radicis Eulsci [seu Ibis] Cymini
 Myrthæ ana ℞ j. F
 Menugraci ℞ β. Butyri ℥ v.
 Tricæ Violarum
 paueris rubri
 menthe alterius [id est, Mētha crispæ sativa]
 pathioli Polytrichi Carduncelli
 atris filuæ Marathri
 Erbæ moschatæ
 lleluia Lingua ceruinæ Crispulæ
 amphorata Styracis
 ledullæ ceruinæ
 dipis ursini
 dipis gallinacei ana ℥ iii.
 Curis ℥ ij. Olei Nardini ℥ j.

Confice hoc modo : Herbas omnes at-
 que radices in fine Maii mensis, vel circa
 solstitium æstiuum collectas, minutim in-
 cisas in vini sufficienti quantitate mace-
 rato per dies septem : octaua deinde die
 decoquantur lento igne, donec propemo-
 dum vinum sit consumptum : postea cola
 & exprime, & affunde colaturæ expressæ
 olei prædictos sextarios, & iterum coque,
 donec omnis aqueus herbarum succus cum
 vino in vaporem resolutus fuerit : deinde
 adde Ceram in partes confractam ; & pau-
 lo post Adipes, Butyrum atque oleum
 Nardinum ; ad ultimum verò Styracem, *
 O s atque

atque Tus in minutissimum pulverem trita : melius tamen esset, optimam & electam Styracem, & puram instar resinae alicuius, unâ cum Cera indere : nam liquescit in oleo. Sed talis Styrax calamitâ rarissimè ad nos affertur. Porro miror in hoc vnguento, quòd tam parum olei tot herbarum libris addatur : præterea etiam optimæ vires aromaticarum herbarum in coctura evanescent.

Ita se habet vnguenti huius compositio, secundum impressum Nicolai Alexandrini exemplar.

SEXTARIUS mensura est Romana, quæ capit mensurales uncias viginti olei : pondera verò habet olei uncias sedecim, drachmas quinque, scrupulum unum. Sex autem sextarii olei, faciunt in hoc vnguento ℞ viij, ℥ iiij.

ESBRIUM quidam dicunt esse Maioranam, quidam flores Salvia : ego autem acciperem pro Esbrio Maiorana capitula, summitates & flores.

AMARACUM ego hîc non credo significare Matricariam, cum per eam vocem etiam Maioranam possimus intelligere : nam utraque Amaracus vocatur : si autem Maioranam inieceris, multò odoratius vnguentum fiet, quàm si Matricariam indideris.

HERBA vensi, id est, Parietaria vera.

PIMPINELLA, hîc non significat Germanicam Pimpinellam acris radice, quam Itali vocant

ocant Saxifragiam; sed eam quam Itali vo-
cant Sanguisorbam, Germani Blutsstöffleyn.
radicem habet rubram, Tormentilla sapore.
nascitur in pratis una eius species, altera in
montibus; & Itali acetariis miscent: habetq;
numeris odorem.

QVIDAM non habent Cyminum, sed Ci-
nas Myrtha: est autem Myrtha idem quod
Myrtus. Alii habent Myrrham, sed malè.

PRO Papauere rubeo habent alii Papauer
igrum: est autem rubrum Papauer idem quod
græste Papauer, in agris nascens.

MARATHRUM, id est, Fœniculum.
Errò ego hunc locum Nicolai Alexandrini
redo esse corruptum; & censeo pro Marathro
legendum esse Maturellam, id est, Phu maius,
cuius radices accipi debent.

Lingua ceruina est herba, quæ hodie impro-
riè Scolopendria nominatur.

P. C. in vtrumque vng. Martiatum Schol.

Vng. Martiatum.] Fuchsius rectè mo- A
et, non Martianum, sed Martiatum nomi-
andum esse.

Spargula, id est, Gallion.] Spargulam B
non Gallion, ut Cordus ait, sed Apparinen esse
veterum, Fuchsius ritè sentit.

Pimpinella.] Fuchsius per hanc vocem, C
non Sanguisorbam Germanis vocatam, cum
Cordo hic intelligendam esse vult; sed acrem
herbam, Saxifragam à multis appellatam, Ger-
manis Pimpinella nomine cognitam; idq; ea.

propter, quod adstrictoria sua facultate, his medicamento Sanguisorbam malè convenire existimet: quasi verò nihil unguentum hoc praetera recipiat quod adstringat atque etiam refrigeret. Itaque cum Italia multo prius (imò forsan in ea fabricatum) quàm Germania unguentum istud cognitum fuerit, Pimpinellam Italorum seu Sanguisorbam Germanorum hic intelligendam esse contendo.

D Herba Sanctæ Mariæ.] Hanc Persicariam esse, sinistrè Cordus interpretatur, ut & Fuchsius quoque inquit: sed eam esse quam Salviā Romanam, & Mentham Græcam, seu Costum hortensem, ac Lassulatam Etruscis vocari consuebat, Unser frau ven Mixt Germanis dictam, à Mentha Saracenica diuersam. Qua in re falli nihilominus Fuchsiū existimo, Mentham hanc Græcam cum Saracenica confundentem, eandemque facientem, cum diuersa sint: nō Germanis aliquibus ita eam appellare placuerit, Italis tamen scius; qui hac in re, ob eas quas superius dixi rationes, hic quoque consulendi atque credendi sunt.

E Mentha Sarac.] Hanc Mentham Saracenicam, vocatam quoque Mentham Romanam, in suis de Stirpiū libris, imagine & scripto depingit doctiss. Rembertus Dodonaus: qua hoc loco intelligenda erit; quicquid Fuchsius ex suo corruptissimo in medium preferat.

F Myrthē.] Fuchsius Myrrhæ legi mauult, nescio quam bene: cum unguentum Martiatum paruum

aruum Nicol. Alexandrini, Myrti folia manifestè recipiat. Cur autem Myrtum aliâq; astringentia admittat hoc vnguentum, hic dicere non vacat. Tantummodo miror id à tanto viro non esse olfactum, neque perpensum.

Ceterum hocce in vnguento, ut & multis aliis in medicamentis, plura longè aliter exponenda, miscenda, tractanda, atque conficienda sunt, quàm à Fuchſio & Francisco Alex. est institutum: ita ut huius Apollo non vsque adeò, veluti Thraſonice promittit, nebulosis suis radiis Pharmacopœos vibrat, neque irradiet; quin in densa, adhuc caligine aquè ut prius versentur atque decambulent. Quod tamen illic condonandum foret; eo quòd adolescentem se fateatur; nisi suæ illius ætatis iuuenilis iudicio vacua, & hinc temeraria rei Pharmacutices sibi inexpecta, ac (ut lovis mille liquet) ignoratæ scriptione, Apolline abusus, illiq; iniurius, tantum diuum plus a quo contaminaſſet. Sed hæc, quoniam vesperscit, citis se voles, quadrigis.

Ad frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & stomachi, ad scirrhus hepatis & splenis, ac ilii dolorem; ad paralyticos, arthriticos, ischiadicos, nephriticos, & podagricos, & ad omnes dolores; ad tumores, durities, spasmos, & febrientes, ad ignem vel solem inunctum.

Vnguentum

*Vnguentum Martiatum paruum,
D. Nicolai Alexandrini.*

R. Foliorum Lauri ℞ iiij.

Rutæ ℞ ij. β.

Amaraci [*id est, Maiorana*] ℞ ij.

Rosmarini ℞ j. β.

Foliorum Myrthæ ℞ j.

Esbrii [*accipe summities Maiorana pro Es-
brio*]

Balsamitæ

Ocymi ana ℥ vj.

Butyri ℥ v.

Styracis Medullæ ceruinæ

Adipis ursini

★ Adipis Gallinacei ana ℥ iiij.

Mastiches ℥ iiij. Turis ℥ ij. β.

★ Olei Nardini ℥ j.

★ Olei oliuæ q. s.

Ceræ mundissimæ quantum sufficit.

Ego Olei acciperem ℞ vj.

Ceræ verò ℞ iiij.

*Pet. verò Coud. olei ℞ xxiiij. sumendas esse
dicit.*

Porro hoc quoque vnguentum conficies
ut proximum.

MYRTHA, *id est, Myrtus. sunt autem
accipienda folia vera Myrti, qua ex Italia
afferuntur, & non eius planta quam voca-
mus Germanicè Heydelber.*

P. ●

P. C. SCHOL.

Petrus verò Coud. olei, &c.] Si omnia huiusce Dispensatorii loca manca erigenda, dubiosa expendenda, erronea collapsaq; resituen- da mihi essent, simulq; singulorum rationes scriptis reddere deberem, in densum volumen, præter institutum, libellus omnimodò extume- sceret. Hic attamen (priusquam sese negotium subducatur; ad calcem enim ferè perductus sum) pedem figere, aliquidq; ferri propalare, tempus & locus opportunus summopere urgere viden- tur: ut puta, si quid salis Francisco Alex. inesset, atque vel minimum haberet rerum me- dicamentariarum pharmaceuticarumve peri- tie, experientiaq; (ut omnibus numeris absolu- tum opus se promulgasse arroganter sibi persua- det) non ita leuiter oscitanterq; aliorum errores incogitantiasq; etiam evidentissimas transcri- beret, & alioquin pagellas multas tadiosa, atque inani dicacitate repleret, conspurcaretq;. Con- sulat ille, queso, vulgares tantùm uniuersa- lesq; componendorum miscendorumq; medica- mentorum normas, tum à seipso etiam conscri- ptas formulas; vel si volet, etiam minimos pharmacopolas hac in re examinet; herbarum materialiumve libra, num olei binas ad minus requirat. Carnis libris duabus aqua libram co- ctura sufficere si dixeris, à coci puero nonne etiam rideberis? Itaque cum Cordus hoc in vnguento, suo ex sensu, olei hinc libras sex tan- tum,

tum, ad herbarum materialiumve libras plures duodecim (quon quantitate vix madescerent) accipiendas suasisset, ut adhuc dum eius in contextu sonant verba: ego verò multas addens olei libras, ex sex vigintiquatuor effeci, & necdum sufficere pro tanta materie copia scio, si oleo, ut regula & ratio docent, materia sunt contegenda. Simili insuper cacitate, ut in hoc unguento, omnes Dispensatoriorum combinatores vti sunt, in unguento Martiato magno. Vbi enim Nicolai Alex. aliorumque exemplaria, olei sextaria sex admodum macrè legunt; ego sexaginta sex multo pinguius, necessariò reposui; rationes, errorumque causas hic prateriens. Bone Deus, tot tantisque Aristarchos mirum est tanta laborare coryza, ut tantum interval-lum, nempe à sex ad sexaginta sex; à sex insuper ad vigintiquatuor, non olfecerint; adeoque evidentes res animadvertisse neminem. Hic ut quantum in reliquis neglectum fuerit, colligere facile queas: quod asterisci, prater omnium scio expectationem, ita frequentes, locorum non omnium, sed precipuorum tantum, in hocce tam exiguo enchiridio animaduersorum indicationi demonstrare possunt. Quocirca, ut ingenuè quid sentiam tandem proferam, reliqua summam semel explicem; tot inter hodie Dispensatoriorum divulgatores, nullum panè digni quid Pharmacopœis cōsarcinasse protulisseque video; nihilque ferè prater aliorum ignauias transcripsisse, ac in suas chartas transfudisse, acta egisse;

gisse ; errata , & ineptias , erratis atque im-
 prius accumulasse comperio : ita ut posteriora
 prioribus etiam nonnunquam deteriora , Phar-
 macopœis que inutiliora , esse conspiciantur.
 Eiuscemodiigitur omphacini rabulis mi valeant.
 Sed pedem retrahere , receptuque canere tem-
 pestivè , satius est , priusquam malè audiens ,
 vilis ineptusque apothecarius , sordidusque im-
 mō olidus unguentarius , à medico quopiam
 Dispensatorii corrasore appetler , nulla ratione
 cum seplasiario conferando ; à quo corripì re-
 prehendive posse , equitas veritat , pinculūque
 putatur. Silere itaque volo , ne in Lacce laby-
 rinthum aliquem incautus incidens , illudere
 quempiam existimet. Verū gallus in suo ster-
 quilinio audet.

Ceterū hīc ebiter etiam referre volo , un-
 guentum Aregon olei quoque magna tabescere
 penuria.

Ad podagram frigidam , siue calidam ,
 paralyticos , arthriticos , nephriticos ,
 ischiadicos , & ad omnia vicia & dolores
 nervorum valet.

Unguentum album.

℞. Cerussæ in aqua Rosarum lotæ ℥ xvij.

Lithargyri albi loti ℥ j. β.

Olei Rosati ℞ ij. ℥ iiij.

Ceræ albiſsimæ ℥ vj. aut circiter.

Confice secundum artem.

Qui-

Quidam alia ratione componunt hoc unguentum : nam alii addunt albumina Ovi, alii non addunt Lithargyrium : alii non Ceram, sed Troacanthum admiscunt.

POLLET aduersus vlcera, scabiem, & adustionem, intertrigines, & inflammationem.

*Vnguentum Dialthææ simplex,
D. Nicolai.*

℞. Radicum Althææ ℥ ij.

Seminis Lini

Seminis Fœnugræci ana ℥ j.

Olei ℥ iiij. Cere ℥ j.

Terebinthinæ ℥ ij. Resinæ ℥ vj.

Radices & semina contusa macerentur tribus diebus in aquæ ℥ viij, aut quantum sufficit : quarta die coquantur, donec remittant crassam & viscosam mucilaginem : eam deinde exprime : mox

℞. Expressæ mucilaginis ℥ ij. & coque cum oleo : cum deinde aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, ceram addito, & fac secundum artem.

EMOLLIENTIUM habet : calefacit, & humectat.

*Vnguentum Dialthææ compositum
D. Nicolai.*

℞. Radicis Althææ ℥ ij.

Semi-

seminis Lini

seminis Fœnugræci ana ℥ j.

cillæ recentis ℥ vj.

Olei ℥ iiij. Cerae ℥ j.

erebinthinæ Gummi Hederæ

Galbani ana ℥ ij.

Colophonæ Resinæ ana ℥ vj.

Radices & semina contusa macerentur *

tribus diebus in ℥ viij. aut sufficienti *

quantitate aquæ: deinde coquantur do-

neec crassescat mucilago. Postea

2. Mucilaginis expressæ ℥ ij. & adde reli-

qua: ac fiat secundum artem vnguen-

tum.

VALET propriè ad dolorem pectoris ex

frigidityte & pleuresi: & super pectus

nunctum sanat omnia loca: infrigidata

calefacit: mollificat & humectat.

Vnguentum Egyptiacum

D. Mesuæ.

℞. Æruginis ℥ v.

Mellis optimi ℥ xiiij.

Acet. fortis ℥ vij.

Coquantur omnia simul, donec fiat vn-
guentum spissum, & colore purpureum.

ÆRUGO, est viride æris.

CONFERT ad vulnera antiqua, fistu-
lasque extergit: carnis excrescentiæ me-
detur, vehementerque exsiccat.

Vnguen-

Vnguentum aureum D. Mesue.

℞. Cera citrinæ ʒ vj.
 Olei boni ℥ ij. β.
 Terebinthinæ ʒ ij.
 Resinæ Colophonix ana ʒ j. β.
 Turis Mastiches ana ʒ j.
 Croci ʒ j.

Confice secundum artem.

VULNERA certò & salubriter glutinat.

*Vnguentum Citrinum [aut Citreum,]
D. Nicolai.*

* ℞. Foracis ʒ ij. Camphoræ ʒ j.
 Coralli albi ʒ iiij.
 * Ameni dulcis ʒ j.
 Umbilici marini
 Tragacanthæ albiſſimæ
 * Amyli ana ʒ iiij. Cryſtalli Entalii
 Dentalii Turis albiſſimi
 * Nitri * Marmoris albi ana ʒ ij.
 Geſſe ſerpentariæ ʒ j. Ceruſſæ ʒ vj.
 Axungia porcine recentis, non ſalita, ſed
 præparata & mundata ℥ j. β.
 Seui caprini præparati ʒ j. β.
 Adipis gallinacei præparati ʒ j.

Confice ſic: Axungiam porcinaſque
 adipem gallinaceum in vitreato vaſe li-
 qua ſimul; & impone tepidis adhuc, cor-
 ticum

um Citrei mali satis magnam quantita-
 tem, & macerentur per mensem vnum.
 Postea eximito cortices, & eliquatis adi- *
 bus, vt dictum est, adde seuum capri- *
 um: deinde addantur reliqua tenuissimè
 ita: vltimò verò insperge Camphoram
 subtilissimè tritam.

Notandum est in hoc vnguento non concor-
 re exemplaria in ponderum characteribus.
 Nam quidam pro 3, ponant 3; & econtrà.

BORAX est Nitri species, qua aurum ser-
 uixinant Aurifabri.

AMENTVM dulce, est Gypsum, quod in A-
 pillatas venas scinditur: [al. Alumen pla-
 nosum.]

VMBILICI marini, lapilli sunt inuenti
 in littore maris, figura Fabarum magnarum:
 Germanicè vocantur Merbonen.

DENTALIVM testaceum quiddam est ma-
 rinum, Fistula modo longum & concavum,
 vnde strictum, longitudine digiti parui.

DENTALIVM conchula marina est par-
 ua, dentatam rimam habens.

NITRVM est Salpetra.

GERSA Serpentaria, est radix Serpenta-
 riæ vera præparata, vt infra ostendemus.

P. C. SCHOL.

Amentum dulce.] Amiantum veterum A
 ste id, permale verterunt Fuchsius & Francis.
 Alex. longè enim alia res est. Barbara vocabu-
 e, doctis licet veterum vocibus quandoque sine
 confor-

conformia, non ea propter semper re ipsa eadem sunt, nec esse debent, idemq; significare. Quod in re doctos etiam viros interdum hallucinatos videmus.

FACIET maculas emendat: scabiem in quacumque corporis parte exterit, cicatrices extenuat; ruborem oculorum & vstiones ex insolatu factas aufert; & ea quæ aspera sunt, læuigat.

Vnguentum Populeum

D. Nicolai.

℞. Oculorum Populi arboris recentium ℥j. ss.
Axungia porcina præparata ℥ iij.

Oculi Populi contendantur, & macerentur in Axungia, donec sequentes herbe colligi queant æstate.

℞. Foliorum Papaueris agrestis

Foliorum Mandragoræ

Cimarum Rubi tenerrimarum

Foliorum Hyoscyami

Solani Vermicularis Lactucæ

Semperuiuæ maioris

Barbanæ Violaria

Scatuncelli ana ʒ iij.

Herbæ contendantur & misceantur oculis Populi & Axungia, & dimittantur per dies decem: deinde coquantur supra lentum ignem, cum vini odorati sufficienti quantitate, donec vinum consumatur: postea

à colentur & exprimantur, & expressum
guentum reponatur.

MANDRAGORÆ folia ubique haberi
non possunt; ideo duplex pondus foliorum Hyos-
cyami sumendum est.

VERMICULARIS vera, est Semperui-
minor, linguam non mordicans.

BARDANA id est, Lappa maior, cuius
radicem præcipisse accipiendam Nicolaus Ale-
xandrinus.

SCATUNCILLUM, reuera est Umbili-
cis Veneris, seu Cymbalaris, & non Krentz-
aut. Folia habet pingua, concava ut Cymba-
laris, radicem Aro similem: perquam pauci
eam cognoscunt.

CONTRA nimium calorem valet; &
in moribus illitum, somnum conciliat.

Vnguentum Fuscum, D. Nicolai.

. Olei P j. β.

seræ nouæ ℥ iiij.

olophonix

icis naualis

agapeni ana ℥ ij.

astiches

albani Turis

erebinthine ana ℥ j.

Confice secundum artem vnguentum.

SANANDI vim habet & extrahendi.

P

Vnguent.

*Vnguentum Diapompholygos,
D. Nicolai Alexandrini.*

R. Olei Rosacei

Cerae albæ ana ℥ vj.

Succi fructus vuc Lupinę quantum sufficit

Cerussæ ℥ ij. Plumbi vsti & loti

Pompholygis Turis puri ana ℥ j.

Confice secundum artem.

DIAPOMPHOLYGOS, *id est, de Ni-
hili albo. Nam Pompholyx est Nihili album, et
est, Galmes fug.*

VVA Lupina, *id est, Solanum siue Sola-
trum.*

Ad exiccanda erysipelata, vulnera son-
dida, & ad sananda tibiæ ulceræ, alio-
rumque locorum concaua vel dissipata
valet; replet, refrigerat & cicatrizat.

*Vnguentum Comitissæ, D. Guilielmi
de Varignana.*

R. Corticum medianorum Castanearum

Corticum medianorum Glandium

Corticis mediani Quercus arboris

Myrtillorum

Caudæ equinæ Gallarum

Corticum Fabarum

Acinorum Vuarum

Sorborum immaturorum siccorum

Mespi-

pilorum immaturorum siccatorum
 Pruni siluestris
 Chelidonia ana ℥ j. β.
 contundantur aliquantulum, & coquan-
 tur in aqua Plantaginis l' viij aut quantum
 sufficit, donec media pars consumpta fue-
 rit, deinde in colatura lauentur sequen-
 tium nouem vicibus; semper recentem
 aquam decoctionis affundendo, quoties-
 que lauat.

Cerae nouae ℥ viij. β.
 Myrtillorum
 Mastichini ana ℥ j. β.
 Postea insperge sequentium rerum re-
 sistissimum puluerem:

Corticis mediani Castanearum
 Corticis mediani Glandium
 Corticis mediani Quercus arboris
 Alliarum ana ℥ j.
 Meris ossium cruris bubuli
 Myrtillorum Acinorum vuarum
 Arborum siccorum ana ℥ β.
 Crochiscorum de Charabe ℥ ij.
 Confice secundum artem vnguentum.

ACINI hic significant lignea semina qua
 sunt in uvis.

SORBA sunt fructus similes Messilis:
 Germanicè vocantur Sperling, Sporbirn, Spore-
 , & Drecksecke.

PRUNUS siluestris, id est, Schlehendorn.

INCEPTVM abortum prohibet, hæ-
 morrhœi-

morroïdas sistit, ac laxatos renes conciliat, [menses retinet.]

*Vnguentum de Arthanita maius,
D. Mesua.*

℞. Succi Arthanitæ ℥ iij.
Succi Cucumeris asinini ℥ j.
Olei Irini ℥ ij.
Butyri vaccini ℥ j.
Pulpæ Colocynthidos ℥ iij.
Polypodii ℥ vj.
Euphorbii ℥ β.

Arida omnia contundantur, & macerentur in succis per dies octo: affuso etiam oleo in vase vitreo, diligenter obturato: nona deinde die coquantur lento igne aliquandiu, postea colentur: Colaturæ adde Sagapeni in aceto dissoluti aureos v.
Myrrhæ aureos ij.

Coquantur iterum vsque ad consumptionem succorum: postea adde Cerae ℥ v. Fellis taurini aureos v.

Ferveant simul, donec lique scat cera: postea insperge sequentium rerum tenuissimum puluerem:

℞. Scammoneæ Aloës Mezereon
Colocynthidos ana aureos v.
Euphorbii aureos ij.
Salis gemmæ aureos iij.
Turbith aureos v.

Pipe-

peris longi Zingiberis
hamomillæ ana aureos ij.

Confice secundum artem.

Omnia ferè exemplaria habent Colocynthis ana aureos v. meus autem manuscriptus Mesue habet aureum j. quod magis probo: sed extum nolui immutare.

ARTHANITA est Cyclamen; siue Cyminius: quidam malè vocant Panem porci-um. Si radices eius non adsint recentes, tunc cipe radices eius siccatas circiter l' vj. contun-antur & coquantur in aqua, & eliciatur succus, ut ex Glycyrriza fit.

ILLITVM stomacho, vomitu pur-at: hypogastrio autem inunctum, aluum eiicit, ob id hydropicos mirè iuuat, erosum excrementum largè vacuando: herpes quoque necat, & educit: adhibe-ur non potentibus sumere medicamen-um purgans.

*Vnguentum de Arthanita minus,
D. Mesue.*

v. Succi Arthanitæ

Viscositatis quæ exprimitur è radice Filicis

Succi Cathengit ana ʒ ix.

Succi extremitatum Tamarisci ʒ ij.

Oesyphi [id est, Hyssopi humida] ʒ v.

Olei Irini l' ij.

Bdellii Hammoniacci ana ʒ j. β.

P 3 Aceti

Aceti quantum satis est ad Hammon
cum dissoluendum.

Cerae Citrinae ℥ vj.

* Corticum radicem Capparis ℥ j. β.

Spicae ℥ iij.

Confice secundum artem vnguentum

FILIX non significat Polypodium,
eam herbam qua Germanicè vocatur *Walt-
ren*, & *Crenzfaren*.

CATHENGIT significat Ebulum :
autem hoc vocabulum valdè corruptum in pl
rimis exemplaribus.

OESYPYS, id est, Hyssopus humida,
est pinguedo lanarum succidarum.

SPLENIS tumores etiam scirrhus
dissoluit, & strumas.

Vnguentum Potabile.

℞. Butyri recentis sine sale ℥ iij.

Rubiae tinctorum

Castorei

Spermatis Ceti

Tormentillae [radicum] ana ℥ j.

Bulliant simul in vino odorifero ad vi
ni consumptionem, ac fiat vnguentum
secundum artem.

DATVR ad consolidandum casum e
alto. [Sumitur ab uncia dimidia ad inte
gram.]

Vnguen

Vnguentum Rosatum, D. Mesue.

℞. Axungia^e porcinę recentis quantitatem
 quam volueris, & lauetur in aqua ca-
 lida nouies, & tandem cum aqua
 frigida lotionē vltima: deinde teratur
 cum ea Rosarum rubearum recentium
 æquum pondus, & dimittantur mar-
 cescere per dies septem: postea coquan-
 ter cum facilitate, ac percolentur, &
 rursus tantundem Rosarum rubearum
 teratur cum ea, & dimittatur per alios
 dies septem marcescere, atque adfunda-
 tur succi Rosarum pars dimidia, olei
 Amygdalini pars sexta, & rursus con-
 coquantur cum facilitate, dum succi
 euanescent. Quod si parum Opii in
 aqua Rosarum colliquatum inter deco-
 quendum iniicitur, fit efficacius.

PHLEGMONAS, erysipelata, herpe-
 tas sedat: Cephalalgiam calidam, & ven-
 triculi ac hepatis intemperiem calidam
 mitigat.

Vnguentum Pectorale.

℞. Mucilaginis seminis Psyllii

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Seminis Lini

Fœnugræci ana ʒ

j.

P 4

Adi- *

Adipis gallinæ Medullæ vituli
Butyri recentis loti cum aqua Violarum
ana ℥ j. β.

Olei Violati

Olei Amygdalorum dulcium ana ℥ j.

Ceræ albæ quantum sufficit: fiat vnguentum.

M I T I G A T dolores pectoris & tussim:
digerit, maturat, faciliat sputum, & re-
soluit pleuresin.

Vnguentum Album Caphuratum.

℞. Olei Rosati ℥ j.

Ceræ albæ ℥ iij.

* Cerussæ ℥ vj.

* Albi ouorum num. iij.

Caphuræ dissolutæ cum aqua Rosarum ex
arte ℥ ij.

Fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum Rubrum Caphuratum.

℞. Olei Rosati ℥ j. β.

Lithargyrii ℥ ij.

Minii ℥ iij. Cerussæ ℥ j. β.

Tuthiæ

Caphuræ ana ℥ iij.

Ceræ ℥ ij. in æstate: Sed in hieme ℥ j.

Fiat vnguentum in pila plumbea cum
pistillo plumbeo.

CERO-

CEROTA.

*Cerotum Infrigidans Galeni,
ex Mesue.*

℞. Cerae albę ʒ j.

*

Olei Rosati omphacini ʒ iiij.

*

Conquassentur simul cum modico albi & clari aceti. Oleum verò Omphacinum antequam Rosas recipiat, sapius est lauandum cum aqua fontis gelidissima: deinde confice secundum artem.

REFRIGERAT febres ardentes, calorem hepatis, & sedat dolores capitis, circum tempora, super hepar & spinam dorsi linitum.

Cerotum Santalinum, D. Mesue.

℞. Rosarum ʒ xij.

Santali rubei ʒ x.

Santali albi

Santali citrini ana ʒ vj.

Boli Armeniaci ʒ vij.

Spodii ʒ iiij. Camphorę ʒ ij.

Cerae albę ʒ xxx. Olei Rosati ꝑ j.

Confice secundum artem.

OLEUM Rosatum debet fieri ex oleo acerbo, id est, ex immaturis oliuis expresso.

P 5

P H L E-

PHLEGMONAS & intemperatura
omnes calidas ventriculi, hepatis, & par-
tium aliarum potentissimè extinguit.

*Cerorum Stomachale Galeni,
D. Mesue.*

℞. Rosarum rubrarum ʒ xx.
Foliorum Absinthii ʒ xv.
Mastiches ʒ xx.
Spicæ Nardi Indicæ ʒ x.
Cere mundæ ʒ iiij.
Olei Rosacei ℥ j. β.

Cera & oleum aliquoties ex aqua Rosa-
rum lauentur, & excolata omni aqua rur-
sus ad lentum ignem resoluantur: deinde
alia omnia in subtilissimum pulverem tri-
ta, inspergantur.

VENTRICULUM & hepar roborat;
horum dolorem à frigido lenit, appe-
tentiam excitat, coctionem iuuat.

EMPLASTRA.

*Emplastrum Diachylon simplex,
D. Mesue.*

℞. Mucilaginis Fœnugræci
Mucilaginis seminis Lini
Mucilaginis radicum Althææ ana ℥ j.
Olei

Olei veteris clari ℥ iij.

Chargyrii ℥ j. β.

Coquantur secundum artem, & fiat Em-
plastrum.

DIACHYLON vocatur hoc Emplastrum,
succis viscosis siue mucilaginibus: hodie cor-
rupto nomine dicunt Diaquilon.

Mucilagines ista debent esse spissa & viscosa:
et oportet ut quantitas seminum & radicum
satis magna, unde fieri debent mucilagines.

SCIRRHOS hepatis, lienis, ven-
triculi, & aliarum partium, ipsas etiam
phœradas & durities reliquas emollit &
dissolvat.

*Emplastrum de Mucilaginibus,
sen Diachylon compositum.*

℥. Mucilaginis Radicum Althææ

Mucilaginis seminis Lini

Mucilaginis mediani corticis Ulmi

Mucilaginis Fœnugræci ana ℥ iij.

Olei Chamæmelini Olei Liliorum

Olei Anethini ana ℥ j. β.

Hammoniæ Galbani Opopanacis

Sagapeni ana ℥ β.

Ceræ novæ ℥ xv.

Croci ℥ ij. Terebinthinæ ℥ ij.

Gummi siue lachrymæ resoluantur in
vino optimo, & conficiatur secundum
artem Emplastum.

P 6

Porro

Porro hieme licet oleorum & Terebinthinae pondus augere.

VLMS arbor est qua vocatur Germanice Ylmen & Rustern. Cortex eius medius est similis cortici Tilia: Gleich wie ein bast: ex eo debet fieri mucilago.

CHAMÆMELVM, vulgò vocatur Camomilla.

MATVRATA apostemata, & mollit durities; partim resoluit, & partim digerit, abstergitque saniem ruptorum apostematum, & sanat phlegmones.

Emplastrum Diachylon magnum, Filii Zachariae, ex Mesue.

℞. Lithargyrii mundi tenuissimè triti, & per cribrum excussi ℥ xij.

Olei Irini

Olei Chamæmelini

Olei Anethini ana ℥ viij.

Mucilaginis seminis Lini

** Mucilag. rad. Althææ*

Mucilag. Fœnugræci

Mucilag. Ficum pinguium

Mucilag. Passularum

Succi Ireos

Succi Scillæ

Oesypi

** Glutinis Alzanahan ana ℥ xij. β.*

** Terebinthinæ ℥ iij.*

Resinæ Pini

Ceræ citrinæ ana ℥ ij.

Con-

Conficiatur secundum artem Empla-
rum.

S V C C V S Scilla, est mucilago ex trita Scil-
la expressa.

O E S Y P V S, est pinguedo lanarum succi-
arum; cuius faciendi modum in ultimo tra-
tatu indicabimus: vulgò vocatur in Pharma-
copoliis Hyssopus humidus.

G L V I E N Alzanahan vel Alchanach, si-
ne Alzanach, est Ichthyocolla, id est, gluten,
sive colla piscium: vulgò Hausenblasen. [Alii
iununt Limacum succum.]

Hoc Emplastrum debet habere consistentiam
& spissitudinem Ceroti.

R E S O L V I T & maturat omnes duri-
ties & inflammationes.

*Emplastrum Diachylon paruum,
D. Mesuae.*

℞. Lithargyrii ℥ vj.

Olei veteris clari ℞ j.

Mucilag. Psyllii ℥ iiij.

Mucilag. Hyoscyami ℥ j. β.

Mucilag. seminis Lini

Mucilag. radicum Maluæ ana ℥ ij.

Conficiatur secundum artem Empla-
strum, Ceroti alicuius spissitudine.

T Y M O R E S calidos digerit & matu-
rat.

*Emplastrum de Meliloto,
D. Mesue.*

- R^x. Meliloti ℥ vj.
 Florum Chamæmeli
 Fœnugræci Baccarum Lauri
 Radicum Althææ
 Absinthii ana ℥ iiij.
 Seminis Apii
 * Cordumeni Ireos Cyperi
 Spicæ Nardi Indicæ
 Cassiæ lignæ
 * Ammios ana ℥ ij. β.
 * Sampsuchi [*id est, Maiorana*] ℥ iiij.
 Hammoniæci [*id est, Harmoniaci*] ℥ x.
 Styracis calamitæ
 Bdellii ana ℥ v.
 Terebinthinæ ℥ j. β.
 Ficum pinguium num. xij.
 * Seui caprini
 Resinæ ana ℥ ij. β.
 Cerae ℥ vj. Olei sampsuchini
 Olei Spicæ ana quantum sufficit.
 Confice Emplastrum sic:
 R^x. De Meliloto prædicto ℥ v. ℥ ij.
 Fœnugræci
 Chamæmeli seorsum præter prædicta ana
 ℥ iiij.
 Coquantur in l' iiij aquæ aut quantum
 sufficit, donec remaneat l' j. deinde om-
 nia

ia arida cum reliquis sex drachmis Meliloti subtilissimè pulueriscentur. In decoctione autem colata secundum artem dissoluantur Hammoniacum & Bdellium: dissolutis addantur Ficus per se minutissimè incisæ & contusæ, & optimè misceantur. Postea ad ignem simul liquefiant Tebeinthina, Scuum caprinum, Cera & resina Pini, & addatur olei Spicæ Nardi, olei Sampsuchi ana circiter ℥ v. Cùm deinde omnia sunt mista, addantur pulueres triti, & fiat secundum artem Emplastrum.

Porro potes etiam sequenti ratione conficere. ℥ vj. ingredientis Meliloti vnà cum reliquis aridis tundito, & iisdem permisceto: postea & ad decoctionem priuatim Meliloti m. iiij. & gummi, videlicet Hammoniacum atque Bdellium, in vino dissoluito: Olei verò Sampsuchini atque Olei Nardini accipere tum oportet ana circiter ℥ vij. aut ℥ viij. & confice secundum artem Emplastrum.

OLEI Sampsuchini compositio suprà traditur in tractatu de Oleis.

Per Oleum Spicæ, Mesue intelligit oleum Spicæ Nardi, siue oleum Nardinum. Mesue enim nusquam meminit Lauandule maioris, quæ hodie Spica vocatur; neque eius olii quod vocant oleum Spicæ.

EMOLLIT omnem duritiem quæ in iecinore, liene & ventriculo existit. *Dolorem*

lorem item vehementer sedat, hypochondriaque tenfa sanat.

- * *Emplastrum Triapharmacum Mesuae,*
cui sub Unguenti nomine
describitur.

℞. Lithargyrii subtilissimè triti

Aceti vini ana l' j.

Olei veteris l' ij.

- * Fiat coctione secundum artem Emplastrum.

FACIT nasci carnem in vulneribus; & consolidat ea.

Emplastrum Oxycroceum,
D. Nicolai.

℞. Ceræ Picis Colophonie

Grocii ana ℥ xij. Terebinthinæ

Galbani Hammoniacci Myrrhæ

Libani [id est, Turis]

Mastiches ana ℥ iiij.

Aceti phialam vnam.

Galbanum & Hammoniacum in aceti
sufficienti quantitate dissoluantur, & rur-
sum ad lentorem coquantur, donec ace-
tum in vaporem evanuerit: tum addan-
tur liquefactis simul Ceræ, Pici, Colo-
phonie & Terebinthinæ: postquam om-
nia

ha sunt commista, inspergito etiam Myr-
ram, Libanum & Mastichen subtilissimè
trita : ad vltimum verò etiam Crocum
per se in tenuissimum pulverem redactum.
fiat secundum artem Emplastrum.

OXYCROCEVM dicitur hoc Empla-
strum, ab ingredientibus Croco & Aceto.

Nicolaus Alexandrinus secundum hunc A
modum tradit Oxycrocei confectiorem. Alii au-
tem qui ex eo hoc Emplastrum scripserunt, ter-
tiam eius partem describunt : & cum ζ iiij. in
tres partes diuidere conarentur, tertiam earum
artem statuerunt ζ j. ζ ij. itaque resultat
j. Nam ter tria nouem faciunt : quapropter
hos malimus ex fonte haurire huius Empla-
stri confectiorem.

P. C. SCHOL.

Nicolaus Alexand.] Fuchf. prauè hic cen- A
dit Cordum in ponderum ratione errare, renon
ene ab ipsomet ponderata.

PRODEST ossibus fractis, item par-
tibus quæ dolore aliquo affliguntur: duri-
tiam denique omnem emollit & discutit.

Emplastrum Apostolicon, D. Nicolai.

℞. Lithargyrii ζ vj.

Ceræ fuluæ

Colophonix ana ζ ij.

Propoleos

Visci

- * Visci quercini ana ʒ j.
 Hammoniæ
 Lapidis calaminaris ana ʒ vj.
 Mastiches Olibani
 * Mumie ana ʒ iiij.
 Terebinthinæ Bdellii Galbani
 Myrrhæ Æris vsti Squammæ aris
 Viridis aris Sarcocollæ
 Dictamni Cretici
 Aristolochiæ rotundæ
 Opopanacis ana ʒ iiij.
 * Oleis veteris quantum satis erit.
 Vini clari quantum Galbano, Hammoniaco & Opopanaci dissoluendis satis fuerit.

Confice secundum artem & diligenter Emplastrum.

Nicolaus olei quantitatem non exprimit: quare nonnulli ʒj. iniiciunt.

PROPOLIS non sunt sordes alueariorum apum, sed est Cera odorata; qua apes ante hiemem foramina alueariorum obturant: Germanicè vocatur Bet & Nebenvvax: eam apes colligunt ex oculis Populi & Betula arborum.

VISCUM quercinum hic non significat lignum visci quercini, sed gluten illud lentum ex visco quercino extractum, quo capiuntur aues, hoc est, Der vogelleyrn auß Eichenmistell gemacht.

SQUAMMA aris est duplex: una est crassa, qua

EMPLASTRA. 355

ua vocatur Germanicè Kupfferschlach; alia
a farina modo tenuis & rufa: hec vocatur
Sesselbraun, & est efficacior, & hic debet poni.

VALET ad dolores cervicis potissi-
mum & renum; sagittas ac surculos cor-
pori infixos extrahit.

*Emplastrum Apostolicum, D. Nicolai
Alexandrini.*

℥. Lithargyrii 3 xvij.
Cera rubra
Colophonie ana 5 vj.
Propoleos
Visci Quercini ana 3 iij.
Hammoniæ
Lapis Calaminaris ana 3 ij.
Turis Mastiches
Mumiæ ana 5 j. β.
Terebinthinæ Galbani
Bdellii Myrrhe
Chalcu cecaumeni Sarcocollæ
Lepidos chalcu Opopanacis
Dictamni Cretici Aristolochiæ
Prælii viridis ana 5 j.
Olei veteris quantum sufficit.

Coquatur Lithargyrium secundum ar-
tem in oleo, donec fiat massa purpurea,
& non adhæreat manibus dum refrigera-
ta tractatur, quod Græci vocant Amolyn-
tum: deinde omnia sigillatim secundum
artem

artem iniiciantur. Galbanum & Opopanacum in vino dissoluantur: reliqua Gummi terantur & inspergantur. Dictamnus Creticus verus solus ultimò addatur.

Nicolaus Alexandrinus non ponit olei pondus aut mensuram: mihi autem videntur sufficere uncie sex.

CHALCV CECVMENV, id est, *Æris vsti.*

LEPIS Chalcu, id est, *Squama aris: Germanicè Kufferschlag, vel Kesselbraun: Efficacior est altera eius species quæ Kesselbraun vocatur.*

PRASIUM viride hic significat *Æruginem, id est Viride aris.*

Ad omnia vulnera recentia siue antiqua, & ad nervos præcisos vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium vel maritimorum peculiariter congruit: educit ab eis humores & putredines intimè immerfas, & concavitates earum pura carne replet; repletisque cicatricem absque detrimento inducit: Sagittas, calamos, & similia altiùs membris infixæ, sine dolore extrahit.

Emplastrum Album coctum.

℞. Olei	℥	ij.
Cerussæ	℥	j. β.
Ceræ albæ	℥	iiij.

Coquan-

EMPLASTRA. 357

Coquantur secundum artem, & fiat
emplastrum.

OPITVLATUR excoriatis à calcea-
mentis, & scapellatione, vel ab alia causa.

*Emplastrum griseum, de Lapide
Calaminari.*

. Lapidis Calaminaris præparati ʒ j.
Sithargyrii ʒ ij. Cerussæ ʒ β.
Suthiæ ʒ j.
Cerebinthinæ ʒ vj.
Cera albæ ʒ j. β.
Seui ceruini ʒ ij.
Turis electi ʒ v. Mastiches ʒ iij.
Syrthæ ʒ ij. Camphoræ ʒ j. β.

Confice secundum artem.

DESICCAT, replet & cicatrizat vlcera.

Emplastrum viride.

. Cera nouæ Resinæ
Cerebinthinæ ana ʒ iiij.
Olibani [idest, Turis] Mastiches
Viridis æris ana ʒ iij.
Confice secundum artem.

Emplastrum Basilicum magnum.

. Cera albæ
Resinæ Pinæ Seui vaccini
Picis

Picis naualis Terebinthinæ Olibani
Myrrhæ ana ℥ j.

Olei quantum sufficit : fiat Emplastrum.

VLCERA phlegmone carentia, præ-
fertim partium neruofarum, terget, &
carne implet.

*Emplastrum de Crusta panis,
Montagnana.*

℞. Mastiches Menthæ Spodii

Corallii rubri

Santali rubri

Santali albi ana ℥ j.

* Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto
per horam mediam ℥ ij.

Olei de Mastiche

Olei Cydoniorum ana ℥ j.

Farinæ hordei, quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

VALET in vomitu puerorum, & his
qui cibum retinere non possunt.

*Emplastrum de Baccis Lauri,
D. Mesua.*

℞. Turis Mastiches

Myrrhæ ana ℥ j.

Baccarum Lauri ℥ ij.

Cyper

Costi ana ℥ β.

Mel-

PRÆPARATIONES QVORVMD. SIMP. 359

bellis calidi colati quantum ad cogen- *
tum satis est.

Si verò triplum Cyperi, & stercoreis vac-
corum aut caprarum sicci ad pondus om-
nium accipiatur, erit efficacius ad hydro-
sin, & inflationes discutiendas.

VENTRICVLI, intestinorum, hepa-
s, renum, vesicę, vteri, & partium alia-
rum dolorem à flatibus aut intemperie fri-
da ortum placat.

PRÆPARATIONES

QVORVNDAM

SIMPLICIVM.

*Aloën cum Aromatibus
abluendi modus.*

. Aloës purissimę & cribratę ℞ j. *

asie lignę

picę Nardi Indicę

sari

Schœnanthi

Carpobalsami [aut succedanei eius]

Glylobalsami [aut succedanei eius]

innamomi

Ligni Aloës

roci

Mastiches

acçę

ana

3

iiij.

Decoquantur aromata in aquę quanti- *

te sufficienti, secundum artem in duplici

vase;

vase; deinde colentur. In colatura dissolue Aloën, continuè agitando : & pone ad solem in vitrea aut vitreata patina, donec exsiccet. Oportet autem patinam linreolo puro tectam soli exponere, ne aliquid incidat. Quòd si hieme lauanda est Aloë, in estuarium ad fornacem ponatur : oportet etiam fundo vasis insidentes arenas, & si quæ sunt aliæ sordes, diligenter auferre.

Aloën simplex abluendi modus.

℞. Aloës purissimæ & trite ℥ ij.

Aquæ celestis q. s. aut ℥ vi.

Misceantur in patina vitrea, ita ut aqua calefacta prius infundatur : deinde subsidere finito sordes & calculos ; & puram pinguemque aquam, cui se pura Aloë miscuit, sensim excolato, & sordes in fundo abiicito; postea colaturam tectam linreolo in sole exiccato.

Laccam abluendi modus.

Modus abluendi Laccam, qui passim à scriptoribus traditur, admodum absurdus est : & qui eum primus inuenit aut tradidit, Laccæ naturam penitus ignorauit : nam quidquid purum, sincerum & efficax est in Lacca, illud aqua miscetur, quam illi dicunt abiiciendam esse, & quod remanet, in Trochiscos formandum,

*m, hoc est, calculos, ligna & sordes. Nos
rò rectius modum erademus.*

Aristolochiæ longæ

thœnanthi ana ʒ ij.

Decoquantur in aquæ l' iiij. aut q. f.

donec remaneant l' ij.

Colaturæ insperge

laccæ integræ l' j. ʒ iiij.

Decoquatur Lacca deinde lento igne,

donec aqua fiat coloris sanguinei: & quid-

quid in Lacca boni fuerit, dissoluatur;

et per filtrum aut laneum pannum cola,

et remanentes sordes abiice. Excolatam

erò & sanguinei coloris aquam lentis

turnis in duplici vase vsque ad mellis spif-

itudinem coquito, & tepidam massam in

trochiscos fingito. Hic itaque verus est

modus abluendi Laccam.

Plumbum lauandi modus.

2. Mortarium plumbeum: in eum infun-

de aquam cælestem, & agitato aliquot

horas aquam in mortario, donec aqua

colorem acquirat liuidum, & crassescat

in modum limi. Limum hunc per lin-

teum exprime, & exiccatum repone

[in pastillos.]

Limatura ferri, quam Scoriam vocant,

preparatio.

g. Limaturam ferri optimi, aut Chaly-

bis,

bis, aut Squamam, hoc est, Batiturum
 cius: purga eam ab omnibus immundi-
 tiis, hoc modo: Proiciatur in aquam cla-
 rissimam, & fricetur manibus: postea
 sordidam aquam effunde totam, deinde
 impone limaturam in vitream patinam
 & affunde modicum aceti, ut tantum hu-
 mectetur, nec emineat acetum: postea
 macera diebus xxx. ultimò tere, & reponere

Scammoneam preparandi modus.

℞. Scammoneę optimę ℥ iiij.

Contere in subtilissimum pulverem
 deinde insperge illi olei Violati optimi
 modicum, ut fiat massa: deinde excava-
 aliquot Cydonia mala magna, & in cavi-
 tatem eorum impone massam Scammo-
 neę, & coöperi foramina Cydoniorum
 postea assa in fornace cum pane, donec
 Cydonia perfectè sint assata: deinde eximi
 Scammoneam, & impone sequenti diluto
 ℞. Carnium Myrobal. Citrinarum ℥ j.
 Succi Cydoniorum ℥ iiij

Conterantur Myrobalani, & miscean-
 tur cum calefacto Cydoniorum succo, &
 stent in infusione horis xxiiij. deinde leni-
 ter cola: colaturam verò infunde Scammo-
 neę, & optimè simul misce: ultimò in
 loco calido exicca, & exiccatam reponere
 Scammoneam: [quod Dacrydium, Dia-
 crydium & Diagridium vocant.]

Colocyn-

Colocynthis preparatio.

1. Colocynthis pulpę P j. *

Bdellii

Ragacanthę ana ʒ xij.

Incidatur Colocynthis minutissimè:
Ragacanthum verò & Bdellium dissolue
in aquę Rosarum q. s. & dissoluta insper
sae incisę Colocynthidi, & fac Trochiscos,
quos in sicco aliquo loco sic cabis: exsicca
tos deinde Trochiscos iterum subtilissi
mè terito, & reforma Trochiscos, adhibi
turi Mastiche in oleo Rosaceo dissoluta.
Porro Trochiscorum Alhandal confe
ctio, est vera Colocynthis preparatio.]

Scille preparatio.

2. Scillam magnam, recentem, neque
putridam, neque gelu flaccidam: abiice
eius exteriores aridas tunicas: inuolue
deinde eam massę suę pastę pistorum
unde panis fit: assato postea in furno
cum panibus, donec panes percocti
fuerint: hinc è furno exime Scillam, &
sigillarim omnes tunicas detrahe, &
funiculo traiectas in calido loco exsic
cato: abiicito verò medium Scillę cor,
unde germen enasci solet. Porro Scilla
non est incidenda ferreo aliquo cultro,

Q 2

sed

sed è ligno solido aliquo facto : nam contrahit à ferro venenosam quandam rubiginem.

Mezerei fol. præparatio.

℞. Foliorum Mezerei quantum libuerit: ea macera in aceto vini horis xxiiij. postea exsiccentur: cum verò vti iis voles, contere, & in contundendo abice eorum venas & neruos.

Esula rad. præparatio.

Esula tam maior quàm minor, præparatur eodem modo quo Mezereon.

Gersam Serpentariae faciendi modus.

℞. Radices Serpentariae veræ, vel loco eius radicum Ari, id est, Aronis ℥ iiij. Terantur subtilissimè, & affunde eis aquæ Rosaceæ ℥ iiij. deinde exsiccentur ad solem in vitrea patina, linteolo tecta. Postea secundò tantum aquæ rosaceæ affundito, & simili modo exsicca: tertid eadem aquæ Rosaceæ quantitas inspergatur: & vltimò siccata farinam cum vino odorato in Trochiscos siue orbiculos finge, & repone. Ingreditur autem hæc Gersa vnguentum Citrinum, & re-

& reliquaquæ ad nitorem cutis conficiuntur.

Spodium preparandi modus.

Eboris in partes secti P j.

Pone id in nouum & nondum creatum fictile, & crudo operculo tegi, & iuncturam luto figulino diligenter oblinito: postea in fornacem teguli mitte, & cremari finito, donec stilia percocta sint: deinde exemplum Ebur in tenuissimum puluerem terito & cribrato, & infunde ei in patina vitrea aquæ Rosarum P ij. & exsicca finito. Deinde secundò terito, & alias aquæ Rosaceæ affundito, atque similiter exsicca. Tertiò etiam terito, & adde huc aquæ Rosarum P j. in qua diligenter dissolutæ sint Camphoræ trita subtilissimè ʒ iiij. Tere omnia in tabula marmorea durissima, & finge Trochiscos: quos repone in denso vase aliquo, ne exsiccarent. Porro si Ebur habere non poteris, loco eius sume Cornu ceruinum, & similiter præpara: est enim hoc quoque efficax medicamentum ad multa, præsertim contra venena.

*Ebur crematum, melius est ut [non] oper-
fictile fiat. aliàs enim non candidum, sed ni-
rum fit.*

Q 3

Put.

Pulmonis Vulpini preparatio.

℞. Pulmonem Vulpis recentem ; extrahere ex eo arteriam siue fistulam , & laua in vino odorato calefacto : mox ollæ impositum , exsicca in tepido furno : deinde exsiccatum repone in loco sicco , & incole Absinthio , ne putrescat.

Hepatis Lupini preparatio.

Hepar Lupi eodem modo præparatur quo pulmo Vulpis.

Sanguinis Hircini preparatio.

Hircum mediocris ætatis domi alito , & per mensem nihil aliud dato præter Pimpinellam , Apium , Petroselinum , Levisticum , & similia : deinde sanguinem eius , qui ex arteriis fluxit , excipito , & con- crescere finito ; atque aqueum illud effunde ; grumos verò sanguinis in furno exsicca. Mactandus autem est Hircus Veris exitu , id est , principio æstatis , cùm Sol Cancrum ingressus est.

Adipum vel Pinguedinum preparatio.

℞. Adipem vel Pinguedinē cuiuscumque anima-

animalis; & laua in aqua aliquoties, donec pura defluat aqua, & non amplius faecula, aut cruenta appareat: deinde minutim incisam liqua in duplici vase; & elixiratum in frigido loco reponere, sine sale.

Medullarum preparatio.

Medullas ex ossibus auferto Autumni initio, & laua, & liqua in duplici vase, secundum modum qui traditus est in Adipum siue Pinguedinum preparatione.

Oesypum faciendi modus.

1. Lanæ succidæ, hoc est, nondum purgatæ, ex collo, feminibus & femoribus ouis detonsæ, quantitatem satis magnam; infunde ei aquam feruidam, & laua diligenter, quousque omnem suam pinguedinem in aquam deposuerit. Postea expressam lanam seponere, & aquam illam pinguem & sordidam vasculo aliquo diutissime ex alto fundito & refundito, donec spumosa fiat: tum finito spumam subsidere, & collige aquæ innatantem pinguedinem; iterumque aquam refundito, donec spumet, & subsidentem pinguedinem auferto, & rursus refundito, donec non amplius spumet, & nulla concreascit

Q 4 supra

supra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem iungito, & in aqua lauto, manibusque diducito, donec pura fiat, & aqua clara defluat & albefcat, & pinguedo linguam admota non mordeat: tum repone in fictili denso, loco frigido. Porro hic Oesypus hodie vocatur corrupto nomine Hyssopus humida: sed non bene præparatus habetur in Pharmacopoliis.

*Terebinthinam resinam coquendi
modus.*

℞. Resinæ Terebinthinæ, aut eius loco Laricinam resinam, quam Terebinthinam hodie vocant, ℥ j. affunde ei aquæ ℥ xxiiij, & coque in magno vase, donec odorem amittat, & inspissetur, aded ut refrigerata digitis in pulverem teri queat. Hoc modo vsta [seu cocta potius] resina ingreditur in quædam Vnguenta, Olea, & in Trochiscos Cyphi, qui pertinent ad Mithridatium.

Acacia Succedanea.

Acacia vera apud nos non potest confici: eius autem loco sumunt nostri Pharmacopola totius ferè Europa, succum Prunorum silvestrium, id est, Schlehen-safft. Sed hac, quam describimus, propius ad vere Acacie vires accedit.

℞. Sc.

& Seminum Thamarindorum

Sumach ana ℥ ij.

Contundantur, & affunde eis aquæ cælestis [seu pluviae] ℥ viij. aut q. s.

Macera deinde per horas xxiiij. Postea coque donec tertia pars aquæ remaneat: excolatam deinde aquam, cum albuminibus ouorum clarifica & despuma: despumatam deinde iterum coque supra lentas prunas, ad spissitudinem iustam; deinde reponere, ut Acaciam ex Prunellis siluestribus factam.

PONDERV M

RATIO.

PONDERA quibus hodie Medici utuntur, hæc sunt: *Libra, Quartarium vel Quadrans, Uncia, Drachma, Scrupulus, Obolus, Lupinus, Granum, Siligua, Lens*: & hæc quidem à Græcis atque Romanis mutuârunt.

Præter hæc sunt alia quæ à Barbaris atque Arabibus desumpserunt: qualia sunt, *Manipulus, Pugillus, Aureus, Kist, Kirath, & Danic*, quorum nominibus Mesuæ potissimum uti constat.

Libra itaque, quæ & Pondo etiam dicitur, in duodecim uncias diuiditur. Errant itaque indocti huius ætatis Pharmacopola, qui libram

Q s seducim

sedecim unciarum, quot sanè mercatoria ac negotiatoria est, in medicamentis conficiendis accipiunt. Ea autem illos ut libra facillè ex quartis colligitur, quibus uncias quatuor assignant, quas si quater sumpseris, sedecim prodibunt uncia. Quartam autem libra partem, Latini Quadrantem nominant, sicuti tertiam Trientem, sextam Sextantem. Quadrans itaque, vel (ut nostri loquuntur) Quarta, vel Quartarium, pondus exsistit trium unciarum; Triens verò quatuor; veluti Sextans duarum unciarum.

Porrò Uncia octo drachmas constituit; denarios septem: Drachma scrupulos tres: Scripulum verò, qui Gracis $\rho\epsilon\acute{\alpha}\mu\alpha$ dicitur (quasi primum ponderis elementum) nonnulli Scripulum etiam nominant: habet verò obolos duos. Obolus pendet grana duodecim; quae idcirco viginti quatuor scrupulum constituunt. Nicolai tamen scrupulus ex viginti tantum granis constat.

At & alia pondera Graecorum Medici usurpârunt. Drachma enim novem Lupinos pendit: Siliqua verò, quae Gracis $\kappa\epsilon\acute{\gamma}\acute{\alpha}\nu\omicron\varsigma$ est dimidium Lupini: Siliqua itaque sex, Lupini tres scrupulum pendunt. Semen autem in Siliqua contentum, non tota Siliqua, intelligitur: & id mediocre, non enorme & habitius; neque strigosum & emaciatum, qualia Hordei aut Tritici grana usurpamus, quae hodie minimum pondus faciunt, veluti olim grana Lentis. Unum
verò

erò Siliqua granum sex Lentis seminibus pon-
 re respondet: quæ si sexies sumpseris, in unum
 triginta sex Lentis semina prodibunt, quæ
 rapulum constituunt.

Nunc ad ea, quibus Arabes & recentiores
 utuntur, venimus: inter quæ primam Mani-
 pulum nobis occurrit. Sic autem vocant herba-
 rum fasciculum, quem manus prehendere &
 complecti potest. Pugillo autem perperam
 utuntur recentiores, cum sit dimi-
 nutum potius à pugno, qui compressis sit di-
 gitis. Aureus, illis pondus unius drachma cum
 dimidia significat. Danich pondus octo grano-
 rum: Kirath verò quatuor.

P. C. SCHOL.

Danich.] Contra Georgii Agricola, alio-
 rumque doctiorum virorum sententias, Cordus
 Danich pondus granorum sex, & Kirath trium
 faciebat.

Q. NOTÆ

NOTÆ PONDERV M
QVÆ HODIE IN
VSV SVNT.

Grani	} Nota est {	Ġ. Eingrein oder Ger- stenkornlein schwer.
Scrupuli		ð. Ein scrupel, ein dritteil eins quintils.
Drachmæ		z. Ein quintle, oder gulden schwer.
Vnciæ		ʒ. Ein unſ z, iſt zwey lot.
Quadrantis		Quad. Ein quart, vi. lot.
Libræ		℥ Ein pfund.
Semis		ß. Halb.
Manipuli		M.
Pugilli		P.

FINIS eorum qua Valerius Cordus Nu-
rembergenſi Senatui exhibuit.

V A L E.

VALERII CORDI
DE
EXTRACTIONE,

VT VOCANT,

VRGANTIVM MEDICAMENTORVM,

E T

OLEORVM DISTILLATIONE;

In genere primùm, deinde priuatim de Oleo è Chalcantho duplici, vno austero (vel acido) altero dulci:

*Libellus tripartitus, à CONRADO GESNERO
primùm publicatus, & VAL CORDI
Annotationibus in Dioscoridem ab eodem
annexus.*

PARS PRIMA.

De Extractione. Cap. 1.

EXTRAHITVR ex medicamentis Solu-
lucius ipsa qualitas purgans æquè ac
Olea, sed diuersa ratione. Olea pro-
pter aëriam substantiam ascendant in di-
stillatione: Solutiua verò facultas, quo-
niam terrestri corpori inseparabiliter in-
hæret, non ascendit, sed in fundo relin-
quitur: excepto vno atque altero, flore
videlicet Pruni siluestris & Persici; quo-
rum aqua distillata aluum subducunt; &
Q7 hoc

hoc quia flores hanc vim obtinent : nam hi melius à Sole excoquantur , & subtiliores vires , quæ facile resolvuntur in vaporem , acquirunt. Sed quæ propriè solutiva vocantur , ut sunt radices , aut radicis liquores , aut succi , aut cortices , aut semina , omnibus inest tenaciter inhærens & viscosa qualitas. Ideoque eorum solutiva vis non potest ascendere in distillatione , sed manet in substantia decoctionis , ex ea euaporante quicquid est aqueum. Excogitata autem hæc est extractio pro delicatis & nauseabundis , ut qui magnam solutiui dosim non ferunt.

Ellebori nigri extractio. Cap. II.

- R E C I P E rad. Ellebori nigri recent. libras iiij. lauentur , dum sunt succo prædictæ : deinde incide minutim , ac superfunde sequentis decoctionis colaturam.
- * Succo Buglossi , Borag. ana ꝑ ij. Succo deparentur , & colentur diligentissime , ut auri claritatem acquirant , & reponantur ad tempus conveniens.
 - * Deinde ꝛ. rad. Fœniculi , Cichoreæ , Asparagi , Petroselini , ana ꝑnc. iiij. Fruct. Iuiubarum , Sebesten ana ꝑ ij. Seminum Melonum , Cucumeris , Cucurbitæ , Citrulli , ana ꝑ ꝑ. decoquantur secundum artem in aquæ ꝑ xij. Colaturæ infunde prædictas

dictas l' iiii. succorum : deinde sine ebullire paululum ad ignem. Postea incisas & contusas radices Ellebori iniice, & coque lento igne paulatim, vsque dum radices emineant : deinde exprime rursum per filtrum. Colaturam coque ad Mellis crassitudinem, clementi igne, adhibita assidua cura, ne aduratur. Postea repone, & utere; faciendo periculum in dosi, a scrup. semisse, vsque ad scrup. vnum.

P. C. SCHOL.

Sebesten ana ℥ ij] Cum Gesneri editio ana
℥ ij. legat, ego ex industria (si pondere metien-
di sunt hi fructus) ex drachmis uncias feci,
& legendas esse puto. alioquin cuiusque uncia
una ad minus sumi debet. Cumque semina fri-
gida ponderibus carerent, ego cuiusque ℥ β.
adscripsi. Si cui verò hac non placuerint, illi,
ut suo more loca hæc restituant, permittitur.

Extractio Rhabarbari. Cap. III.

R H A B A R B. electi l' j. minutim inci-
datur, & grosso modo teratur : postea af-
funde succi depurati Boraginis, Buglossi, *
ana l' ij. maceretur per horas xxiiij. dein-
de coque ad lentissimum ignem, vsque-
quo extra emineat Rhabarbarum. Expri-
me postea fortiter, & expressam decoctio-
nem per lencum colatorium trans mitte &
expri-

376 VALERII CORD. DE ARTIF.
exprime, vt substantia in colatorio ma-
neat: colaturam coque ad mellis spissitu-
dinem, adiectis Zacchari vnciis ij. Qui-
dam in balneo Mariæ ad spissitudinem
coquunt, ne aduratur; quod melius est
quemadmodum etiam in duplici vase. Pur-
gando deglutiendum cum gutta olei Cin-
namomi, aut Anisi mixtum, & azymo in-
uolutum; faciendo in dosi periculum à
scrup. j. vsque ad scrup. ij. Quidam, quia
Rhabarbara per se non valdè purgant,
acuunt totam extractionem cum modico
Diacridii optimi: quod nihil nocet.

*De Extractione è Massis Cata-
potiorum. Cap. II II.*

CVM virtutem solutiuam ex massis pi-
lularum extrahaturus es, necesse est, vt prius
diligenter dispensata sit massa, sumpta
Aloë purissima, & aliis medicamentis ele-
ctis. Deinde recipe quamcumque volueris
massam, & concidas in minutas partes; ac
macera per octiduum in aqua pluuiali,
succorum Boraginis, Fœniculi ana q. s.
Coque deinde in vitreo duplici vase per
integrum diem: deinde exprime per la-
neum pannum mundissimum, qui nullos
pilos emittat; & iterum in balneo vel in
duplici vase ad iustam spissitudinem dili-
genter coquito, & forma pilulas minutas.
da

EXTRACTIONIBVS. 377

a scrup. ij. aut circiter vnum. Hoc modo extracta massa est purissima, tenera, & facile in manu liquefcit. Porro reliquorum purgantium medicamentorum vires similiter exprimi possunt. Sed animaduertendum, quod semper sint admiscenda in decoctione lenientes & lubrici succi, quales prædicti sunt: & melius multo est, vt omnia in duplici vase coquantur.

Aloë quomodo optimè lanetur.

Cap. v.

ALOEN optimam, fuluam, pellucidam, facile in manu liquefcentem, confringe in partes minutas, & pone in patinam vitream, mundam: & infunde de super sufficientem quantitatem aquæ pluuiæ: dissolue in duplici vase omnino, & permitte denuò refrigerari. postea aufer innatantes, si qui sunt, pilos; & sensim quod est liquidissimum ad spissitudinem in duplici vase coque. Quod verò in fundo vasis est crassiusculum, in alios vsus seruetur.

PARS SECVNDA.

De Distillatione Oleorum. Cap. i.

QVONIAM Aromata quædam, & omnium umbelliferarum herbarum semi-

semina ferè constant magna ex parte, calida, tenui & aëria substantia: ideo necesse est, ut aliquid de oleaginosa substantia habeant. Nam talem habet mixturam prope modum omne oleum. At cum oleum & pinguedo quæ in simplicibus medicamentis continentur, duplex sit, quædam monenda sunt. Naturæ periti, duplex inuenerunt oleum in simplicibus medicamentis: vnum terrestre, crassum & viscosum, & totaliter suo corpori, in quo est, commixtum: quale est oleum Nucum, Amygdalarum, Baccarum Lauri, Seminum Lini, Hyoscyami, Sinapi, Papaue-
ris & omnia similia, quæ in fructuum aut seminum nucleis continentur. Hæc autem omnia propter totalem cum substantia cui insunt commixtionem inseparabilia sunt, nec vlllo modo per distillationem elici possunt. quare vi exprimenda sunt è substantia. Alterum tenue, aëriumque est, & separabiliter suo corpori inhæret: & hoc est segregabile. Ascendit enim facile in distillatione, nec difficulter à suo, cui inest, corpore decedit. Tale autem est quod continetur in aromatibus, Carpobalsamo, Cardamomo, Piperi nigro, Cubebis, Cinnamomo, Garyophyllis, Macere, Nuce moschata, Ligno Aloës. Item quod continetur in seminibus umbelliferarum herbarum: quales sunt Ligusticum, Ange-

Angelica, Angelica minor, Libanotis ni-
 ra, Magistrantia, Pastinaca, Caros, Cy-
 minum, Ammi, quod appellant Amo-
 num: item Apium, Petroselinum, Gin-
 didium, Pimpinella, Anisum, Fœniculum,
 Anethum, &c. Eliciuntur autem hæc olea
 per distillationem in arena, ita vt tusa aro-
 mata aut semina iniiciantur in cucurbi-
 tam vitream luto intestam optimè: vna
 autem vice ad ℥ij. iniiciantur, & sint tri-
 pla secundum capacitatem cucurbitæ: in-
 fundatur deinde ad vj. lib. aquæ clarissi-
 mæ, ac misceto diligenter. Pone deinde
 cucurbitam in capellam aptam fornaci,
 & arena imple, & non attingat fundum,
 sed intersit arena. Cucurbitæ impone
 alembicum vitreum, cuius rostrum desi-
 nat in stanneam vel ferream fistulam, stan-
 no intus & foris illitam: ea fistula tranf-
 eat in obliquum per vas quod habet in
 se aquam frigidam, vt inter distillandum
 egrediens cum oleo liquor refrigeretur.
 claudite iuncturas accuratè, madefacta pa-
 pyro vel linteo; & suppone exceptorium.
 Postea accende ignem lentum, & vide ne
 nimium surgat & ebulliat in alembicum,
 quod in cucurbita continetur. Semina
 enim quædam (vt Anisum) propter rari-
 tatem substantiæ suæ, simulque viscosum
 quod habent, largiter ebulliunt; ideo non
 statim alembicum imponere debemus: sed
 postea

380 VALERII CORDI DE ARTIF.
postea quàm bullas excitari videris, & va-
porem sursum ferri. Quod cùm fiet, de-
pone alembicum, & immisso bacillo agi-
ta; ita resoluetur in vaporem spuma, quæ
postea mediocri igne moderari, compesci
& excitari potest. Quo facto, impone rur-
sus alembicum, & circum lutato satis, ac
distillato sine cessatione, donec coniece-
ris nullum ampliùs intùs cōtineri oleum:
quod visu & gustu statim percipies: nam
cùm gustu distillantes guttæ non ampliùs
resipient iniecti aromatis saporem, desi-
stendum est, ne aroma fundo cucurbitæ
inhæreat & exuratur. Deinde segrega con-
tētum in distillata aqua oleum optimum,
quo potes artificio. Porro notandum est,
quædam ex his oleis aquæ innatare, quæ-
dam fundum petere. Innatant Piperis
nigri, & recentis Cardamomi, & Anisi:
Fundum petunt, Cinnamomi, Macis, &
Garyophyllorum, &c. vt videtur. Aqua
Cinnamomi & Anisi cùm distillantur, la-
cteum habent colorem: & lacteum hoc
paulatim in oleum conuertitur. Reseruan-
da autem Cinnamomi est aqua, præsertim
quæ primò exierit.

Natura & vires Oleorum.

Cap. II.

FOENICULI & Anisi olea, naturam
mira-

mirabilem habent : nam in hieme vitrum-
 ne concrefcit inftar butyri , ita vt afpectu
 nitentur fperma Ceti ; præfertim Anifi.
 Nam hoc æftate media concrefcit afpectu
 iueum : reliqua omnia liquida perma-
 nent. Reponuntur optimè in loco frigido
 puro, præfertim Cardamomi & Piperis.
 a enim omnium tenuiffimam fubftan-
 tiam habent, aded vt neglecta omnino
 uaneſcant. Vires autem habent earum
 erum, è quibus extracta ſunt ; ſed multò
 efficaciores. Nam efficacia quæ vni libræ
 neſt, in paucas drachmas contrahitur. Ga-
 yophylli enim vnciæ xvj. contrahuntur
 in vnciam vnam ſemis , aut duas : Cin-
 namomi in drachmas duas ſemis , aut
 duas : Piperis, in drachmas duas & ſemis,
 aut tres. Miſcentur autem in confectione
 guttæ x, vel xv, aut xx. libræ Succari pro
 delicatis : ſed infundendum eſt vltimò
 cum morſellis , quos facis , vel orbiculis,
 optimè miſcendo.

PARS TERTIA.

De Oleo Vitrioli faciendo. Cap. i.

OLEUM Vitrioli, quod à quibuſdam
 Oleum Vitæ appellatur, aut Melan-
 cholia artificialis, nihil aliud eſt,
 quàm

quàm aluminosa qualitas, & substantia
 ex Vitriolo per artem extracta, modico quoque
 Sulfuri mixta. Nam ipsum Vitriolum,
 quo fit, triplici constat mixtura, videlicet
 multo Alumine, modica Æruginè, & pau-
 co Sulphure. Aluminosa enim aqua in me-
 tallis per Æris venas & Marchasitam di-
 stillans, æruginosam qualitatem acquirit,
 & Sulphuri, (quod Marchasita inest) mix-
 ta, paulatim concrefcit, aut industria ad
 spissitudinem coquitur: in distillando au-
 tem aluminosus & sulphureus vapor tan-
 tùm affcendunt, æruginosa qualitate in
 fundo retortæ relicta, quo fit, vt hoc
 oleum Aluminis, & non Æruginis sapo-
 rem habeat. Est autem duplex hoc oleum,
 nempe austerum & dulce. Austerum du-
 plici constat mixtura, scilicet Alumine
 multo, & modico Sulphure: Dulce verò
 simpliciter Sulphure constat: Nihil enim
 aliud est, quàm liquidum Sulphur ex au-
 stero oleo extractum. Quapropter gustu
 nequaquam Alumen, sed Sulphur amu-
 latur. Faciendum est autem vtrumque
 maxima cura & diligentia; adhibitis aptis
 fornace, retorta, & receptaculo: siquidem
 aptitudo instrumentorum, vt aiunt Chy-
 mistæ, magistrum parit. Quapropter se-
 quentes Canones diligenter obseruen-
 tur.

Electio

Electio Vitrioli. Cap. II.

CUM plurimæ sint Vitrioli species, operæ pretium est indicare, quæ nam species eiu: huic operi potissimum conducat. Et quamuis omne Vitriolum hoc oleum reddat, nullum tamen est ex omnibus præstantius caeruleo aut viridi: quoniam plurimum fugitiui Sulphuris obtinet, quo adiuuatur, ut facilius oleum ascendant. Notandum etiam, melius esse facticio natium Vitriolum, & maximè Vngaricum: aut si huius copia non sit, Goslarie. Eligendum præterea est quod magnis racemis constet, & maioribus cubis concretum sit. Quod autem fractum, minutum & puluerulentum est, veluti inutile, non est recipiendum; quemadmodum etiam quod Solis vel aëris iniuriâ candorem & puluerulentam canitiem contraxit.

Coctio Vitrioli. Cap. III.

AT quia Vitriolum multum in se habet aquei & excrementitii humoris, qui oleum diluit, & non nisi longo tempore & magnis molestiis per distillationem ab oleo separari potest; compendiariorum est inuenta via, qua breui temporis intervallo id absumi queat, ne longa mora artifici fasti-


fastidium pariat. Recipe igitur prædicti Vitrioli P xij. conice eas in ollam magnam, nouam & optimè crematam: ollam impone fornaci profundæ, supra ardentes prunas. Cùm liquefieri & bullire cœperit spatula agitetur, vt integrum liquefacto misceatur, donec & ipsum liquefiat. Bullire demum finito, vsquequo nullam prorsus bullam ampliùs excitet, & donec totum densetur. Deinde exemptam è fornace, cum Vitriolo ollam refrigerari permittito, loco neque humido neque ventoso, sed sicco & tepido. Postquam refrigeratum fuerit, ex olla eximito, & considera an superficies eius vndique rubescat: nam si rubescit, bonum est signum, & faciliùs calcinatur, vt iam dicemus.

Calcinatio Vitrioli. Cap. IIII.

EXEMPTVM ollâ Vitriolum, in minutas partes confringe, & in mortario subtilissimè tere: deinde tertiam aut quartam eius partem in nouam ac bene coctam ollam conice, ac rursus in profundam fornacem, sicut antè, dimitte, & aliquamdiu vrito, donec rufus fiat color. Mox ollam ab igni depone; & moue eam, vt videas notam, an satis calcinatum sit Vitriolum. Nam si in olla fluctuat argenti viui aut liquefacti plumbi modo, & exi.

exilientes bullas eiacularur, satis vstum
 se intellige: tunc effunde in magnam &
 ecētem ollam, prius calefactam; & effluet
 quasi sit liquidum, aut ad modum argenti
 iui. Quod autem reliquum est Vitrioli,
 similiter sigillatim, vt calcinetur, vras.
 Cum vstum fuerit, commisce rursus opti-
 nē in mortario; modestē agitans, ne pul-
 verem excites, nares & fauces offensurum.
 Cum hæc omnia executus fueris, Vitrio-
 lum in bilancem ponito, & animaduerte
 pondus ipsius. Nam si vj. lib. id est, me-
 dietas superfuerit, bene omnia facta sunt.
 Sed hæc sufficiant.

De fornace facienda. Cap. v.



MATERIA quæ di-
 stillanda est, quomodo
 præparanda sit, iam in-
 dicauimus. Nunc au-
 tem dicere de fornace,
 res & ordo postulat.
 nam si hæc inepta fue-
 rit, frustra omnia fient.
 Exstruenda igitur est
 fornax ex lateribus in
 planum positis, quo
 crassioribus parietibus
 ignis facilius & diutius
 contineatur: fiet etiam
 quadrata & æqualiter
 R crassa;

crassa; intusque habeat propemodum duarum spithamarum latitudinem, non tamen omnino, sed dempra tertia parte spithamæ. Exstruatur autem hoc modo: Prima & infima cavitās habeat altitudinem semipedis: cui per transversum imponantur ferramenta satis crassa, ut ignitis carbonibus non inflectantur: secunda cavitās, quæ est constituta supra ferream cratem [id est, *uber den rost*] habeat duum pedum altitudinem, & ex anteriori parte foramen, per quod carbonēs iniiciantur. hoc incipiat lateris transversæ crassitudine super cratem. Per mediam deinde cavitatem, in ipso medio inspicienti fornacem, per transversum infigatur ferreus axis, quadrangularis, crassitudine pollicis, qui impositam retortam sustineat. In latere deinde sinistro fornacis, relinquatur meatus, per quem retortę collum exeratur.

Distillatio Vitrioli. Cap. VI.

POSTQUAM fornacem exstruxeris, eligito retortam capacem, aptamque ante omnia, ex vitro Venetiano aut saltem Helliaco factam, prius vndique luto obductam: in eam coniecito totum Vitriolum, ita ut aliqua pars retortæ relinquatur vacua, quò facilius à Vitriolo spiritus ascendere queant. Mox transversam & ferream
trabem

retortam in fornace optimè luto obducito;
 et in medio superposito perlutatum
 ita fragmentum: super id collocabis re-
 tortam, ne à candente ferro immediatè
 sceleretur, ita tamen, vt in medio forna-
 ce retorta constituta sit, eiusque rostrum
 rorsum modicè pronum promineat, &
 oratus per quem collum suum è fornace
 ferit, diligentissimè luto farciatur atque
 obstruatur. Postea accipe quinque regulas,
 et fac ex iis tectum supra fornacem; sub
 quo lateat retorta ad eum modum quem
 pinxi. Tectum luto vndique obducatur,
 quatuor pro fumo foraminibus relictis, in
 singulis angulis singulo, ea amplitudine,
 crassissimus pollex liberè intromitti &
 exiri queat. Fac etiam quatuor conos ex
 luto, quibus foramina obstruantur: quo
 facto, applica retortæ orificio receptacu-
 lum grande ex vitro Venetiano aut Hef-
 senico: quo enim maius id ipsum fuerit, eo
 uberius spiritus recipiet: si verò paruum
 fuerit, periculum est ne spirituum copia
 stentum rumpatur. Infunde etiam in re-
 tortam aquæ clarissimæ vnc. xvij. aqua
 enim citò spiritus ad se rapit, & prohi-
 bet ne confringatur receptaculum. Ita ap-
 plicatum optimo luto diligentissimè ob-
 struatur: magna adhibita cura, ne quic-
 quam in receptaculum incidat; tingitur
 enim inde in rufum colorem oleum. Cum
 R 2 omnia

omnia hæc feceris, dimitte per integram
noctem lutum exsiccare; ac si quæ fariscun-
rimæ, luto illinantur. Manè deinde per lu-
cidum accende ignem, ex puris & magni
carbonibus; aperto vno superiùs foramine
per quod fumus exeat: augeaturque suc-
cessiuè ignis vsque ad vesperam; quo tem-
pore aperiendum est secundum foramen
& attende diligenter an appareant spiri-
tus, qui è retorta egrediuntur, veluti
quis candidum efflaret fumum. Nocte se-
quente vigili cura cauendum ne ignis re-
missior fiat, sed acrior, paulatim tamen.
Ita deinde auctum ignem in vigore te-
neas: Ac altera die tertium aperi foramen
augēdo sigillatim ignem, vsquequo etiam
retortæ collum candescat. Sequenti secun-
da nocte auge ignem; & post mediam no-
ctem aperi quartum foramen. Cùm ita in
summo vigore ignis fuerit constitutus, vi-
debis spiritus egredi, veluti conglomerata
nubes: qui cùm cessare voluerint, ape-
ri omnes fornacis aditus, & sine intermis-
sione carbonesingere, vsquequo etiam
receptaculum excandescat; studiosè ca-
uendo ne quicquam frigidum aut humi-
dum super retortam aut receptaculum in-
curia aut casu decadat. Agenda hæc sunt
in loco clauso, quò neque imber, neque
ventus ingrediatur. Conseruandus au-
tem ignis est, donec nulli prorsus spiri-
tus it

is in Vitriolo relinquantur: quod visu
 acilè percipi potest. Cùm autem nulli
 ampliùs egredientur, sine vt per se extin-
 uatur ignis: ac totum opus integrum
 um nocte diem quiescere ac refrigerari
 nito. Postea aufer cum contento humo-
 e receptaculum; & repone, donec oleum
 b aqua segregabis. Tum confractam re-
 ortam inspicere, & vide an caput mortuum
 igrum sit: hoc enim signum est perfecti
 operis. Est autem caput mortuum, exustum
 in retorta Vitriolum.

Segregatio infusa aquæ.
Cap. VII.

QVONIAM in receptaculo contine-
 ur vnà cum Vitrioli oleo aqua, segregan-
 la hæc est, vt Vitrioli liquor sincerus re-
 ponatur: segregatur autem per distillatio-
 nem in balneo aut cinere subtili; tutiùs ta-
 men in balneo: qua propter totum humo-
 em qui est in receptaculo, in cucurbitam
 itream Venetianam aut Hessianam infun-
 de; (superponendo Alembicum è simili vi-
 tro factum;) quæ bene luto circumlina-
 tur: sub balneo deinde accenso igne, pau-
 atim sine aquam exstillare, donec habeas
 nc. xvij. illas quas infudisti. Si Vitrio-
 um non bene calcinatum fuerit, plus
 egredietur: quare vide vt prædictæ xvij

R 3 vnciæ

390 VAL. CORDI DE ARTIF.
vnciæ sint bonæ mensuræ. Cùm hoc feceris, refrigerari balneum finito, & aquam quæ distillauit abiicito. Quòd verò in balneo cucurbitæ in fundo reliquum fuerit, purum est Vitrioli oleum: habet tamen plerumque rufum colorem; ideo secundum sequentem modum rectificandum est, vt clarum fiat.

Rectificatio olei Vitrioli. Cap. VIII.

ACCIPERE retortam Venetianam, aut saltem Hessianam, antea luto optimo vestitam: in eam funde quod in cucurbita continetur oleum: retortam pone in minore fornacem, in capellam quæ pura & lota arena repleatur. Et quemadmodum antea in balneo, ita nunc in arena distilla paulatim ignem acuendo, vt sigillatim ex interuallo delabantur guttæ. Retortæ orificio applica receptaculum ex eodem vitro factum; ac commissuram optimo luto claudere, ne quicquam exspiret: cùm deinde totum è retorta distillauerit, refrigerari finito: ac postea aufer, & infundere sensim in purum vitrum Venetianum quod habeat angustum orificium; ac repone, ceu præsens in multis morbis remedium. Hoc est austerum Vitrioli oleum cuius vires & naturam nunc indicabimus quas excellentes & efficaces habet.

Vires

Vires eius. Cap. IX.

M E R V M ac non dilutum, neque debet neque potest intra corpus sumi: nam propter nimiam acrimoniam, ignis modo interaneus, & quicquid attingit, adurit: omnia nempe corrodit, præter vitrum & pinam, quia, veluti ceram, picem, seuum: & liquidorum etiam oleorum colorem immutat; præsertim olei Macis; cui si miscetur, sanguineum reddit colorem. Si etiam in duobus vasculis contineatur quantumvis frigidum, & repente sibi ipsi miscetur, aded incalescit sua sponte, ut manus vix teneri queat. In terram effusum bullit, quemadmodum etiam pura melancholia: quare etiam Melancholia artificialis appellatur. Quemadmodum enim melancholia, ita etiam hoc oleum ventriculum confortat, & ad cibi appetentiam inuitat ac stimulat; frigidum ventriculum calefacit, phlegma consumit; crassos & viscosos humores incidit, colicæ ac dysentericæ opitulatur, sitim ac feruorem interaneorum in febribus extinguunt: singultum prohibet confestim, & nauuscam ac cibi abominationem auertit. Sed temperandum est cum aliis quibusdam. Quare exemplum vnum atque alterum ponemus.

R 4

Aduer.

Aduersus Calculum.

℞. Olei Macis
 Olei Terebinthinæ clariss. ana guttas xij.
 Aquarum Anisi
 Fœniculi ana vnc. ij.
 Syr. Liquiritiæ vnc. j.
 Olei Vitrioli tres aut quatuor guttas.

Misce omnia optimè ; & gusta : si habet acetosiratem, quæ dentes non in stuporem trahat, bene est ; sinon est acetosa potio, instilla adhuc vnā aut alterā guttam, & consule palatum, ac propina securè.

Ad Ventrículum debilem.

℞. Syr. de Mentha vnc. j.
 Aquæ Cinnamomi vnc. iiij.
 Olei Cinnamomi guttas ij.
 Olei Vitrioli guttas iiij.
 Da securè.

Ad calorem & sitim in febris.

℞. Syr. ex Succo aut infusione Violarum
 vnc. j.
 Aquarum Cinnamomi vnc. j.
 Hordei vnc. iiij.
 Olei Vitrioli guttas iiij. aut iiij.

Misce,

Misce, & contrahet puniceum colorem,
& saporem vini austeri Cinnamomo aro-
matifati.

Ex austero quomodo dulce fiat.

Cap. x.

ANTEA dictum est, Austerum Vitrioli
oleum duplici constare mixtura, videli-
cet multo Alumine, & paucio Sulfure.
Quare cum ex austero oleo dulce extrahi-
tur, nihil aliud fit quàm quòd Sulfur ab
Alumine segregetur. Est itaque dulce Vi-
trioli oleum nihil aliud, quàm oleum Sul-
furis aut ipsum Sulfur in liquidam sub-
stantiam redactum. Et hoc propriè oleum
dici potest: est enim pingue vinctuosum-
que, quemadmodum ipsum Sulfur, quod
in oleo, & non in aqua liquefcit. Sequi-
tur autem modus segregationis,

Modus segregationis.

Cap. xi.

RECIPERE vini ardentis acerrimi & ter-
sublimati vnc. vi. Olei Vitrioli austeri
tatumdem: misce in Veneto vitro, & pone
in cucurbitam parvam, angusto orificio;
& optimè luto orificium claude: dimitte
ita per integrum mensem aut duos. Dein-
de effunde in cucurbitam cui sit immedia-

R s

tè vi

te vi ignis agglutinatum & annexum
 alembicum, [hoc est, ein kolb mit einen an-
 gesetzb neltzen helm,] cuius figuram subi-
 ciemus: pone deinde in paruam fornacem,
 ac dimidiam partem eius cinere obrue:
 postea applica recipientem, & luto iun-
 cturam claude diligenter, & extrahe vnc.
 vj. vini ardentis, quas infudisti. Ut verò
 tutius hoc fiat, pone in balneum Mariæ,
 sic solum vinum absque oleo ascendet.
 Cùm extraxeris autem per balneum infu-
 sas sex vnc. vini ardentis, pone id quod
 residuum est, in fornacem, ut arena me-
 diam cucurbitæ partem attingat, ac nono
 & vacuo recipiente (eoque non magno)
 applicato, luto iuncturam diligenter clau-
 de. Accende deinde lentum ignem, & sen-
 sim extrahe omnem humiditatem quæ re-
 licta est in cucurbita, donec nihil humidi
 amplius in fundo appareat: adhibita sem-
 per maxima cura & diligentia, ut ignem
 ita modereris, ne ebulliat usque ad alem-
 bici canalem. Nam si hunc ebullitio atti-
 gerit, sedari non potest; nec prohiberi,
 quin in receptaculum egrediatur, ac to-
 lum oleum corrumpat; solet enim facilli-
 mē ebullire. Cùm autem sensim extraxeris,
 aufer statim recipientem cum suo humo-
 re: tum videbis duo contineri in eo, vi-
 delicet aqueum humorem, & oleosum, ac
 pinguem. Segregabis autem vnum ab al-
 tero

ero statim, ita vt nihil aqueum in oleo re-
linquatur: nam aqua illa perdit oleum.
Vollet autē oleum ipsum plerumque aquæ



innatare; maxi-
mè si infusum
priùs vinum om-
nino per balneū
extractum fue-
rit: sed statim
poteris tactu
discernere oleum
ab aqua. Oleum
enim pingue est,
aqua minimè.
Segregatū oleū
deinde vsui re-
ferua.

*Einen Kolb mit einem angeschmeltzen helm,
der musz man etlich auff der Glaschurten
bestellen zu machen, aus zerbrochnem Vene-
dischem glasz, oder auß Hessischem glasz.*

Vires eius quod segregatum est.

Cap. XII.

VIREs habet quascumque & Sulfur:
sed omnia efficacius præstat; quia propter
liquiditatem faciliùs penetrat, & ad actio-
nes properat; quod Sulfur non potest,
quia impeditur a soliditate & spissitudi-
ne sua, quo minùs penetret. Illud verò

R 6 ampliùs

amplius potest Sulfure hoc oleum, quòd
 valeat potenter ad omnes in corpore pu-
 trefactiones, & præcipuè ad pestem. Ad
 * educendum è pulmone in pleuritide, &
 peripneumonia, & difficili tussi, pus, &
 crassos viscososque humores: tuto enim
 absque omni periculo intra corpus su-
 mitur. Calculum neque in renibus, neque
 vesica coalescere finit: exulceratam vesi-
 cam sanat. Dosis eius est vna aut altera
 guttula, aut tres, in vino modico tempe-
 ratæ. Miscetur etiam rotulis & morsellis
 è saccharo factis. Diligenter autem reser-
 uandum est. Nam modicum fit ex lib. j.
 austeri olei Vitrioli, & facillè propter te-
 nuitatem partium euanescit.

F I N I S.

E P I.

EPITAPHIUM
 VALERII CORDI,

qui
 sepultus est Romæ, in æde D. Mariæ
 de Anima, regione Parionis.

VALERIO Cordo Simesusio Hes-
 o, Euricii filio, moribus, ingenio,
 comitate præstantiss. Doctorum omnium
 admirationem merito: Qui natura ob-
 scuritatem & herbarum vires adoles-
 cens senibus explicavit: Cum expleri
 cognoscendi cupiditate non posset, per-
 lustrata Germania, Italiam adiit, Ve-
 netiis in honore habitus, & Romam
 vix ingressus, subito morbo inter ami-
 corum lachrymas, non recuperabili stu-
 diorum iactura, opt. atate extinguatur,
 anno salut. M. D. XLIIII. VII.
 Calend. Octobr.

Ingenio superest Cordus, mens ipsa recepta est
 Celo: quod terra est, maxima Roma tenet.

APPEN-

APPENDIX
EX SCRIPTIS
D. IACOBI SILVII,
MEDICI PARISIENSIS,
pro instructione Pharmacopolarum;

DE
SINGVLORVM MEDICAMENTORVM
SIMPLICIVM

exacto Delectu , Collectionis tempore legitimo , Repositione commoda , & Duratione eorum.

DE RADICIBVS.

RADICES euellende sunt , cùm medicamentoſa ſunt maximè. Quæ dos omnibus eodem non ineſt tempore , ſed alio alia vegeta magis ſunt : quamquam ſunt qui putent omnes radices legendas Autumno , ubi folia deciderunt : alii Veris initio , priuſquàm in folia aut caulem erumpant. Omnes tamen integra ſunt , ſi fieri poteſt , vellende , & vnaquæque in ſolo & calo natura ipſius maximè familiari , bene nutrita , bene habita , non præ alimentis copia enormes , neque ob inopiam ſtrigosa , tennes , rugosa : mox aqua lauanda , & radiculis per-

portionem quamdam alimenti repetentibus, & colomibus etiam dum trahentibus, purgande: ost (nisi uiendi recentibus aliqua inceserit vel inmoditas vel necessitas) siccande, quedam umbra & vento, ut Apii, Fœniculi, Iridis, & uae alia sunt vel minores, vel sicciores, vel rariiores, quarum vires sol seu ignis promptè dissipet: quedam contraria dictis sole & vento, vel igni siccantur, si celum est nubilum, aut hiems: & sapè versanda, ne mucida aut putrida fiant: ut Bryonie, Gentiana, Mandragora, Rhei Pontici. Si virò siccatis citò est opus, patelle ignita impositas sapè versando siccabis. Quedam item integra siccantur, ut Gentiane; alia in talcolas dissecte, ut Iridis; alia ligrosa matrice (sic enim cor Plantarū Gaza ex Theophrasto vocat) adempta, ut Fœniculi, Petroselini, Apii. Deinde reponuntur loco non insolato, non infumato, non humido, non puluerulento, sed sublimi, puro, sicco, aut septentrionem, aut potius meridiem spectante, praesertim quando hunc plantae quedam adhuc humidiores requirunt, modo non sunt austri. Eadem quamdiu vegeta adhuc sunt, seruanda; paruae scilicet ac tenues & rare, ut Asari, Asparagi, anno tantum, quamuis Elleborus uterque etiam triennio seruari possit, ut magna & crassa essentia praedita, Bryonia, Rheon Ponticum, Aristolochia, Gentiana. Hac autem tria, colligendi tempus legitimum, repositio commoda, & duratio, non in radicibus solis obseruanda sunt,

sunt, sed etiam in aliis plantarum partibus, atque adeò quibusdam animalium aliquorum partibus, ut sanguine hircino, hepate lupi, pulmone vulpis, vesica apri. Propterea Chamepitum, Chamadrym, Thlaspi, Cētaurium, Polion, Hypericum, aliāque florentia capiebat Galenus, Theriacem vel aliud medicamentum compositurus, non solo aestivo siccata, neque dum fructus eorum adhuc crudi & imperfecti sunt. Iubet idem continua speculatione cognoscendum, quando fructus sunt futuri, quando aduntur, quando augentur, quando denique vigent. Quo tempore porissimum eos commodè decerpas, & in succis domunculis repositas custodias, ne à solis radiis urantur, neque humiditate à tecto vel muris madesiant. Ob id domo non vult subterranea eos reponi, nec alius vicina, neque sub tegulis, sed horum media, qua ostia meridiem spectantia habeat; prope qua tamen medicamenta ut reponas. Omnia igitur legenda, quando summam sunt virium; & accusandi tum mercatores tum herbarii, qui radices, liquores, succos, flores, germina, fructus extra anni tēpus carpunt, & in urbes conferunt. In quibusdam & astrorum observatio valere putatur. Peonia enim radix ad epilepsiam legēda decrescente Luna quibusdam videtur, & Alysson sub astu Canicula vult legi Galenus, ut Æschriox caneros fluiatiles capi cōtra rabiem, unde est herba nomen, Ἀλυσος, tanquam vis quadam illis contra rabiem à sidere accedat, rabiem

rabiam canibus afferente. Plantas item calidas ex calidis regionibus, & ex harum editis & siccis locis, ut Creta montibus, praefert Galenus.

DE HERBIS.

QUAE prius in Radicibus dicta sunt, de collectione, repositione, duratione illarum, ad Herbas etiam transferri possunt, nisi quod his ferè recentibus utimur, quibusdam omnino, ut Portulaca, Lactuca, Buglossa, Airiplice, Beta, Brassica, Acantho, Nasturrio, Helxine, Mercuriali, Viola nigra, Intubo, Fumaria, Hyoscyamo, Mandragora, & aliis per multis. Quibusdam verò recentibus utimur, quando his mitioribus opus est: ut Ruta, Mentha, Absinthium, Abrotonum, recentes minùs calent, ob mistam humiditatem excrementosam; siccata verò calidiores sentiuntur; & Fumaria recens minùs aluum subducit, magis sicca.

Colliguntur ferè cùm floribus Herbae, aut seminibus: sic Benedictus Carduus, Acanthium putatius, Centaurium paruum, Calaminthe, Chamadrys, Chamepitys, Daucus, Fumaria, Meiorana, Polium, Pulegium, Origanum, Serpyllum, Thymus: aut saltem cùm vigent folia magnitudine, odore, colore, praesertim qua cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbra magis, nisi si qua scapo sunt crassiore, aut folio humidior, & ob id apto
putre-

putrere. Vbi probè sunt siccata, reponuntur vii
radices: sed minùs diu seruari possunt; ob id
quotannis mutanda.

DE FLORIBVS.

Flores, ut plantarum partes reliqua, legan-
tur cum maximè vigent, ut Capparis in
gemma, Rosa expandi cœpta: reliqui ferè
aperiti; sed haud ita pridè, & ex quibus vi non-
dum exhalauit. Siccantur sole magis, minùs, pro
varia ipsorum natura. Quidam siccandos vo-
lunt, donec ex ponderibus decem unicum supersit.
Reponantur, [ut alia: Quotannis mutantur,
quauis Schoenanthos etiam decennium efficax
seruari possit: Chamamelum item diu vegetum
est, ob fortem partium suarum mistionem.

Flores & omnia que iucundum odorem ef-
flunt, arculis ciliaceis nullo situ obductis repo-
nuntur.

DE SEMINIBVS.

Legenda sunt Semina cum sunt matura, &
fructus quibus includantur, maturi. Ma-
turi autem sunt, cum simile possint pro-
creare, ut Aristoteles libro de Affectibus mi-
storum docet. Semina verò quotannis mutare
prestiterit, etiamsi pleraque diutiùs seruari
possint.

Ut rectè pereant, charta aut foliis aptè in-
uoluantur.

DE FRV-

DE FRUCTIBVS.

Fructus ut maturi decerpantur necesse est.

DE CORTICIBVS.

Cortices ut recondantur, eximere conuenit, cum herba suis foliis exsuntur. siccantur etiam expurgata inibi, locis asperginem non redolentibus. Sed cum luto aut puluere sunt obfusa, aqua elui debent.

DE SVCCIS.

Xυδος, id est, Succus ex plantis totis vel plantarum partibus concisis & tuis, torculari vel manu, vel aliter expressus, aqua interdum aspersa aut vino, aut liquore alio, vel recens usurpatur, vel vase aut loculamento aliquo reponitur: hicq; vel liquidus, vel siccus. Liquidus item aut per se seruatur, ut Vinum, Acetum: aut misto sale, ut Omphacium, Oleum: aut superfuso phiala oleo, ut Succus Rosarum, Granatorum, Limonum, Cydoniorum, Sambuci, Ebuli, & similitum: aut sole, vetustateve, aut igni per se siccatur, ut Succus Glycyrrhizæ, Opos Cyrenaicus, Scammonium: aut coctione cum melle, vel saccharo ad iustam crassitiem facta sole vel igni, ut in plurimis syrupis audies. Qui verò succi sine melle aut saccharo reponantur, plurimum corrumpuntur, nisi

nisi igne diutius cocti, aut sole aſſiſſo uſque ad mediocrem craſſitiem ſiccari fuerint. Iidem temporis ſpatio ſicciores euadunt, pluribuſq; annis ſeruati, eò ſiccitatis veniunt, ut Balaſticis ſimiliter leuigari poſſint: quales ſunt ſuccus Hypociſthidis, Vſa acerba, Glycyrrhiſa, Centaurii, & alii propè omnes. Qui verò ex his lentoreto quendam naturam habent, dilatantur magis quàm leuigentur, niſi ſiccioribus multis miſta horum parua portio. Portulaca, Semperuiui, Cotyledonis, & Galiarum ſimiliter glutinoſarum ſuccus, præ lentore nimio per ſe non poteſt exprimi: quare cum Omphacio probè trita herba exprimitur: alii tritas igni lento calefaciunt; alii tritas loco frigido, ut cella vinaria, vimineo vaſi impoſitas in caſinum ſubiectum deſtillare permittunt. Χολός etiam, id eſt, ſuccus, ſæpe cum humore aliquo extractus ex partibus plantarum, ut ſemine Pſyllii, Cydoniorum, Lini, Fœnugraci, lentorem aut velut cremorem & mucorem ſignificat: unde dictum eſt emplaſtrum διὰ χολών, id eſt, de glutinoſis quibuſdam ſuccis; diuerſum tamen ab eo quod eſt de mucilaginibus; ut in compoſitis leges.

Liquidis medicaminibus denſior materia argentea, vitrea aut cornea conuenit. Fiſtilis etiam, ſi modò rara non ſit, accommodatur, & lignea, præſertim è buxo: ſed anea vaſa oculariis medicamentis liquidisq; &c.

DE LA-

DE LACHRYMIS.

Δ'α'γουρ, id est, lachryma, seu humor ex planta sponte sua defluens, siue in gummi aqua res concreseat, siue in resinam liqueseat oleagina eius substantia. Arborum partibus, praesertim truncis à germinatu incisis & scarificatis, etiam resinas eligimus. Accensis autem arboribus resinosis, ut Pinu, Picea, Larice, Terebintho, Teda, Cedro, ex resinosa substantia igni parum siccata fit Pix liquida: cui quod supernatat, Pissanthum tenui consistentia & facultate est adstringente; ob id canitiem sine ulla noxa tardat, ut Pisselaum, id est, Pix liquida, cum oleo mista. Galenus lib. 1. comp. ph. part. Pissasphaltus autem est Mumia Serapionis. Si Pix iterum coctione siccetur, Palimpissa dicitur, sicca ad eò ut puluerisari possit, qualis est Graeca, etiam Colophonia, & Hispana, & Gallica dicta. Πίσσα Βερτιά, lib. 8. comp. pharm. part. & Dioscoridi probatur & Lycia. Est etiam Dioscoridi ex iisdem arboribus resina liquida & sicca. Resina omnis calefacta, siccatur: tenuium est paruum, magis minus.

DE ANIMALIBVS,
ET EORVM PARTIBVS.

Sanguinis Hirci quadrimi, bene habiti, aliquamdiu nutritiuo albo, Foeniculo, Seseli, Laure

Lauro, & ceteris calculum frangentibus, Augusto mense iugulati, medius effluens (nam primus tenuior, postremus crassior putatur) vase vitreo receptus, tectus linteo raro, Sole siccatus, etiam cum Myrrha, foliis Lauri, & similibus, calculum potenter frangere dicitur, Tralliano, Auicenna & ceteris practico.

Adipem & Medullam stanneis vasis recondi conuenit.

Medulla loco sicco & edito, & Septentrionem spectanti reponitur, cum foliis Lauri siccis, ne putrescant, aut situm ducant; qua iniuria in locis humidis Meridiem spectantibus eis accidit: sunt qui reponant bifariam, Adipum modo.

A D V L T E R I A S I M P L I C I V M M E D I C A M E N T O R V M.

A Cacia succo & carae Prunorum agrestium representatur, dolo parum malo, cum utraque viribus conueniant.

Aloës crassæ partes & impure, lotioni separate, aqua marina & Croco Mesue adulterantur: sed Crecci odor dolum aperit. Alii Acacia, alii Gummi immiscendo adulterant: tunc minus est ad minima friabilis; & odor & sapor est alius.

Ambra,

Ambra, pulvere *Ligni Aloës*, *Syracis*, *Ladani*, *Ambra largioris*; *Moscho* in aqua *Rosarum* soluto. Sed hac manuum attritu multo, cæcra, mollescit; vera non mollescit. *Platanius*.

Amomum, planta *Amomide* simili, sed inodora, ex *Armenia* delata. *Seminis* dissimilitudo vitium detegit.

Asphaltum, id est, *Bitumen Pice* mistum, *Dioscoridi*; licet adulterari non posse, ut neque *Carpobalsamum*, neque *Xylobalsamum*, scribat *Gal. lib. 1. Antid.*

Ærugo multis modis adulteratur *Dioscoridi*: sed hodie sincerior videtur. Si adulteratam suspiceris, notas ex eo repere.

Æris flos, limata *aris scobe*.

Bdellium adulteratur *Gummi*. sed ita vitiatum, minus est amarum, & suffusus odoratum: *Dioscorid.*

Balsamum, id est, *Opobalsamum*, vitiatum *Terebinthina* paucis *Opobalsamo* mista, vel sine hoc *Croco Orientali*, & succo foliorum *Citri*, vel oleo *Nardino*. De quo in *Opobalsamo* plura leges.

Bitumen adulteratur *Pice*, ut in *Asphalto* dixi.

Castorium variè adulteratur. Vitium autem facile deprehendes, attentus notis quas in vero & laudatiore *Castorio* diximus in partibus animalis medicamentosis.

Costus, radice pradura *Helenii Comagenii*:
sed

sed odor Helenii minùs vehemens, neque cap-
tentans; & sapor minùs acer, quàm Costi.

Crocus misto Crocomagmate tuso, flore Cnic-
vel oleo & pulvere Bersilii, ut vocant: qui fr-
cande dolum delegit, vel sapo sublitu: & L-
thargyro, vel plumbagine, ad pondus augen-
dum. Verumque minùs odore vegetum est: pr-
terea hoc est puluerulentum. Adulterati quoque
Crocicolor & odor celeriter evanescunt, ve-
diu permanent. Galenus primo Antidot.

Cassia odorata, corticibus Capparis & radic-
Tamaricis mistis.

Caphura, gummi Juniperi: sed hoc est mini-
odorum, & durius; illa est friabilis, &
odore valentiore Platearius.

Garyophylli vestutate exanimati, vino pa-
nerem optimorum Garyophyllorum habente ir-
rigantur, siccantur: foris solùm Garyophyllo
olent, & vix ad dies decem: molliores sunt in
tegris.

Carpobalsamum adulterari semine Hyperici
simili, quod Petrà Palastine oppido afferunt
auctor est Dioscorides. Adulterari tamen no-
posse, affirmat Galenus 1. Antidot.

Euphorbium lacte hedino, Sarcocolla & Glu-
tini mistione conspurcatur. Experientia veri ej-
difficilis: nam Euphorbium leui gustu os diu ac-
cendit, ita ut omnia gustata Euphorbium resi-
piant. Idem iniectum igni odorem edit fastidien-
dum, Dioscor.

Ebur vstum (quod cur Spodium vocet vul-
gu

gus, non video) ossibus canis ustis, vel albo marmore ustis: id verò gravitate proditur: illud forma ossis, & linearum desiderio.

Galbanum mutatur Resina, Farina Fabarum excorticatarum, Hammoniaco, Dioscorid. ex cuius notis sincerum deprehendes.

Galanga acris Cypero Europeo insipido, vel falso; vel Bisforta, ut vocant, radice austera: si verò dicta radices aceto puluerem vera Galanga & Piperis habente biduo macerentur, foris solum Galangam referunt Platearius.

Ladanum, stercore Caprino, & pulvere nigro. Id autem tractando non mollescit, sed in puluerem abit, modo Ladani vetustate exsuccit. Viribus praterea & odore Ladani caret, quod sic vitiatum est.

Lasus omne antequam siccescat, adulteratur Sagapeno, aut Faba lomento: sed malefium deprehenditur colore, odore, sapore, dilutione, Diosc.

Lycium quibusdam Amurca, Succo Absinthii, Felle Tauri: sed id à viribus sinceri multum recessit.

Lemniam terram sic adulterant, ut nemo veram à falsa possit discernere: sic & Lycium Indicum, & plurima alia, ut verorum nota à falsorum notis non exactè discerni possint.

Ligustici semen adulteratur semine quodam simili; quod facile gustu discernitur, amarum enim est: alii semen Fœniculi aut Seseleos admiscantes, Ligusticum dolo viciant.

S Lentisci-

Lentiscina resina, id est, Mastiche, Turis &
Resina Pineae nucis mistura.

Moschus pelliculis incisis, puluere carnis Columbina siccata, sanguine Haidino, & pane ass.
Si eius certum pondus pelui madenti impositum aliquamdiu sit grauius, est legitimum; si prius fixum pondus seruat, supposititium.

Manna Arabum, Saccharo & Folliculis Senae.

Myrrha adulteratur gummi macerato in aqua, in qua Myrrha maduerit, Dioscorid.

Nardus adulteratur Stimmi, seu Stibio cum aqua aut palmeo vino inspissationis ponderis causa inspirato.

Nardus Celtica adulteratur imposita herba simili, quae Hirculus ab odoris grauitate vocatur: sed herba candidior, sine cauliculo, minoribus foliis; radice nec amara nec odorata uti vera Nardus est.

Opi omnes adulterantur addito Sagapeno antequam inarescente, colore: odore, sapore dolu deprehenditur; & quia cum aqua vel salina non mox soluuntur adulterata. Adulterantur etiam Furfure & Farina; praecipue καυλίας, id est, qui ex caule defluit, quia dilutior; ριζίας, verò, id est, qui ex radice, perlucidior & purior. Quauis enim radice incisa aut caule, quocumque effluit crassum & lentum, ὀπίς, id est, Liquor dicitur, lib. 6. simpl.

Opium, semine Lactuca agrestis.

Opopanax, Hammoniaco aut Cera: tunc in aqua,

qua, si digitis teratur, non soluitur, nec lactescit
ni sincerum. Diosc.

Os ex corde cervi cartilagineum, simili ex
riorum animalium [praesertim bouis] corde.
Opobalsamum tam variè adulterant & astu-
t, ut eius adulteria etiam exercitatissimos fal-
sant. Hac verò adulteria inuulganda non cen-
so, ne maligni etiam vitient à nobis edocti. Vi-
tiatur misto unguento terebinthino, lentisci-
o, cyprino, balanino, susino, metopio, melle,
vel Cypria cera liquida: sed maleficio facile
prehenditur. Nam verus liquor in vestem la-
neam fusus, maculam non facit, & post lotio-
nem notam non relinquit, cum vitiatum inha-
eat. Adhuc merus, lac, si instillatur, congu-
at, & in aqua aut lacte celerrimè liquatur, &
colore lactescit. Alias quasdam notas apud eun-
dem & Simeonem, si libet, legeris potius, quàm
apud barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, pro-
funda hominum ignorantia, & magno mor-
alium incommodo.

Piper longum fraudulenter preparatum, est
herba quadam flava, quæ à Xene affertur, aspe-
ctu quidem, non autem gustu, Macropiperi si-
milis: hæc autem aquâ irrigata soluitur; na-
tium Macropiper insolubile permanet, Gal.
lib. 1. Antidotorum. Piper longum verum ex
Barbaria affertur: adulteratum verò duplex
est; alterum, quod in Alexandria maximè con-
ficitur; alterum herba cuiusdam germen.
Quod fictitium est, si per diem totum in humo-

re maceretur, illicò liquatur ac soluitur, lib. .
 sanit. tuend. Illud fortè ex massa subacta aqua
 in qua dissolutum aut maceratum sit Piper, &
 in formas effictas coniecta, pòst siccata. Vi
 atiam adulteratum ex germine & velus nuc
 mento Betula & Coryli.

Pastilli Theriaci, ex radice Pentaphylli, id e
 Tormentilla, Venetiis malè componuntur, ne
 ex Viperarum carne. Hermolani in Coro
 Mafa.

Phu, radice Rusci admista viiatur: sed m
 lefcium facillè deprehenditur; quia hec dur
 est, frangi contumax, & sine ulla odoris gr
 tia.

Pompholyx, taurino Glutine, ouillo vel M
 rino pulmone, aut Grossis, vel quibusdam al
 crematis.

Pentapetalon, Pentaphyllon, Polium, nih
 simile habent in plantis; ob id non adultera
 tur.

Rha-Ponticum, radice Centaurii magn
 Rhabarbarum examinatur maceratum aqua
 diebus quinque, postea siccatum idem min
 in crocum tingit, intus nigricat, varietate
 in fracturis amisit; densius est, astringit mag
 ex aqua verò illa siccata trochisci fiunt regibu

Pñor cum viget ac integrum est, valent
 astringit, densum est ac contractum tota sui
 stantia; tamen celeriter perforatur. Incola
 gionis in qua gignitur, coctione vires eius
 aquam trahunt; deinde Rheum siccatum, tan
 qua

nam integrum sit, nec coctum, transmittunt: id id rarius est & laxius integro, nullam aut minimam adstrictionem retinens. Quantum illis notis Rheon à Rhabarbaro differat, alibi liximus.

Sagapenum, succo Laseric & Galbano, Diosc. à non liquefcit, sed verum vino vel aqua affusa statim dissoluitur, Galen. lib. 1. Antid.

Sarcocolla puluerizata est suspecta adulterii, Diosc. à quouis pulvere misto: integra eligatur.

Styrax modis multis Dioscoridi adulteratur: sed dolus facile deprehenditur notis ab eodictis.

Santala lignis aliis; Rubrum Bersilio inodoro; Flauum & Album ligno Cedrino odoratior, linguam calefaciente.

Scammonium lacte Tithymali & Sarcocolla, vel Eruiifarine. tunc linguam minùs valenter pungit & mordet.

Saccharum, insius faculentum aut spuma succi Canna eius auctum: tunc in ore vanescit, & fractum nigricat.

Turbish, Gummi dissoluto quibusdam radicibus extremis illito: verum autem si frangitur, gummosum est intùs.

Tamar-Indi Prunis adulterati non splendent, humidiores sunt; sapore & nucleo Prunorum multum à semine Tamar-Indorum diuerso.

Tus, Pini Resinâ, & Gummi. suffitum autem Gummi flammam non edit, Resina autem

in fumum vanescit; Turis statim ardet. Odo etiam maleficium proditur.

Turis cortex, Pini aut Nucis. Pinea cortice horum tamen index ignis: nam reliqui cortices suffusi, quamquam incenduntur, sine odore fumant; Turis verò cortex ardet, & odorem fumum edit.

Turis manna, adulteratur cribrata Pini Resina, aut polline aut cortice Turis confuso: si hac igne deprehenduntur.

Hac abundè fuerint, ei praesertim qui verum simplicium sincerorum notas, ex nostro libro simplicium primo accuratè didicerit. Nam cum rectum sui & obliqui sit index, ut initio secundo docuimus, & in unoquoque rerum generum quod perfectissimum est, idem sit simplex & unicum: id si cognoveris, alia ei congeneria, alia etiam arte affinia, nullo negotio secreveris.

SIMPLICIS ALICUIUS NOMINE ABSOLVTE SCRIPTO, QVID ACCIPIENDVM.

IAM tradamus Simplicis alicuius nominis scripto absolutè, & sine determinatione sexus, coloris, magnitudinis, figura, loci, temporis, vel notarum probitatis aliarum, vel partis eius simplicis, radicum, foliorum, florum, seminum, &c. quòdnam sit eligendum: nam

pr

pro variis scopis varia, sed in scopos efficaciora
coligimus: Quam in rem te iuuabit nostra Sim-
plicium per locos communes descriptio. Qua-
nim radicibus solis sunt efficaces planta, illa-
rum nomine radices veniunt: quæ foliis flori-
bus fructibus, seminibus, cortice, ligno, liquore,
succo, gummi, sunt utiles ac medicamen-
tose magis, dum planta nomen offertur,
partem eius usurpari solitam elige. Quum ve-
rò pluribus sui partibus ad res etiam varias
valeat, quibus sit opus, coniecta ex partium illa-
rum facultate & affectus natura, & medica-
menti constituendi forma: ut Ammi, Anisum,
Apium, Carum, Cnicus, Cuminum, Gith, Liby-
sticum, Nasturium, Psyllium, Sefeli, Staphis-
agria, semine sunt præstantiora; idæ, solum illa-
rum nomine intelligendum: in aliis multis si-
militer.

Anisum, Cretense, lib. 4. sanit. tuend.

Agnus, [seu Vitex] id est, flos eius aut se-
men, licet folia etiam sint utilia.

Agaricus, albus & femineus.

Aloë, id est, succus eius, Aloë Indica, lib. 9.
simplicium in Diphryge.

Alumen, scilicet scissile, quia præstantissimum,
lib. compos. pharm. gen. primo.

Acetum, ex vino, non hydromelite, vel cereui-
sia.

Aristolochia, pro repropoſita explicanda est:
rotunda enim cum multum tenuare crassum hu-
morem, tergere ulcera, digerere ex viro; longa

S 4 autem,

autem, cum mitiora hac volumus. Clematidis
autem, quia fragrantior, in unguentis expeti-
tur.

Amomum, Scythicum lib. 8. comp. pharm.
part.

Ammi, Illyricum, lib. 9. eiusdem; Ægyptium
alii laudant.

Balsamum, Opobalsamum potius intelligen-
dum, quàm Carpebalsamum aut Xylobalsa-
mum, lib. 2. comp. pharm. part.

Bryonia, alba, quia efficacior, quàm ni-
gra.

Buglossum utrumq, foliis & flore efficacius;
radice tamen non inutile.

Casia vel *Cassia* in libris Græcorum. *Cassia*
syrinx optima, & *Cinnamomo* viribus & toto
habitu similima. In libris Arabum eadem Li-
gnea dicitur: altera verò, *Fistula* his dicta, po-
nitur, cum medicamentum est purgatorium.

Cardamomum, maius.

Capparis, cortex radicis.

Centaurium, Minas, in purgantibus medi-
camentis; in ceteris Maius, dictum à facultate
multiplici & efficaciore.

Calaminthe, montana, quia efficacior quàm
domestica.

Costus, amarus, cum subamarus & valde
acer solum nominetur; dulcem tamen nescio
quem Arabes inuenerunt.

Cypressus, id est, nuces eius, in adstringenti-
bus medicamentis: lignum aut folia, in diureticis.

Cinna-

Cinnamomum, optimum; de quo in simplicibus abundè.

Corallium, rubrum.

Cuminum, *Æthiopicum*, lib. 4. sanit. tuend.

Daucus, agrestis; nam satius *Pastinaca* est, alimentum veriùs, quàm medicamentum.

Elleborus, niger *Mesua*, quia salubrior: albus *Galeno* *Aph.* 1. lib. 5. Obserua igitur an compositio sic *Arabica* aut *Græca*. *Elleborus* uterque & *Helenium* ex locis editis præstant.

Eruca, silvestris, quia efficacior hortensi.

Epithymum, *Atticum*, melancholiam ex ventriculo purgat: id in *Græcis* compositionibus usurpandum, in *Arabica* *Arabicum*.

Fœniculus, semen; sed in collyriis succus fo- liorum aut radicum.

Galla, solida efficacior, quàm perforata.

Gummi, *Arabicum*; id enim omnium per- fectissimum, vel *Plinio* auctore.

Gluten, *Mastiche*, ceteris *Glutinis* efficacius, ut vitrum etiam glutinet, quibusdam intelligi- tur: aliis *Ichthyocolle*: aliis *Taurocolla* magis placet *Glutinis* nomine.

Hyssopus, montanus hortensi melior, ut *Calaminthe* montana efficacior domestica. *Hyssopus* *Colicum* *Diosc.* *Cresicum* verò *Ar- chigenes*, apud *Galen.* lib. 8. comp. pharmac. part.

Hyoſcyamus, albus, seu album siue semen:

S. 5 quod.

quod tamen interdum exprimitur, frequentius
tacetur.

Iris, radix *Ireos* *Illyrica* veteribus, nunc
pharmacopolarum *ignavia* *Florentina* usurpa-
tur, cum illa per *Veneros* facile haberi queat.

Lupinus, amarus: nam dulcis esculentus est;
ut ille, amaritudine per macerationem in aqua
deposita.

Lactuca, semen; praterquam in victus ratio-
ne, ubi herba potius intelligitur.

Lapathum, *Oxylapathum* efficacius rotun-
do.

Lithargyros, *Auri*; tamen *Lithargyros*
Chrystitis aliquoties in lib. comp. pharm. Gal.
legitur.

Mastiche, *Chia*, lib. 7. meth. & alibi passim.
Aegyptiam tamen ac recentem, ob id pinguis-
simam laudat lib. 2. ad *Glaucan*.

Marrubium, album praestantius nigro.

Mel, apum: alterum, aëromeli seu mel aë-
rium & roscidum.

Margaritæ, solidae meliores perforatae; nisi
etiam sint flavae, obscurae, solidis pares.

Medulla, si non additur cuius animalis, &
valens futurum est medicamentum, ceruina
miscenda, valentior quam vitulina, lib. 6.
comp. phar. pari.

Nuclei, pini, oliuae, dactyli autem *Auicenna*.

Oleum, oliuum, ex oliuis expressum.

Opium, *Thebaicum*, *Galenus* lib. 7. simpl. &
post eum omnes.

Para-

QVID ACCIPIENDVM. 419

Petrofelinum, Macedonicum, & in hoc
Aftreoticum, & huius semen maximè in vfu
est, lib. 8. comp. phar. part.

Pruna, si alius deicienda est, Damascena
& Hispana seu Iberica, hodie Augustana &
Cathalaunica Italis dicta, sunt multò presta-
tiora, vel si qua his similiter sunt pinguis,
dulcia. Si ad cohibendum & astringendum sit
medicamentum, Damascena immatura, vel
potius quæ Iorana nobis dicuntur, S. Iuliani &
Turonica.

Papaver album, semen.

Piper, album, quia acrius, & linguam ma-
giù pungit, quàm nigrum, à quo per adustio-
nem vis exhalauit, Gal. lib. 8. simpl. sed al-
bum id maturum intellige. Nam album ex
Macropipere in racemum granatim debiscente,
recens factum, minùs acre, & Macropiperi fa-
cultate proximum, quale apud Serapionem est
accipiendum.

Pix, liquida in suppurantibus & tergentibus:
sicca, in siccantibus unguentis epuloticis & gla-
tinantibus, Gal. lib. 7. simpl.

Paonia, mas, seu eius radix vel semen: Ma-
nardus etatis nostre medicus longè doctissimus
in Epistolis.

Polypodium, quercinum vulgò usurpatur:
murale, & à saxis præterit cum Narbonen-
sibus quibusdam, quod frequentissimum, &
pro quercino omnes vendunt, nisi si quando
adstrictione opus est: qua ratione hederam quo-

420 SIMPL. ABSOL. SCRIPT.
que quercinam nonnullis expeti audio.

Quatuor emollientia:	{	Malua	
		Althaa	
		Viola nigra	
		Acanthus, id est, Branca ursina	
Quatuor semina	{	Maiores: Melonũ, Cu- cumeris, Cucurbita Citrulli.	
		Minora: Lactuca, Portu- laca, Inthubi, Cichorii	
		{	Maiores: Cumini, Car- ui, Anisi, Fœniculi.
			Minora: Apii, Dauci, Ameos, Amomi.

Quinque radices uretica: Apii, Petroselini,
 Asparagi, Graminis, Rusci.

Resinarum primas non iniuria meruit Len-
 tiscina, id est, Mastiche: inter alias verò præ-
 fertur Terebinthina, quia melior quàm Colo-
 phonia, & Fritta dicta; aut illius loco ponitur
 Laricea dicta, Terebinthine propè similis, Gal. 1.
 Comp. phar. gen. Recentioribus verò Pinea in-
 telligitur.

Ruta, folia Ruta agrestis: Gracis verò fo-
 lia Ruta domestica. Illam verò & illius semen,
 Moly, vel Hefanum, vel Hefasa, vel cum Sy-
 ris, apud quos nascitur, Hermola ferè vo-
 cant.

Rosa, rubra; recens in purgantibus; sicca in
 astringentibus.

Raphanus, silvestris.

Rosma-

Rosmarinus, folia ; interdum flos , quem nescio cur hodie vulgus Α'υθ & , id est , Florem absolutè appellat.

Rhus, cortex fructus Sumach dicti.

Stæchas, Stæchados Arabica flos.

Styrax , Calamite : nam liquidus vulgò dictus est Myrrha Stæce, si verus sit.

Santalum, flauum.

Spica Nardi , Indice.

Sulfur, ἄπυρον, id est , ignem non expertum, seu viuum, est nobilissimum : ad quodam extinctum , ceu nobis familiaribus, preferitur.

Σχοῖν & , id est , Iuncus : pro Schoenus anthos.

Tres flores cordiales: {
Violarum
Buglossi
Boraginis.

Thymum, Atticum, aut ex editis locis & siccis, lib. 4. sanit. tuenda.

Viola, nigra seu purpurea, vulgò Martia & quadragesimalis , quòd in ea tempora flos ferè incidat , & eadem recens, si haberi potest : nam sicca in efficax.

Zizipha, id est , Iuiuba , recentia & bene matura ; aut saltem integra , non putria aut vetustate exsucca : quod illis post sextum mensem ferè accidit.

Siquæ singula in singulis regionibus sunt præstantissima & laudatissima.

Alumen, Milesium.

Agaricus , Ponticus , Andromacho iuniori in Theriaca.

422 SIMP. ABS. SCR. QUID ACCIP.

Myfi, Cyprium.

Nitrum, Berenicium.

Sinon, Syriacus.

*Cuminum, Hispanum, alibi: Æthiopicum,
melius Ægyptio.*

*Anisum & Thymum, & alia plurima, Cre-
tica, lib. 4. sanit. tuend. in diatrion piper. &
diacalaminth.*

Meon, Hispanum & Macedonicum.

*Aristolochia, Pontica, & hac melior Cre-
tica, lib. 10. comp. phar. part.*

Phu, Ponticum.

Castorium, Ponticum.

*Daucus, Creticus, semine & radice bonus: ce-
teri solo semine.*

*In Dicearchia, que nunc vocatur Puteoli,
Ærugo, Cerussa, Æs, Squama Æru, & alia
nonnulla. Romæ argenti spuma fit optima. Ex
Sicilia item, magna Libya, & Creta quotannis
multa præstantissima Romam afferebantur,*

Hucusque Siluius.

DIA.

DIARIVM
PHARMACORVM
PARANDORVM,
ET SIMPLICIVM
LEGENDORVM,

A

MATTHIA LOBELIO collectum.

IN uniuersum annum optimè instructurus
officinam Myropola, per dies & menses ope-
rariis, farculis & officina caculis iniungit
qua facienda sunt; quia nonnulla medicamen-
ta omni tempore parari nequeunt: quorum
quidem aliqua si concinnari possent, tamen nos
debent, quia omnia simplicia suo tempore, & in
summo virium vigore (ut sciè Diosc. & Gal.
docuere) colligenda, recondenda, preparanda,
& aliis miscenda. Nonnulla verò quous anni
cardine, solo & celo, vel minori sumptu pra-
parantur, & miscentur. Exemplo igitur sumpto
ab iis qui opera locârunt, exordium sumemus.

IANVARIO.

MENSE primo & anni primis diebus
perlustranda quæ supersunt valida & inte-
gra in officinâ; ut vitiata, cariola, an-
tiquata, deprauata & putrefacta abiician-
tur;

tur ; vt & quæ desiderantur, inueniantur,
& absumpta restituantur.

FEBRUARIO.

QVÆCVMQVE imperata sunt mense
Ianuario, fieri possunt hoc & sequenti
mense. Et circa finem in regionibus cali-
dis, in quibus omnia præcocia sunt, col-
lige Violas ad syrupi præparationem, Con-
seruationem siue Conditum, ad Oleum,
& ad pulueres cordiales siccitas seruan-
das, quas & tardiùs colligere potes, vt sic-
ciores sint, & calor maior adsit ad siccan-
das eas.

Collige item Keyri.

RADICES COLLIGENDI

TEMPVS.

Circa finem Februarii initio Martii, &
primo Vere collige radices in varios vsus,
priusquam vis in folia erumpat.

Censuit tamen Dioscorides, omnes in-
cipiente foliorum defluuio esse legendas,
& cælo sereno: cui in quibusdam Galenus,
Auicenna & Mesues consentiunt; in aliis
diuersa sentiunt.

MARTIO.

RADICES quouis anni tempore col-
ligi

ligi possunt, quæ hominum cultu & sa-
ione crebra in omnem anni partem vege-
æ incidunt : quales ferè sunt hortenses
ilimentosa. vt,

Apri vulgaris
Buglossi vtriusque
Betæ
Lactucæ
Intubi
Oxalidis
Raphani
Napi
Pastinacæ
Sisari
Cepæ
Porri
Allii.

Et præter has erraticæ,
 { Dauci
 { Gingidii
 { Caulalidis
 { Asari
 { Dracunculi
 { Cyclaminis
 { Periclymeni
 { Cotyledonis.

Nam hæ quin-
que , vt bulbosæ
quædam alię, etiã
æstate, siccatis foliis, plenæ sunt, & fre-
quenter Autumno regerminant, alimenti
pingui & crassi copia.

Siluius. Quæ verò solius naturæ sponte
crescunt, aut semel à nobis tempestiuè
seruntur aut plantantur; ferè sunt opti-
mæ, solo aut Vere, aut (vt dixi) Autumno,
paucissimæ Æstate aut Hieme. Quin &
hæ quas multis anni partibus communes
diximus, sunt præstantiores, cum tempe-
stiuè satè adoleuerunt & vigent: aliis verò
temporibus ignauiores; quando vi qua-
dam & holitoris operâ & irrigatione co-
guntur adolescere sub cælo sibi parum
propi-

propitio ; quale æstium est ac autumnale
& hiemale. Sic Vere ipso, quando pri-
mum germinare incipiunt, nobis legun-
tur in annum:

Inula	Hyoscyamus
Althæa	Angelica vtraque
Iris	Anonis
Acorus	Asarum
Symphytum	Asclepias
Ruscus	Eistorta
Asparagus	Betonica
Petroselinum	Buglossum
Apium palustre	Carlina
Fœniculum	Caryophyllata
Bryonia	Centaurium maius
Agrimonia	Chelidonium vtrū- que
Meum	Cotyledon
Phu	Cynoglossum
Cyperus	Dictamnus albus
Rubia, quæ potius Autumno	Elleborus niger
Saxifraga	Esula maior
Eryngium	Farfara
Tormentilla	Filipendula
Pentaphyllon	Filix
Pæonia vtraque	Filix florida
Polypodium	Gentiana
Gramen	Iarus
Lilium	Aron
Alni nigrae radicis cortex	Imperatoria
	Lepidium

Man-

Mandragoras	Pityusa
Narcissus	Cortex rad. Populi
Nymphaea	Sigillum Mariae
Radix caua	Orchides
Capnos Plin.	Raphanus sylvestris
Rubus	& rusticanus
Scrophularia	Muscus arborum
Petasites	Cort. rad. Sambuci
Petroselin. Macedon.	Radices Ebuli.
Peucedanum	Cortex rad. Fraxini
Pimpinella	Cortex rad. Lauri.
Pistolochia	Cortices arborum.

HERBÆ ET FLORES.

Viola Martia ad
 Syrupum
 Conseruam } in regione temperata.
 Oleum
 & cordiales confectiones.
 Keyri.
 Aquæ distillantur ex Violis & herbis hie-
 me vegetis, vt Aqua
 Umbilici Veneris
 Mandragoræ
 Semperuiui
 Capillorum Veneris.
 Adiantum omne, Asplenium, Phyllitis.
 In regionibus calidis Syrupi ex herbis re-
 centibus parari possunt, vt:
 Capillorū Veneris simplex & compositus
 Grana

Grana hederæ arboreæ
Oculi Populi.

A P R I L I.

Quæcumque omnia Martio mēse, initio
Aprilis parari & colligi possunt.

Keyri Primula Veris
Narcissi flores ad oleum
Cochlearia Orchides Salvia vita.

M A I O.

Quæ prætermissa sunt mense Aprili,
fiant initio Maii.

Distillantur herbæ quæ ad statum per-
venerunt.

Herbæ quæ iam caulem producunt, &
semen edunt illo mense, conseruantur ad
Theriacam vel aliam compositionem. Re-
ponantur in altiori parte domus.

Vnguenta ex succis fiunt.

Emplastra ex succis herbarum parantur.

Conseruationes ex plantis.

Colliguntur

Abinthii coma ad conser.

Eupatorium ad succum.

Paludapium

Fumaria

Daphnoides

Genistæ flores

Cichorium

Lactuca syl.

Seri-

Serides	Phyllitis
Len palustris	Borago
Leucoia	Buglossum
Lichen	Bursę pastoris suc-
Mezereon	cus
Napi semen	Limonium Germa-
Plantago	nicum, seu Pyrola
Lupulus	Ophioglossum
Tamariscus	Pulmonaria vtraque
Thlaspi semen	Rosę
Vinca Peruinca	Rosmarini flores
Bugulę	Flores Sambuci.
Asplenium	

IVNIO, & initio IVLII.

Abrotonum	Cassitha
Agrimonia	Centaurium minus
Alchimilla	Chamędrys
Altercum, siue	Chamępitys
Hyoscyamus	Rosę in regioni-
Althęę flores & fo-	bus temperatis
lia	Syrupi Ros. confcr.
Anethum	oleum, vnguen-
Anthemis vtraque	tum, succus
Artemisia	Betonica
Asari folia	Brassica marina
Ballotę	Botrys
Calamintham ōtana	Branca vrsina
Calendulę stillaticia	Cari semen
Cardus benedictus	Coriandrum

Epi-

Epithymum &	Papauer Rhœas
Epithymbra	Parietaria
Equisetum	Parthenii siue Co-
Euphrasia	tulę flores
Galega	Periclymeni flores
Genistę semen	& fructus, & folia
Gratiola	Petroselini Mace-
Hypericum	donici semen
Hyssopum	Phlomos
Iacobæa	Pilosella
Labrum Veneris	Polium
Laurus	Polygoni aqua &
Lyfimachia lutea	succus
Maiorana	Portulacę succus &
Marrubium	stillaticia
Marum	Ros solis
Matricaria	Ruta vtraque
Melissophyllum	Sabina
Mentha	Salvia
Menthastrum	Sanicula
Mercurialis suc.	Satureia
Millegrana	Serpyllum
Nepita	Scordium
Numularia	Verbena
Opium	Veronica.
Origanum	

I V L I O.

In regionibus temperatis, quę præter-
missa sunt Iunio, facienda.

Quæ-

Quæcumque Solis feruorem requirunt, paranda, vt Theriaca, quæ in calidioribus regionibus parari solet Iunio. mense, vbi omnia sunt præcocia.

Parantur Trochisci Aliptæ moschatæ, quia mollescunt Ladanum & Styrax, si Soli exponantur.

Quod si quis eo tempore hæc neglexerit aut prætermiserit, licebit aquam Rosaceam addere calidè, & vi caloris liquefiant, (sicuti balneo,) quod melius est, quia illa longa insolatio exsoluit vires odoratorum.

Apud nos quia semina seriùs maturefcunt, insolatio & fermentatio Theriaces potest iuari, & accelerari in balneo vel hypocausto.

Colligenda in regionibus calidis:

Abinthium	Sem. Sefeli
Abrotonum	Massiliensis
Ageraton	Sem. Lichosperma-
Coriandrum	tis
Dauci Cretici se-	Lupinus
men	Sem. Maluæ
Sem. Petroselini	Flores Meliloti
Hydropiper	Sem. Anethi
Pulegium	Morus
utrumque	Orobus
Lauendulæ flores	Capita & Sem. Pa-
Ligustici semen	paueris vtriusque
	Psyl-

Pſyllium

Sophiæ ſemen

Ribes

Tanacetum.

AUGUSTO.

Quæcumque neglecta aut omiſſa ſi
præcedente menſe, ſiant Auguſto.

Colligenda:

Althææ ſemen

Fraxini ſemen

Sem. Cataputiæ

Miliſium

Cnici ſemen

Flos Nymphææ

Cornus

Petum. Mel Peti.

Cynosbaros fructus

Omphacium

Dauci vulgaris ſe-
men

Prunus ſyl.

Sem. Sambuci

Cucumis Elaterii

Ebuli

Rhamni Cathartici
ſem.

Momordica

Scordium

Polium

Sefeli Æthiopici ſe-

Ricinus

men

Spica Lauendulæ

Sem. Hyoſcyami.

Tribulus aquaticus

SEPTEMBRI & OCTOBRI.

Antiſpodium è Myrto & Cydonio

Cortices Caſtanearum

Cotoneamala Halicacabum Meſpilo

Rhamni cathartici ſemen

Radices nonnullæ omiſſæ Vere nouo. vt

Iridum Pæoniæ Acori

NOVEM

NOVEMBRI & DECEMBRI.

His duobus mensibus, Nouembri videlicet ac Decembri, eadem erit ratio, si modò in eis cõtigerit eiusmodi cæli temperies, vt radices adhuc validæ nullâ vel frigoris vel niuis tempestate concutiantur. Nam sæpe iisdem mēsis contigit, vt sine illâ cæli iniuriâ Pharmacopœis quod reliquum est radicum in hortis remanentium, æquè ac in præcedentibus, colligere liceat.

Sequuntur & nonnulla purgantia medicamenta M. Lobelii.

ALIQUOT
MEDICAMENTA
COMPOSITA
HABERE IN PROMPTU
OPERÆ PRETIUM.

DOLVM esse, si quis Compositis utatur, Villanouanus dixit, ubi in promptu habentur Simplicia: Variis tamen de causis nonnulla Composita pharmaca non minùs uilia quàm necessaria sunt. Prima & potissima, quotiescumque præcipientes implicati morbi, eorumdemq; seuerissima symptomata ad eò urgent,

gent, ut noua medicamenta, Magistralia
cata, repente per otium concinnare non licet.
Secunda, & alia, quia multa comprobata,
vsq; & ratione recepta compositiones fermen-
tatione egent; unde noua & optata exoritur
cultas; quandoquidem simplicia quouis lo-
calo, & solo, ad manum esse nequeunt; in
quo tempore maximè vigent, in annum vsq;
ex his composita nonnulla medicamenta pre-
parari, permisceri & asseruari opera pretium
est, ut Theriaces compositio, Mithridatica, Philo-
sophi antidotus, & huiusmodi. His rationibus a-
ctus, quia medicamento purgante indies uti
dum, aliquot tuta eaq; pauca pharmaca compo-
sita, blando nulloq; labore euacuantia, singu-
lis humoribus dicata, nobis elegimus; quibus
felicissimè vsi sumus, & ex duabus tribus
compositionibus unam fecimus, ne mole & cop-
positionum obruamur; quæ diu in officio
asseruari solita, sæpe putrent, non sine Pha-
macopæorum & egrotantium dispendio.

CHOLAGOGVM ROSATVM

CLEMENS, OMNI ÆTATI VTILIS
ori, ventriculo & visceribus gratum; febris
bus & affectibus biliosis aptum. Respon-
det Electuario Rosato, & Electuario è Prun-
is solutiuo, & Electuario è Psyllio.

R. Succi Rosarum rub. ℥ xv.
Sacchari albi ℥ xxx. [xxxvj. al.]

Mel

Mellis candidi despumati ℥ vj.

Prunorum ℥ xx. quæ exhibent pulpæ solidiusculæ ℥ xvj.

Passularum à stipitibus mundatarum ℥ xij. quarum pulpa solidiuscula est vnciarum vj. Pruna & Passulæ coquantur separatim ad mollitiem ex decocto sequenti, & per setaceum cernantur:

℞. Cichorei totius

Boraginis Acetosæ

Polytrichi, vel Adianthi } ana m. iij.

Endiviæ

Hordei integri m. j.

Glycyrrhizæ mundæ ℥ j. β.

Florum Violarum

Boraginis ana m. j.

Anisi ℥ iij.

Fiat omnium decoctio in s. q. aquæ ad ℥ iij.

In cuius colatura coque in vase occluso Pruna & Passulas. In residuo infunde, coque leniter

Seminis Psyllii

Quatuor seminum frig. maiorum }

Sem. Lactuæ

Oxalidis

ana ℥ β.

& Portulacæ contusorum

Dissolve G. Tragacanthi ℥ j. β.

Saccharum, Mel, & Succus Rosarum coquantur ad Electuarii solidiusculi consistentiā: deinde pulpæ & emulsionēs seminum addantur, iterumque coquantur

T 2

tur

tur lento admodum igni: tum demum
insperge puluerum

Cinnamomi electi ℥ β.

Santalorum rub. ℥ j. β.

Santal. alborum ℥ vj.

Caryophyllorum

Surculorū vel foliorū Lentisci } ana ℥ j.

vel Caryophyllorum ℥ ij. ℥ j. [in p
nuria foliorum Lentisci]

Macis ℥ iiij.

Adde denique singulis lib. siue ℥ xij
huius Electuarii, Scammonii optimi ℥
cocti in ℥ j. β. Succi Rosarum lento igni
vel cineribus calidis, quemadmodum co
quitur à Mesue in suo Elect. Rosato.

Tota compositio est librarum v. & ℥ v
Dosis à ℥ iiij. ad ℥ iiij. v. & vj.

Si velis minus purgare, utere minor
dosi. medicamenta enim validiora minor
dosi assumpta, debilia sunt.

Hec & quamplurima huiusmodi purgā
tia, in Chylismata redigere operę pretium

EXTRACTVM MELANAGOGVM

SANGVINEM DEFECANS, E

*serosa excremēta euacuans, omnibus cutis &
cuticula vitiis, lepra & elephantiasi conue
niens, siue à bile, siue à pituita salsa: Splenetici
cum & Hepaticum medicamentum efficax*

℞. Succorum Rosarū rub. defecatorum ℥ ij

Suc

Suc. Fumariæ
 Lupulorum
 Boraginis
 Pomorum dulcium } ana ℥ j.
 Mercurialis
 Endivię vel Cichorei }

Vini albi

Quibus decoque sequentia in balneo
 operculo occluso.

℞. Polypodii recentis, & adhuc viridis ʒ
 Quercu vel Fraxino ʒ vj.

Foliorum Senæ mundatorum ʒ ix.

Summitatum & florum Thymi,
 Cassiæ
 & Absinthii } ana ʒ vj.

Radicū Lapathii acuti virentiū
 Helenii Ebuli, vel
 Corticis radicum Sambuci } ana ʒ j. β.
 Corticis rad. Fraxini
 & Populi nigri }

Capillorū Veneris vel Polytrichi
 Asplenii Chamædryos } ana m.
 Chamæpityos } j. β.

Florum Chamæmeli Romani
 & Cotulæ foetidæ siue Parthenii ana m. j.

Seminis Cnici ʒ iij.

Seminis Anisi
 Fœniculi } ana ʒ vj.
 Carui }

Contusis, infusis, decoctis, expressis &
 transfcolatis infunde

T 3

Aga-

Agarici candidissimi & leuissimi
Hermodaetylorum, &

Pulpæ Colocynthis ana ℥ j.

Omnium Myrobalanorum ana ℥

Zingiberis Cinnamomi

Schœnanthi Macis

Galangæ Garyophyllorum } ana ℥

Iterum expressis & defæcatis percoquantur lento admodum igni, cum mellis candidi ꝑ. tribus, ad mellis vel Electari liquidam crassitudinem. Addendo singulis ꝑ. Scammonii præparati vel cocti in succo Rosarum, ut antè diximus, ℥ β. pul. Gummi Arabici ℥ j. Dosis à ℥. iij. ad ℥. iiij. & v.

Extremis morbis adiciuntur vniuersæ compositioni

Hellebori albi

& nigri ana ℥ β.

Fiat Chylariū. Dosis à drachma j. ad duas

CATHARTICVM

HYDRAGOGVM.

℞. Radicum Graminis ℥ vj.

Rad. Asari ℥ j.

Granorum Hederæ arboreæ ℥ iiij.

Garyophyllorum Galangæ tenuis

& Cinnamomi ana ℥ ij.

Coquantur ex arte, ut dixi modò, in ꝑ. q. aquæ mulsæ, & ꝑ. j. vini albi, ad ꝑ. j.

Colaturæ adde Succorum rad. Iridis & Brassicæ

Brassicæ marinæ ana l. β.

Succorū Chamelææ } densatorū, vt docui-
& Thymelææ } mus capite de Cha-
malæa, ana ʒ iij.

Vel eorundem vice in regionibus frigi-
dis, quæ carent vel non abundant
Chamalæa & Thymelæa, sume

Extracti Laureolæ vel Gratiolæ ʒ j.

Percoquantur igni lento cum Sacchari
l. j. Ab igne vbi abstuleris, adde pulueris
Radici Mechioacæ ʒ j. β.

Tartari albi & Spec. Aromatici Rosati
ana ʒ β.

Macis ʒ ij.

Olei stillatitii Cinnamomi, Caryoph. &
Anisi ana ʒ β.

Datur ex aqua Graminis & mulla à ʒ
iij. ad ʒ iij. cum pari quantitate Mela-
nogogi, & Asari decocto.

DIACNICVM CVM CITRO,
SOLVTIVVM, PHLEGMAGOGVM
& Hydragogum, quartana febre affectis,
vt si quod aliud, utilissimum. Respondet
Diacarthamo & Electuario à Citro solutino
Monspelienfium.

Hæc Compositio à Cnico siue Carthamo
nomen accepit, tamquam præcipuo agente: me-
ritò igitur ʒ iij. Medullæ feminis Cnic.
cum Rondelerio legendum, pro ʒ iij. (vt de-
prauatè

*prauatè habent omnia exemplaria) consensu
Ad hec Cnici semen omnium viscerum obstru-
ctiones reseras; colluuiem propellit, & pitui-
dam purgat egregiè.*

Recipit autem Medullæ seminis Cnici
℥ iiij. vel eius loco sume seminis Cnici
boni & pleni ℥ xij. ʒ vj. ʒ ij.
(ex ʒ j. autem seminis habebis ʒ vj. me-
dullæ)

Contundantur, & fiat emulsiō ex aqua
mulsæ, vel iure gallinacei, vt docet Dioscori-
des. Conser. Corticis Citri melle conditi [ad
deterfionem pituitæ] ℥ j. β.

Conser. Violarum &

Florum Boraginis ana ʒ x.

Carnis Dactylorum vino albo macerato-
rum ℥ j.

Pul. specierum Diatragacanthi frigidi
℥ j. β.

Turbith ℥ j. ʒ vj.

Diagridii vel Scammonii ℥ j.

Zingiberis albi ʒ ij.

Hermodactylorum ʒ iiij.

Spiritus Anisi, vel

Fœniculi Cochlearia tria

Mellis optimi despumati ℥ xij.

Sacchari albi ℥ xx.

Dissoluantur in ℥ j. β. Succu Cydoniorum
& s. q. aquæ mulsæ.

Terenda terantur & permisceantur.

ANTI-

ANTIDOTI DIAPHOENICI

Mesue, emendata descriptio.

℞. Dactylorum Cheyron, id est, è Chayro oppido, non Cirrhon siue fuluorum, vt malè ex Græco vertit Ruellius, nonnullas officinas secutus, ʒ xij. & β.

Macerentur vino albo [Rondelet.] loco tepido ad mollitiem, terantur, cernantur per cribrum.

Pinearum (non Penidiorum) aqua hordei mundatarum & infusarum ʒ v.

Turbith optimi ʒ iiij. ʒ iiij.

Amygdalarū dulcium purgatarū ʒ iiij. ʒ vj.

Scammonii ʒ j.

Zingiberis Piperis longi

Cinnamomi Macis

Galangæ Xyloaloës

Foliorum Rutæ siccorum } ana ʒ ij.β.

Anisi Fœniculi

Dauci Cretici, vel eius loco Cari semen aromaticum.

Probè trita omnia excipiantur libris tribus Mellis despumati ex infusione vini Dactylorum & aqua Hordei, in qua post lotionem Pinci & Amygdala macerata sunt.

Tota compositio est ferè lib. v. & ʒ xj. Dosis ab ʒ β. ad ʒ vj.

T s

Hæc

Hæc compositio ad euacuandos crassi
humores facta est.

ELECTARIUM INDVM.

Dissuadet præparationem Electarii Indi
di noster Rondelletius; quia non multum
differt à Diaphœnico. Adstringentia &
attenuantia Electuario Indo addiderunt
que deteriorem potius compositionem fe
cerunt, & deprauârunt, vt exploranti fa
cilè patebit.

LENITIVA È CASSIA *medicamenta.*

E Cassiæ Ægyptiæ siliquis à diuersis au
toribus multa & varia medicamenta leni
tiua descripta, minimè paranda aut dis
pensanda censentur, quia vel acescunt vel
exiccantur, & eorum laxandi vis deper
ditur.

FLOS CASSIÆ, *seu Cassiæ extracta.*

E Cassiæ recentis & prægnantis fistula
ribus siliquis pulpa elicitor, quam Florem
Cassiæ & Cassiam extractam vocant: Sed
cùm Cassiæ Siliquæ siue fistularis recens
pulpameliùs asseruetur in sua theca, quàm
excreta; quid extractione ante vsum opus
est? Triplex Cassia extracta in officinis
pro-

proflare solet : Cassia extracta sine Sena & cum Sena, Cassia extracta cum Manna; Cassia cum Saccharo & cum Melle, pro clysteribus & pauperibus. Si præscribatur à medicis, paretur hoc sequenti modo.

CASSIA extracta communis
Nicolai.

℞. Florum Violarum
Violariæ siue foliorum Violarum,
Maluæ,
Mercurialis, Betæ
Parietariæ ana M. j.
Absinthii Pontici siue vulgaris M. f.
Herbæ istæ virides coquantur artificiosè
in f. q. aquæ; è cuius colato abluè sili-
quas Cassiæ; & diluè in eius portiun-
cula pulpæ Cassiæ ℞ j. Mellis ex reliqua
colati parte despumati ℞ β. percoquan-
tur lento igne ad electarii formam.

DIACASSIA cum MANNA non mul-
tum differt à Diacatholico, nisi Senâ,
Rhabbaro & Polypodio.

DIACATHOLICON Nicolai,
vel potius è Dia-catholico
Liquamentum.

Huius vniuersalis medicamenti varia
est descriptio. Exemplaria vulgata habent

T 6

pro

pro pulpa Cassiæ Thamar-Indorum ana
 ℥ duabus Sacchari ℥ ij. id est ℥ xxiiij. An-
 dernachus autem pro ℥ ij. Sacchari perpe-
 ram addit Cassiæ & Thamar-Indorum &
 Senæ mundatæ ana ℥ viij. Rondelletiu
 verò ℥ vj. mediocritate fretus. Hoc Ca-
 tholicon lene siue mite in suauissimam &
 lenissimam, cum Cassiæ operatione maxi-
 mē conuenientem compositionem, rede-
 gimus: quam è Diacatholico Liquamen-
 tum siue Extractum diximus; neglecto
 Diacatholico maiore Fernelii, quod reci-
 pit Turbith & Diagredium, ab his beni-
 gnis medicamentis & intentione Nico-
 lai multum aliena. Paretur ergo in hunc
 modum:

℞. Radicum Filiculæ siue * Polypodii re-
 centium, fol. Senæ mundatorum ana
 ℥ xvj.

Glycyrrhizæ rasæ

Anisi ana ℥ ij.

Seminis Fœniculi ℥ j.

Foliorum Violarum M iij.

Florum Violarum M j. β.

Quatuor seminum frigidorum maiorum
 ana ℥ j.

Contusa omnia, demptâ Senâ, & semi-
 nibus frigidis, floribusque Violarum, 24.
 horas vel biduo aquę pluuialis ℥ v. vel q. s.
 madefacta, decoquuntur leuiter ex arte in
 balneo Mariæ; mox paulo antequam ab
 igne

igne deponantur, Senam adiciunt, cum
 seminibus frigidis & floribus Violarum;
 maceranturque calidè aliquot horas in
 balneo. Vbi tantisper refrixerint, linteolo
 excolantur, & leniter exprimuntur, ne Po-
 lypodii & Senæ vis adstrictoria eliciatur.
 Colatum iterum decoquitur, dum mellis
 crassitudo fiat, adiectis Sacchari boni sub-
 rubri, perdulcis, vel albi pinguis ℥iij.
 Postea ab igne remotis adde Floris Cassiæ,
 vapore decocti præscripti extractæ, &
 Thamar-Indorum ana ℥vj. Sacchari candi
 & Penidiarum ana ℥j. β. Succī vel Infusi
 Ros. ℥iij. Æstate addi poterit decocto li-
 bra vna succi Mercurialis defæcati & pu-
 rificati, & pro diuitibus in singulas ℥scru-
 pulus vel ℥β. Rhabarbari selectissimi.

* Polypodii magna [*secundum Rondeletii*]
 aut crassamentum, quia copiosos flatus
 gignit, ventrem lædit, eumque magis
 obstruit quàm reserat, leuiter Polypo-
 dium decoquendum iussimus, vt efficacius
 suas vires, easque suauiores, exserat. De-
 coctionem enim mediocrem sustinet,
 quemadmodum Sena & Turbith, vt
 monuimus in nostris Stirpium Obserua-
 tionibus Latinis. Ponderus eius etiam adau-
 xi, quia villi emitur, pauperum commo-
 do; longeque maiori pondere in decoctis,
 vt Sena, & alia permulta, quàm in sub-
 stantia, vt vulgus loquitur, assumitur.

Aliqui omittunt Saccharum Penidia-
rum; leui incommodo, quia Penidia pa-
rantur ex Saccharo pingui, leniente.

ELECTARIUM LENITIVUM.

Elect. Lenituum conuenit cum Diaca-
tholico & Diacassia; quare eo carere possu-
mus. Hæc de Electariis lenioribus suffi-
ciant, pluribus humoribus, exustis potius
simum, expurgandis idoneis.

DIA-SEBESTEN.

Dia-Sebesten Montagnanæ bilem re-
nuem euacuat. In Italia & regionibus cali-
dis magis vsitatum quàm in hisce frigi-
dis tractibus, vbi rarò dispensatur, quem
admodum Elect. è Psyllio Mesuæ, que
etiam carere possumus. Recipit copiose
Scammonium cum trochis. è Spodio ve-
Antispodio, ex Oxyacantha, trochis. Dia-
rhodon, quò Scammonii vires remissiores
sint, & alui fluores dispendiosæ vitentur.
Pro hisce inusuratis Electariis medicus
doctus facile Cholagogum Rosatum de
cocto conuenienti siue è Myxariis siue è
Psyllio, Fumaria, Epithymo, Eupa-
torio, Rhabarbaro & huiusmodi, pro ra-
tione & natura morborum, diluit.

ELECTARIUM è Succo Rosarum Ni-
colai, fortissimum est cholagogum, & mi-
nùs castigatum aut emendatum.

Antido.

Antidotus sine CONFECTIO HAMECH,
apud Mesuem.

Ex veterum Antidotis retinent hanc confectiōem neoterici, ob insignes vires ad omnes morbos ex pituita salsa, flaua bile, adustisq̃ue humoribus ortos, & prauos eorum ichores; scabiem, impetiginem, elephantiasim, luem Veneream, & quęuis cutis & cuticulę vitia. Improbandi tamen sunt qui hac compositione vtuntur in pituita crassa euacuanda, ob Myrobalanos, quę magis impingunt materiã lentam, ex Galeni & antiquorum sententia. Sed quia hæc compositio (vt scitè monet Rondel-
letius,) sine arte composita videtur, & contra theoremata à Galeno, Mesueo & aliis tradita: (nam infunduntur diutiùs & coquuntur maximè inæqualia, vt Poly-
podium, Myrobalani, Agaricus, Colocynthis, Rhabbarum &c.) lubuit eius parandi rationem explicare. Quid enim
opus quinque diebus in macerando Poly-
podio ex sero lactis: cū nostra ætas ipsum Guaiacum, lignum durissimum, eiusq̃ue cortices, & huiuscemodi 24. horis aqua tantum feliciter maceret. Serum autem diutiùs asseruatum facilè acefcit, situm ducit, & putret. Octo vel 10. horarum Rhabbari infusum (præterquam in alui
fluori.

fluoribus, ventriculi & intestinorum inbecillitatibus, lubricitatibus & læuitatibus à bile alimentis permixta, vbi solemus exhibere fortem Rhabarbari expressionem, & ipsum Rhabarbarum in tota substantia) commendatur à perbonis medicis, ne vis adstrictoria eliciatur. Hæc monuimus, vt nonnulli è nostris pharmacopœis sint paulò diligentiores in parandis pharmacis, ediscantque rationem componendorum medicamentorum, quam ipsi modum faciendi vocant.

℞. Myrobalanorum flauarum ℥ iiij.

Cepularum Indarum

Rhabarbari

Epithymi ana ℥ ij.

Agarici Colocynthidis

Polypodii querni ana ℥ xvij.

Absinthii Thymi

Senæ ana ℥ j.

Violarum ℥ xv.

Anisi Rosarum Fœniculi ana ℥ vj.

Succi Fumarię Mercurialis ana ℥ x.

Pruna numero sexaginta

Vuarū passarum à vinaceis purgatarū ℥ vj.

Polypodium leuiter contusum, cum Passulis, Absinthio, Prunis, Fœniculo & Aniso

24. horas madefactum ex feri lactis asini vel caprini q. s. in vase oris angusti obturato, feruescat aliquot, leuioribus ebullitionibus: deinde addatur Colocynthidis

this contusa & forficibus incisa, cum Agarico, nodulo laxo excepta: Thymum, Epithymum, Myrobalani, Sena, Violæ, Rosæ & Rhabarbarum macerentur 12. horas, & unica feruefactione parumper decoquantur, addito Succo defæcato Fumariæ, quia paucam aut ferè nullam sustinent decoctionem. Cola leniter exprimendo. In colati portiuncula dissolue Mannæ ℥ ij. & coletur. Coque igne tantillo colati reliquam portionem, addita sesquilibra Sacchari boni, vsque dum mellis crassitudinem habeat. mox vbi refluxit, tepenti adhuc syrupo misce Cassiam, Thamar-Indos, Mannam & Scammonii præparati ℥ j. β. paulatim inspergendo puluerem hunc:

Myrobalanorum flauarum

Cepularum

Indarum ana ℥ β.

Bellericarum

Emblicarum

Rhabarbari

Seminis Fumariæ ana ℥ iij.

Seminis Anisi Spicæ Nardi ana ℥ ij.

TRYPHERARVM differentia.

Trypherarum variæ sunt descriptiones. Quæ Galeno adscribitur apud Mesuem, recipit multa quibus Galenus nunquam usus est, vt sunt Moschum, Ambar, Caryophylli,

phylli, Nux myristica, Macis & Santala.

Tryphera magna Nicolai cum Opio parabatur, & sine Opio: sed cum Opium affertur, adimenda Hyoscyamus & Mandragoras: cum non minus sterilibus mulieribus aduersentur quam Opium.

Est & alia Tryphera minor, ad differentiam maioris, ex arte Phenonis. Item Tryphera Moschata Mesuæ &

Saracenica duplex { Mesuæ, &
Nicolai.

TRYPHERA *Persica.*

Trypheram Persicam Mesuæ, quia apud multos usu recepta, & à medicis Rhodomagenis & Rondelletio comprobatur in refrigerando ventre, eodemque relaxato confirmando & roborando, omnesque humores ferè euacuando cum astrictione, & refrigeratione, sine vlla ventris lésione, retinuimus; delicatis & imbecillis tutiorem futuram quam Antidotus Hamech; ob Diagredium & Colocynthida: quamuis validiora medicamenta mitescant cum aliis in pauca quantitate exhibita. Sic enim paratur.

℞. Succorum Solani

Endiuia fatiua

Apii defæcatorum ana ℥ ij. aut q. ℥.

Succi Lupulorum ℥ j.

Pru-

Prunorum Damascenorum numero l.

Violarum recentium & Rosarum recentium ana \mathfrak{z} iij. vel \mathfrak{z} vj. Succu, penuria Rosarum recentium siccarum.

Foliorum Senæ

Myrobalanorum Citrearum

Cepularum

Indarū confricatarū in oleo

amygdalino dulci

} ana \mathfrak{z} ij.

Agarici \mathfrak{z} j.

Cassithe \mathfrak{z} β .

* Epithymi \mathfrak{z} v. * pro \mathfrak{z} 4. Epithymi, ut
Spicæ Nardi Indi- in veteri exemplari le-
cæ \mathfrak{z} iij. gitur, Cordus, Anti-

Feruefac paulisper, dotarium Florentinum

& alii nonnulli \mathfrak{z} 40. legunt. Succorum au-

tem prescriptarum l' j. Quæ quantitas longè

superat omnia huius medicamenti simplicia: ad-

de quod calidior foret eius operatio, & succi

ingredientia vix caperent qua infundi debent:

côque quidam decoquunt, & infundunt in bal-

neo occluso. Syrupus ex Epithymo Mesue, cui

nomen ab Epithymo tanquam præcipuo agente,

\mathfrak{z} xx tantum Epithymi primo loco habet.

cola, & in colati dimidio dissolue

Pulpæ Thamar-Indorum \mathfrak{z} iij.

Pulpæ Cassiæ \mathfrak{z} iij.

Mannæ \mathfrak{z} j. β .

Ic-Sacchari siue Sacchari Violati \mathfrak{z} xij.

Alteri colati parti adde Sacchari optimi

\mathfrak{z} xxxvj.

Aceti

Aceti boni ℥ j.

Coquantur igne lenissimo, & supradicta
commisceantur.

Deinde adde sequentia in puluerē redacta.

Rhabarbari selecti ℥ ij.

Myrobal. Citrinarum ℥ j. β.

Indarum

Chebularum ana ℥ j.

Bellericarum

& Emblicarum ana ℥ β.

Seminis Fumarie

Trochiscorum Diarhodon

Macis Mastiches Cubebarum

Spodii vel Antipodii è Myrto vel Cydonia

Santali citrini ana ℥ ij.

Seminum Cucurbitæ

Citrulli

Melonum

Cucumeris mundatorū

} ana ℥ ij. β.

Anisi ℥ β.

Spicæ Nardi ℥ ij.

Tenuissimè trita inuoluantur oleo Viola-
ro: & fiat omnibus mixtis Electarium ar-
tificiosè.

PILVLÆ AGGREGATIVÆ.

*ex inuentione D. Mesue, inter om-
nes Aggregativas potissima.*

Quia omnes humores implicatos è capi-
te, ventriculo, hepate & visceribus eua-
cuant.

mant, Catholicæ vocantur, aut Diacatholico comparantur: & quoniam ad multa utiles, multiq̃ue vsus quotidiani; earũ descriptionem damus ex veteri exemplari depromptam.

℞. Myrobalanorum Citrinarum

Raued seni ana ʒ iiij.

Succi Eupatorii Mesuæ, id est Agerati

Diosc. seu Herbae S. Mariæ

Succi Absinthii ana ʒ ij.

Diacredii siue Scammonii præparati succo Rosarum

Turbith boni Aloës ana ʒ vj.

Myrobal. Chebularum Indarum

Agarici candidissimi

Colocynthidis

Polypodii ana ʒ iij.

Mastiches

Rosarum

Salis Gemmæ

Epithymi

Anisi

Zingiberis ana ʒ ʒ.

Elect. Rosati Mesuæ q. s.

Fiant pilule. Ne fortiores sint, formentur cum Elect. è Succo Ros. ait Rondeletius.

In his pilulis hoc reprehensione dignum, quod vulgus pharmacopœorum, Cordum, Wecherum & alios sequens, tum in Superiori Germania cum & Inferiori, pro Eupatorio Mesuæ, Gratiolam, visceribus

ribus impendiò effrenatum hostem, substituunt. Ageratum enim esse Mesuæ Epatorium, superabundè docuimus in nostris Stirpium Aduersariis.

HIERA AROMATICÆ

sive Pilula ex Aloë, aromatica.

℞. Aloës Succotrinæ, aliquoties macerata succo Rosarum rub. & exsiccata in clibano ʒ ij.

Agarici Trochiscati tenuissimè triti ʒ ii
Cinnamomi

Rad. Asari

Spicæ Nardi

Mastiches

Garyophyllorum

Macis

Galangæ

Schœnanthi

Xyloaloes

Croci

} ana ʒ j. ʒ β.
}
} ana ʒ ij.
}

Cum Syrupo è Stœchade excipiantur.

PLURA iam non excutiemus, freti D. Rondeletii Pharmaceuticam Officinam mendis in numeris vindicatam, tandem in publicum prodituram.

Quarenti autem Medicamentorum varia & comprobata genera, eiusdem Rondeletii Remediorum formula obiiciantur.

QUIA VERò in hisce Aquilonicis plagis

gis tot Seplafarii, Salgamarii potius
 quam pharmacopœi; Barbitonfores, Li-
 thotomi, Circumforanei, Agyttæ, Ludi-
 magistri, medicamentarii indocti, & sa-
 crificuli vafri, rapaces & lucri audiffimi,
 nulla medicinæ parte illis probè peruesti-
 gata, per hominum mortes experimenta
 agitantes, tam repenti hodie Medici aut
 potiùs medicaſtri fiunt: qui tandem in lo-
 cum experientiſſimorum Medicorum ir-
 repſerunt; magno ignaræ gentis, rudis
 & ruſticæ turbæ applauſu: apud quos for-
 det, laceratur & malè audit ars Medica di-
 uina, nobiliſſima & antiquiſſima, ſummo
 ægrotantium diſpendio, & tædio probor-
 um medicorum; conſultò dataque opera
 catenus & parciùs attingimus, imò præ-
 termiſimus (tanquam nefas plagiumque
 profanare & perdere artem) medicatos
 ſuccos ſive nobiliſſima Liquamenta, Ex-
 tracta Cathartica vocata, quæ longè mi-
 nori noxa & mole, maiori cum efficacia
 in corporibus egregiè operantur: tamdiu
 uſquedum leges ceſſabunt in hos indoctos
 & inexpertos carnifices, qui ſe medicos
 proſitentur, ubi aliquot remediorum
 formulas memoria didicerint, animad-
 uertere.

SVCCEDANEIS

QVID PRO QVO vocant.

AΝΤΑΔΙΟΡΡΗ, hoc est, Simplicia, quae aliorum facultate similium penuria supponi possunt medici consilio, quae nomine Galeni circumferuntur, & à Paulo ad verbum propè citantur, Galeni non esse hinc liquet quòd statim ipso initio Galenum citat. Adhuc Avacardii fructus mentionem facit, qui Galeno ignoratus fuit. Postremò multa supponit assurdissima: ut loco Agarici, Euphorbium; pro Serpyllo, Potamogitona; vice Galla, sordidum gymnasiorum; in locum Polypodii, radices Chamelae aut Chamaleontis; pro Polytrichum Absinthium, & alia eius generis plurima viribus dissimilia. Tamen quae recipienda magis sunt, tum indidem, tum ex Galeni libris, tum etiam ex Arabibus vicumque proferemus: ut
 PRO Aqua pluvia, supponi potest Aqua fontana pura, & ab omni mistione sincerà. Galenus lib. 1. comp. pharm. part. in diacedio.

Acatia, succus & caro Prunorum agrestium vel Hypocistis, Auit. 2. Canon.

Asaro, Acori par pondus & dimidium. Carpesium quoque pro Asaro & cum Asaro, lib. 2. comp. phar. part.

Absinthio, cum Galen. Abrotonum: & econtra pro Abrotono, Absinthium.

Alas-

*Acanthii semine, Lychnis, & contrà ἀντιβραχίο-
ρπον.*

*Acantha Arabica seu Ægyptia herba (qua Su-
caba [al. Sucaba] Serapioni dicitur) Acan-
tha leuce nostras, eidem dicta Bedegar.*

Alicacabo, semen Solani.

Aspaltho, Pix liquida, Brutia.

*Æthiopica olea lachryma, lachrymarum Aca-
cie partes dua; seu pro gummi Elemnis, gum-
mi Arabicum.*

*Acoro, ad flatus & hepar, ac lienem iuuan-
dum, Cumini par pondus, & tertia pars Ari-
stolochia. Anicenna.*

Anchusa, Hyacinthus.

Arsenico, Sandaracha.

Amylo, sicca Farina.

Amygdalis amaris, Absinthium.

*Aristolochia quavis, una ex tribus Aristolochiis,
quamcumque habueris. Galen. lib. 3. comp.
phar. part.*

Adipe vulpis, ursinus.

Adipe ceruino, anserinus.

Alumine, Sal fossilius.

PRO Balauatio, Malicorium.

Buccinis, Ostrea usta.

Balsami liquore, Myrrha stacte.

PRO Cinnamomo, Casia, aut Amomi du-
plum, ad odoris gratiam. Gal. lib. 5. compo-
phar. in dentificio. Pro Cinnamomo, du-
plum optima Casia, vel cum Quincto me-
dico duplum vel multum Carpesii, vel cerie

- non paucior *Casia*. Gal. lib. 2. 3. & 8. comphar. part. & lib. antid. Quidam carent *Cinnamomo*, in vicem eius ponunt æquum pondus ex semine *Cardamomi*. Damocrate *Cyphi*, lib. 2. *Antidotorum* Gal.
- Casia*, *Cinnamomum*. Galen. lib. 2. comphar. part.
- Casia cortice*, *Nardus Indica*, vel *Malobaria folium*; vel contrà, lib. 6. comph. phar. part.
- Chamameli floritus*, duplum foliorum & radicum.
- Costo* hodie rarissimo, *Pyrethri* dimidium, *bacca Cedri*, vel *radix Helenii* vel *Ireos*.
- Cimolia terra*, ex *Cimola una Cycladum*, trimentum ferri & mola simul attritorum *Cardamomo* maiore, minus; & contrà.
- Calaminthe omnis*, *Menthastrum* & *Pulegium* similia sunt facultatibus: ob id inuicem sunt antiballomena.
- Croco*, *Crocomagma*.
- Cypero*, *Iuniperus maior*.
- Cumino*, semen *Ruta* vel *Agri* [casti]
- Clinopodio*, *Heliotropium*.
- Colocynthide*, semen *Ricini*.
- Capparis radice cortice*, cortex radice *Tamarici* vel *Erica*.
- Cicuta semine*, *Coriandrum*.
- PRO *Diſamno*, *Eleliſphacus*, vel *Nepita*.
- Doronico*, dimidium seu dua tertia *Garyophyllorum*. Auic.
- Damaſonio*, *Eryngium*.

PRO Elaterio, succus foliorum Cucumeris
agrestis.

Ebeno, lignum Guaiaci; & contrà. Nam quas
vires hodie in ligno Guaiaci experimur, Ebe-
no tribuit Gal. lib. 6. simpl.

Eupatorio Mesue, Absinthii & Asari ana di-
midium pondus eius, ut ambo simul mista
equent pondus Eupatorii Mesue, ab Eupa-
torio Græcorum diuersi.

PRO Folio, folium Garyophylli, Nardus In-
dica, si inuenitur, Casia, id est, vulgare
Cinnamomum, Macis. Auicenna 2. canon.

Ferrum, ferrugo, squama ferri, idem propè pol-
lent; & pro se mutuo ponuntur.

Fimo palumbis, fimus columbe.

Felle suillo, vel perdicis, vel piscium.

PRO Gentiana, Asari, & radicis Capparis
ana dimidium.

Gongylide, Heliotropium.

Glycyrrhizæ succo, æquale radicis eius. Androm.
in arter. 15. apud Gal. lib. 7. comp. ph. part.

Gnidio Cocco, semen Lathyridis; & contrà.

Galbano, Sagapenum.

PRO Hammoniaco, Propolis.

Hermodactylo, in doloribus iuncturarum, folia
Anchusa, & dimidium Bdellii.

Hedera gummi, gummi Persici.

Hyacintho, flos Isatidis.

PRO Iride Illyrica, Helenium odoratum.

PRO Lapide Lasio, [al. Asio,] lapis gagates.

Lapide Magnite, lapis Phrygius.

Lapide Phrygio, Pyrites lapis vel Argyrites.

Libyſtico, ſemen Staphylini, id eſt Paſtina,
praefertim agreſtis.

Lepore marino, Cancer fluuiatilis.

Lanaria radice, radix Veratri nigri.

Lycio, ſuccus radicis Centaurii magni, lib.

ſimp. aliis ſuccus baccarum Periclymeni. a

etor libelli Dynamicon, Galeno male adſcript

PRO Melle, Melaërium, vel Saccharum.

Malobathro, Caſia, vel Nardus Indica.

Myrrha Troglodytica, Calamus odoratus.

Myrrha, Smyrnum, & contra. Dioſc. i
Smyrnio.

PRO Naſturtii ſemine, folia eius ſicca.

Nuce moſchata, par Spica.

Nardo Syriaca, Iuncus odoratus.

PRO Opopanace, Hammoniacum, vel Ga

banum, vel Sagapenum, vel Bdellium, lib

2. ad Glaucanem in curando ſcirrho.

Ocimo garyophyllato, Meliſſa in affectibus cor

dis.

Oleo Laurino, Pix liquida, licet illo inferior

vel oleum Cedrinum, vel Cicizum, vel ve

tus, vel oleum ex lucerna cum cera. Galen

lib. 1. comp. ph. part. vel coctum (ſic enim

tenuius fit, & veteri ac Cicino ſimile) ve

ſordes lucernarum luti craſſitie. ibidem.

Oleo Roſato, Violatum, Nymphae: Amygda

linum autem loco Roſacei boni, id eſt, ex

multis Roſis cum oleo omphacino inſulſo

facti, lib. 3. comp. phar. part. inſio.

Oleo

Oleo Ricinino seu Cicino, Raphaninum.

Opobalsamo, Opocarpasum Gal. vel Myrrha
staete, vel liquor Myrri.

Oryza, Hordei farina.

Ossypo, medalla ceruina.

Omphacio, succus Rheis, vel vinum auste-
rum.

P R O Pipere longo, album: pro albo, nigrum
optimum, id est, grauissimum, & contrà, 4.
sanit. tuend.

Periclymeni fructus drachmis tribus, radicis
eiusdem drachma tres, lib. 9. comp. phar. part.

Phœnicobalanorum pinguium carnis drachmis
tribus, Palmule seu Dactyli tres, aut sex, Gal.
lib. 7. comp. phar. part. in arteriac. 15. An-
dromachi.

Psyllio, Lens palustris.

Petroselino Macedonico in Theriaca, alterius re-
gionis Petroselinum, Galen. lib. 1. Antid.

P R O Resina fricta, Pix, aut Pix Brutia, Gal.
lib. 9. comp. phar. part.

Rubigine, Scoria ferri.

Raphani seminis drachmis decem, succi eiusdem
cyathus unus, Gal. lib. 9. comp. phar. part.

Rosis, flos Rosarum, vel contrà, Galen. lib. 6.
comp. phar. part.

Rhoëcoriario, Rhus obsoniorum; & contrà,
Gal. lib. 6. comp. phar. part.

P R O Staphide agris, Pyrethrum.

Spodio Gracorum, cinis super fornacem auro-
riam inuentus, melior quàm Ebur vsum,

quod nescio cur hodie Barbari Spodium
cent.

Syrace, Castorium.

Sale Indo, Saccharum candefactum.

Sagapeno, gummi Cedri, Hammoniacum,
sua picea sicca.

Spuma Nitri, Nitrum molle, vel Aphro-
trum. Gal. lib. 3. comp. phar. part.

Sulfure vivo, flauum velustum & purgatum.

Satyrio, semen Eruca, vel Scincus, vel contra

Sinapi, Cardamomum vel Cardamum.

Scammonio, Ricinus.

Sibio contuso, squama aris, Rannumustum.

Sepia ossa, Pumex.

Serapiade, Paonia radix.

Scilla, Bulbus.

Struthio, in sternutamentis, Elleborus albus.

P & O Terebinthina, laricea dicta Resina,
propemodum similis, Gal. 1. lib. comp. ph. ge

Thapsie succo, Chamaleontis nigri succus, &
Nasturtium; vel Nasturtii aut Eruca
minis pondus aequale; licet illa sint xul
inferiora Thapsia. Galen. lib. 1. comp. pha
part.

Tamaricis succo, succus Sambuci. Gal. lib.
comp. phar. part.

P R O Veratro albo, nigrum.

Visco quercino, Chamaleon niger.

Vino Falerno, aliud quod uis colore fuluum. su-
stantia tenue, ut perluceat, & sit odor
vehementer, ut Arisum [vel Ariusum
ex Chi

ex Chio, Lesbium, ex Mitylene, Cresso, Methymna, & Imolites; Galen. lib. 1. comp. phar. gen.

Pro Zedoaria, Aristolochia.

Lingibere, Pyrethrum.

Αὐτὰρ ἀπόρροα, vel horum aliqua vel alia, potest quavis regio noua, desideratis facultate officia facere, doctorum medicorum consilio: iam si Arabibus & Gracis pro Sinapi Cardamomum, fortè ipsis frequentius, licet substituere, quidni pro Cardamomo frequentissimum nobis Sinapi usurpabimus? praesertim cum ut pro Giniamomo Cassiam, sic contrà pro Cassia Cinnamonum assumi probauerimus: idemq; in aliu faciendum puto. Ob id Galenus lib. 7. simplicium, Melissophyllum (inquit) Marrubio facultate simile, sed ipso multò imbecillius; ob id Melissophyllo utitur nemo. Nam absurdum fuerit, praesente ubique terrarum magno Marrubii prouentu, uti Melissophyllo. Si cui verò ad manum non fuerit Marrubium, Melissophyllo uti poterit, obseruata eius pra illo imbecillitate, ut ob id quantitas eius augeatur. hac Gal. Quae ratione pro Cinnamonò duplum Cassia optimè miscemus medicamentis, ut quantitate qualitate imbecillitatem redimamus.

Qua igitur apud singulas gentes sunt copiosa, modò sint facultate proxima his qua desiderantur, quia facilio a sunt parata, ponantur: ut in Asia in frigidis capitis affectibus, aut in declinatione calidorum, rustici Cedrio dicto

464 DE SVCCED. QUID PRO QVO.

utuntur : eius panuria Pisselao , id est, Pice
 Oleo mistus liquida forma: interdum etiam C
 drario & Pisselao simul magis & minus misti
 prout vires eius intendere student. Hoc aute
 linunt sinciput, nares, frontem, aures, & qu
 busdam plantam & sedem. Gal. lib. 2. comp
 phar. pari.

Sed videtur Antiballomenis non egere, qu
 magna cura iam simplicia generis omnis i
 promptu habeamus: imò maximè egemus, cum
 multa simplicia veteribus laudatissima (v
 Theriaces compositio docebit) hodie nobis pa
 rùm sint cognita. Quae ubi certa erant, his vlen
 dum potius, quàm Antiballomenis. Ut eni
 pluris est equo domini oculus, quàm equisoni
 industria; pluris agro domini vestigium, quàm
 villici stercorisatio; pluris familia paterfami
 lias, quàm procurator; pluris prator, consul
 rex, pastor, quàm proprator, proconsul, pro
 rex, mercenarius: sic pluri tribuendam puto hi
 quae maiores magno delectu & ratione optima
 in compositiones cooptauerunt, quàm quae illo
 rum loco coacti adoptamus. Hec haecenus ex
 Iacobo Silvio.

PETRVS COVDEBERGIVS
PHARMACOPOEO.

LIBELLVM hunc , Pharmacopœe candide , denuò percurrissem , atque exactiùs ruminassem , loca agrota reliqua leniendo , ac nubila Scholiis illustrando , extremam illi manum adhibens ; nisi otium , opusculi angustia , typographi quoque commoda occasio , atque immatura quodammodo frugis extorsio , perorare me , atque vela ventis committere coëgissent. Omnia itaque hæc , cum obiter saltem , ex tempore , & tamquam ex transcurso tibi tradantur (etenim ne tantillum quidem à Pharmacopœo vestrae farine homine , cuius tamen propriè muneris est , hætenus nostro seculo produsse cognoscitis) æquo sunt consulenda animo , dum meliora dare Deus permiserit.

FINIS.

V S DE

SVCCEDANEORVM COLLECTANEA

MATTHIÆ LOBELII,

aucta & recognita, ex classicis auctoribus,

IMITATIONE RONDELETII,

*e cuius Fragmentis & Praelectio-**nibus haec ferè decerpta sunt.*

CV MATtentiore lectione animaduertissem vulgatum SVCCEDANEORVM libellum, quem nonnulli Galeno, alii Paulo acceptum ferunt, scaterere mendis, & plerisque locis mutilum esse; utpote qui ex Græco in Arabicum, & de Arabico sit denuò Latinè versus, aut potius peruersus, à Mauro quopiam, vel Mauro Græco, qualis fuit & Actuarius; visum fuit, quæcumque Dioscorides, Galenus, Aëlius atque Paulus litteris mandassent, experimentaque tum veterum tum recentiorum confirmassent, seligere; eaque sic digerere, ut quid alteri cuius æquipolleat, studiosis in posterum patêret.

Hunc autem libellum neoterici cuiuspiam esse, vel id plus satis arguit, quòd nonnulla addita inibi sint, quæ Galeni tempore ignota fuere, uti Anacardia, aliaque complura: nullo tamen ordine aut delectu, ac sine iudicio. Ut, quòd fortè
Cha-

hamamelini legerant alicubi, nominis
 recepti affinitate, Melinum subdiderunt;
 quàm inscitè, nullus est qui id ignoret:
 ludenim laxat, & moderatè calfacit;
 hoc verò refrigerat, asstringitque. Ea-
 dem ineptia, quòd fortè Cepam Portu-
 gicam similem legissent, illius vires huius
 facultatibus responsuras putârunt. Iridem
 leporem fluuiatilem Cancris loco vsurpa-
 verunt; vel vt alius quispiam correxit, mari-
 num, indoctè: vt qui ignorasse videatur,
 Cancrum alimentum & antipharmacum
 esse; Leporem verò [marinum] vel odore
 vomitorium, & venenum. Nec hoc
 balsum solummodò, at & discriminis ple-
 num, cum loco Opobalsami Opocarpa-
 son substituunt, quod venenum frigi-
 dum est Dioscoridi, vinoque, vt Cicutâ,
 expugnandum, teste Galeno, libro De an-
 tidotis. Verùm si hîc Carpason legamus,
 vera fuerit lectio: est enim tenuium par-
 tium. Cinnamomo item Behen rubrum
 respondere nequit. Neque placet ordo
 seriesque collationum: nam olea oleis,
 non resinis aut aquis sunt conferenda; vt,
 quoad eius fieri potest, sint simillima.
 Deinde, si non licet ex specie proximâ,
 saltem è genere, cum abundemus probis
 remediis. Nec parui facio regionum vbi
 nascuntur proprietates: veluti Cretica-
 rum plantarum, quas Italicis efficaciores

puto; nisi squalida admodum aut retorrida fuerit ætas, quæ deficiente alimentoplasma tabefacit: tum enim Polium Italicum, aut Stœchas non cedunt Cretico aut è Stœchadibus insulis.

Imperitię fatuæ est, substituenda præcipere rarioribus inuentu, ea quibus careamus, aut adulterata; vt loco Cinnamomi, Amomum. Infantiæ itidem, vbi abundamus Lactucâ, Opocarpium optare. Licuerit tamen, si qua sint rariùs obuia, aut minùs trita, eorum loco v'surpare vtriusque similia; vti Terebinthinę veræ loco, Lentisci Resinam, quia frequentior est.

Cùm autem Succedaneis vti non raro cogamur, nec enim omne fert omnia solum; nec vbiuis medicamenta opportuna occurrunt: (ruri enim *diapoeisis* siue facile parabilibus vtendum; & cùm medicamenta necessaria ad repentinos casus ad manum minimè sint, præsentibus vtendum) eligenda erunt quæ nostris simplicibus substitui possunt: vt Galenum fecisse legimus; cui Euphorbium cùm ad spicula, aculeos & infixæ eximenda deesset, ex alueariis Propolin pro Euphorbio felici successu v'surpauit.

Succedaneorum verò vsus hodie magis est necessarius, quàm vmquàm fuit; cùm multis quæ antiquis in regionibus suis exortiuis & exoticis diues & vber prouen-

tus

us sufficebat, hodie careamus; tum suppositicia, Hebræorum & mercatorum vafro ingenio adulterata, transuehantur; quæ si reiicienda, alia substituere necesse est. Adhæc pleraque prisca simplicia medicamenta exoleta antiquitus notissima & vſitatissima, hodie ignorantur.

Permultæ Arabibus excogitatæ & vtilles inuentæ cōpositiones, efficacissimaque remedia in vſum recepta: quorum simplicia, barbarie vocum, nobis prorsus ignota sunt. Quid enim nominibus illis barbaris significare voluerint, nescimus; aut illis caremus. At in Succedaneorum delectu & vſu, pessima illa medicorum consuetudo merito reiicienda, quæ iam à multis annis inualuit, magno ægrotantium incommodo; qua in cōpositione remediorum omnia quæ commendata sunt vel ad morbum, vel ad partem affectam, vel aliquod symptoma, congerunt temerè; & cū omnia similia vſurpârunt, haud habent amplius quod pro ea herba aut medicamento substitui possit. Quod si vna, duabus, vel tribus herbis contenti essent, numquam Succedaneo destitueretur pharmacarius. Sin autem quantitas necessaria foret, pro manipulo adde duos, pro duobus tres vel quatuor. Hinc duo consequentur commoda; certior medicamenti operatio, faciliior & citissima præparatio;

pluribus remediis & Succedaneis, summus
 artis Medicę ornamento, abundabit medicus;
 cui iterare, immutare, supponere phar-
 maca licebit, & plus quàm vulgus Medi-
 corũ & Clinicę sapere. Vt si in suo decocto
 Farraginem præscribat; ea si defuerit, Bu-
 glossum agreste substituere, vel contra
 si Scariola defit, succum substituere vel
 syrupum licebit: si Cichorium, Den-
 leonis, vel Endiuia; si Chamępitys, Cha-
 mædrys substituantur, si defit; vel contra.
 Sed quid faciet, si omnia congerantur in
 vno eodemque medicamento? certè nihil
 aliud erit, quàm poëticum illud Chaos
 Rudis indigestaque moles.

Illud Villanouani ante oculos voluant
 Vbi in promptu habentur simplicia, de-
 lum esse si quis compositis vtatur.

A praua igitur consuetudine recedant
 & illos tamquam scopulos vitent: caueant
 item malos, auaros, improbos, impuden-
 tes pharmacarios & circulatores, qui num-
 mi & lucri rapaces, farraginem medicamē-
 torũ etiam semipurridorũ inter se pugnā-
 tium collaudant. Quidam hoc faciunt, vt
 copiam ostendent, vel ignorantia, vel su-
 perbia; & aliqui docti, ne videantur in re-
 mediõrum cognitione minùs exercitati.

Blaces quidam medicaſtri, impostores
 nobiles, populares agyræ, histrionesque
 Hippocratici, Aureiue Aureoli Theo-
 phraſti

phraſti aſelli (cuius tamen documenta vix ſummis deguſtârunt labris, quosque magiſtri pudet: quemque neque agnoſcere neque tutari audent, ne apud doctos, & vulgus, ob circulatorum, qui falſo diſcipulos Theophraſti ſe gloriantur, illuſiones & technas malè audiant) ementitam, irrationalem, garrulam, pertinacem, perfrictæ frontis impudentiam, mordicus nouam philoſophiam effatiunt, obblaterant, & pro ſua oſtentant; Panaceâ fœdâ vnicâ, ſiue decocto parato ex omni confuſâ herbarum, etiamque deleteriis, nullius delectûs, inter ſe ex diametro pugnantium, malignâ & infauſtâ ſideratione collectarum, farragine, additâ Senâ, Cinamomo, Saccharo, & huiusmodi, ad ſaporis gratiam, pro vniuerſali omnium humorum, anili medicatricum & obſetricum cohorti notiſſimo, freri & contenti, ad omnes morbos, quos Ariſtotelicis & Hippocraticis ſectatoribus incurabiles iactitât, à ſe viginti quatuor horarum ſpatio percurari poſſe, ilicò vtrique & vbiuis pollicentur; impoſturâ, ſupinâ audaciâ, & gnathonicâ adulatione, nullis interdictis aquis noxiis, & quibus morbi fouentur, eduliis.

Huiusmodi homines potiùs ſcuticâ digni ſunt, quàm papyri & temporis iacturâ in deſcribendis illorum ineptiis,
men-

mendaciis & imposturis. In illos sanè Reges, Leges, & Medicorum celeberrima Collegia deberent animadvertere, eosque ex Republicâ propellere; doctos autem viros fouere & erigere: qui (proh dolor) hodie multis locis pereunt, & haudquam ab improbis & indoctis logodactylis scamnidicis discernuntur.

Porro cùm sint quædam compositiones viles priscis medicis excogitatæ, experientiâ & ratione receptæ & comprobatæ, nonnulla Succedanea inuestigare, agnoscere, & sufficere oportet, vt parari possint nobilissima pharmaca, quæ eâ ratione minimè excludenda & reiicienda: cùm non tanta infelicitate Succedanea quædam illis non inferiora interdum æquè bene expleant omnes pollicitationes genuini medicamenti.

SVCCEDANEA, quantum fieri potest, eiusdem sint generis & speciei.

Rondelet. Herba pro herba.
 Radix pro radice.
 Flos pro flore.
 Semen pro semine.
 Succus pro succo.
 Lachryma pro lachryma.
 Resina pro resina.
 Muccago pro mucagine.
 Metal-

IMITATIONE RONDELETII. 473

Metallum pro metallo.

Lapis pro lapide.

Terra pro terrâ.

Pix pro pice.

Axungia pro axungiâ.

Medulla pro medullâ.

Auis pro aue.

Serpens pro serpente.

Pars animalis pro parte.

COMPOSITIO PRO COMPOSITIONE.

Puluis pro puluere.

Trochiscus pro Trochisco.

Opiata pro opiatâ.

Electuarium pro electuario.

Pilulæ pro pilulis.

Eclegma pro eclegmate.

Tabella pro tabellâ.

Confectio pro confectiione.

Conseruatio pro conseruatione.

Syrupus pro syrupo.

Emplastrum pro emplastro.

Oleum pro oleo, siue simplex,
siue compositum.

Vnguentum pro vnguento.

THEO.

THEOREMA VNIVERSAL
VEL COMMUNE.

Medicamentum

quod substitui
debet, siue in-
ternis, siue ex-
ternis conueni-
re debet: nempe

Viribus occultis, ma-
festis, & consisten-
tiâ.

Sit etiam simile in

Sapore,

Odore,

Ætate,

Natalitiis & regione

Natura & tempera-

mento.

Nonnulla in externis remediis suppo-
nuntur, quibus in internis vti non licet:
vt succus Carpathi substitui potest pro La-
ctuca succo in externis; cum tamen ve-
nenum sit, non introsumitur.

Non totum simplex, sed aliquæ partes
substituuntur.

Vt Muccago seminis Psyllii, pro mucca-
gine seminis Cydoniorum: non totum
semen, quia pars interior temperamento
differt à muccagine, & venenata putatur.
Neque etiam Cydonium malum conuenit
pro semine suo, quia viribus & consisten-
tiâ differt.

Formula quædam in quibusdam reme-
diis sibi mutuo succedunt: vt,

Conseruatio, pro syrupo eiusdem sim-
plicis,

plicis, fuctus, floris vel radicis.

Conseruatio Capillorum Veneris, pro syrupo in opiatâ substitui potest: Sed in syrapi consistentiâ non potest; quia remedii formula non patitur.

Pro liquidis liquida substitui debent: quare deficiente syrupo, aqua vel herbæ decoctum substituatur.

In quibusdam conditis supponere licet syrupum conseruationis; quia in syrupo conseruantur. Vt syr. Conseruationis Citri, pro syrupo è corticibus Citri. Syr. Conseruationis radicis Buglossi, pro syrupo de Buglossio.

Emplastris item pro Vnguentis uti licet; & contrâ, modò pars affecta assentiatur: ut Emplastro filii Zacharię, pro vnguento Resumptiuo; & Resumptiuo, pro emplastro. In thoracis verò affectibus, nisi dissoluantur aut malaxentur, non vtendum, quia emplastra imposita dilationem costarum & respirationem impediunt.

Emplastrum è Cerusa, pro Vnguento albo, nisi inflammatio prohibeat: quæ neque dura, neque graua ferre potest.

VARIA ALIA MEDICAMENT

PRO ALIIS SVBSTITVERE LICET,

modò vires correfpondeant.

Pilulæ pro Confectionibus, & Confectiones pro pilulis vt,

Hiera fimplex pro Pilulis de Hiera Benediâta; & contrâ.

Et pro pilulis Pituitofis, Electuariũ Diacarthami, de Citrofolutium.

Pro Biliofis, Electuarium de fucco Roſarum, & contrâ; obſeruata cuiusque quantitate. Hieræ & ſimilium Electuariorum doſes augendæ, ob mellis molem, quæ medicamento vires minuit.

Syrupus pro Eclegmate, ſi lambendo aſſumi debeat: vt

Syr. Iuiubarũ, pro Lohoch ſano & experto.

Syr. è Papauere, pro Diacodio.

Puluis pro Trochiſco, & contrâ: vt

Diarrhodon pro Trochiſcis diarrhodon.

Trochiſci de Squilla, pro Eclegmate de Squilla; auctâ vel imminutâ quantitate, pro ratione, indicatione morbi, & ſcopo medici.

In ſimplicibus partes aliquando religioſè non obſervantur. vt

Turbith pro Agarico trochiſcato, & contrâ. Hic fimplex pro composito ponitur, vel compositum pro ſimplici.

Pre

Pro Agarico Colocynthis, in minori
quantitate. Carthami duplum & triplum,
pro Agarico; & contrà.

Difficile tamen inuentu simplex medi-
camentum substituendum, quod verè vn-
dequaque omniq̃ue ex parte conueniat, vt
testatur Auicennas in suo Canone; vbi vix
reperies duo simplicia medicamenta, quæ
aliorum facultate similium pænuriâ, sub-
stitui tutò possint. Quod cùm difficillimū
foret, ille aliquando duo, interdum tria,
pari pondere & mensura, nonnunquam
duplicato & triplicato, addita quinta aut
octaua parte alterius medicamenti, suppo-
nit. Quia paucissima sunt medicamenta,
quæ omnino simile temperamentum obti-
neant, aut eandem consistentiam, crassi-
tatem, tenuitatem partium, & propieta-
tes occultas.

Variis in compositionibus est medica-
mentorum vsus.

Vel ob calorem, frigus, humiditatem,
siccitatem; in principio primi, in medio
& primo gradus, & sic de aliis.

Vel ob partium tenuitatem, vel crassi-
tatem, lentorem, saporem, odorem, colo-
rem: quare id quod temperamēto respon-
det, sæpe diffidet crassitie vel tenuitate par-
tium; vel alia facultate. vt pro Asaro Aco-
rum substituendum censent. At in omni
operatione non conuenit: non enim om-
nia

nia potest Acorus quę Asarum. Urinas quędem & menses ciet : (quare in vreticis tantum supponendum :) vomitum vero excitare, aquasque educere, vt Asarum, nimè valet.

Eadem ratione Hyacinthus pro Anchusa substituitur: Sed si ob colorem Anchusa opus sit, vt in vnguentis, Hyacinthus non conueniet.

Eius verò loco Lacca supponitur, vnde Brasilia, Santala rubra, Lacca pictorum vel Coccus baphica.

Assa dulcis pro Fœtida non conceditur propter odorem, vt Auicennas substituit in affectibus vteri; quia odore iucundo vterum sursum alliceret: sequitur enim odorata vterus, fugit fœtida.

Propter saporem quædam vsurpantur sed non conueniunt vnde quæque.

Pro Saccharo Mel & Manna substituitur poterit in quibusdam remediorum formulis, vt in medicamentis laxantibus, nimè autem in adstringentibus, quia Manna ventrem soluit magis quàm Saccharum vel Mel.

Muccus utilis est in fluxu sanguinis, ob lentorem vsurpatur Fœnum græcum quod muccaginem reddit, sed calidam ideo in sputo sanguis reicienda, quem admodum in externis remediis, vt ophthalmiæ, in qua Ovi albumen præfertur qui

quidem in principio & incremento; in statu verò & declinatione muccago Fœnu-nugræci commendatur.

Quæ supponuntur, non in omni formula remedii substituuntur: vt

Myrrha pro Bdellio, in pilulis & vnguentis:

Sed in pilulis è Bdellio, nullo modo conceditur, quia sanguinis fluorem & hæmorrhoidarum, vt menses Myrrha, elicit.

In **SUBSTITVTIS** igitur hæc obseruare oportet, vt supposititium in locum adulterati, genuini pænuriâ, eadem efficiat quod ipsum genuinum præstabat.

Vt si calfaciebat, refrigerabat, humectabat vel siccabat, adstringebat, vel laxabat, vel concoquebat.

Pro Absinthio simpliciter dicto in compositionibus Græcorum, Seriphium vel Santonicum.

Pro Absinthio è Pontō vel Tauro monte, Romanum.

Pro Romano, illius loci vbi habitas.

Hoc licet in omnium herbarum delectu præstare, quæ sunt alicuius regionis [propriæ;] modò illam ipsam herbam regionis finitimæ, vel saltem simillimæ, assumas. Cuiusmodi est *Craux* vulgò Gallo-Prouinciæ, siue Creta, vbi Thymus nostrâs angustifolius & Epithymus optima & copiosissima.

Secun-

Secundo loco herbæ regionum humidarum, modò estas squalida aut sicca fuerit, in locum calidarum substitui possunt. Quod fecisse se Galenus docet præparatione Theriaces.

Pro Macedonico Petroselino, Petroelinum alterius regionis.

Sed regionis similitudinem obseruare oportet: nam regio auget vel minuit medicamenti efficaciam & bonitatem.

Pro Iride Illyrica, Venetam sumemus;

Pro Africana Florentinam.

RADICES.

Pro { Rhapontico, Radix Centaurii minoris, vel nostri Rhabarbari magma, siue Rhabarbarum alios vsus prius infusum, & expressum. Rhabarbarum torrefactum improbatur à multis, propter empyreuma.

Zingibere, Costus; & contrà: v. Helenium, & Pyrethrum.

Costo, Pyrethrum.

Aristolochia Longa, Rotunda; contrà: vel vna pro omnibus.

Acoro, Calamus aromaticus officinarum; & contrà.

Acoro, (in laxantibus & cientibus vrinas & menses;) Radix Asaræ

Asaræ

Asaro, (quando purgare, & vomitum ciere opus est,) Elleborus, semen Genistæ & Raphani; vel hæc tria simul.

Galanga, Cyperus rotundus; & contrâ.

Calamo odorato Libani, Schœnanthum, Calamus siue Acorus officinarum: si ad odorem solum, Santalum citrinum officinarum.

Althæa, radix Maluæ hortensis, vel sylu.

Pro { Asparago altili, Corrudæ, imminuta quantitate, quia acrior & efficacior.

Rusco, Radix Asparagi; & contrâ. Cortice radice Capparis, Cortex radice Tamarisci, Sambuci, Ebuli, Populi & Lauri.

Apii radice, Petroselini, vel Macedonici.

Gentiana, medietas Asari & radice Capparis.

Turbith, Thapsiæ radix, siue Turbith Mesuæ, Agaricus trochiscatus, vel Colocynthis, minore dosi.

Zingibere, Mechin.

Serpentaria, Iarus, Dracunculus.

Lapathio, Oxalidis radix.

X Rha-

Pro { Rhabarbaro ad laxandum, succum
Rosarum.
Rhabarbaro ad astringendum, Hy-
drolapathi radix, vel Galang-
maioris, si calore opus est; si re-
frigeratione, radix Bistortæ.
Nardo, Nardi species.
Secacul, radix Pastinacæ marinæ.

SVCCEDANEA, QVANTVM

FIERI POTEST, SINT SIMILIA

*omni ex parte, viribus, genere,
& specie. ut,*

Omnes Dauci spe-	Calaminthæ,
cies,	Cepæ,
Intubi,	Chelidonii,
Adianthi,	Costi,
Condrillæ,	Nardi,
Hieracii,	Betæ,
Rumicis,	Bliti,
Absinthii,	Iuniperi,
Abrotoni,	Sabinæ,
Sideritidis,	Cedri,
Aconiti,	Rhamni Dios.
Veratri,	Myrti,
Anagallidis,	Piperis,
Anchusæ,	Cyclaminis,
Anemones,	Ranunculi,
Asparagi,	Hederæ, excepta
Brassicæ,	Hederula terrestri,
	Rutæ,

luta,	Heliotropii,
eseli,	Origani,
pii,	Aristolochiæ,
osmarini,	Valerianæ,
larrubii,	Bituminis,
eucoii,	Picis,
orcheos,	Resinæ,
laluæ,	Allii,
olygoni maris &	Porri,
feminæ,	Plantaginis,
ymphyti,	Panacis,
ribuli,	Pastinacæ,
ubi,	Lychnidis
quiseti,	Conyzæ,
rticæ,	Nymphææ,
ithymalorum,	Anthemidis,
lcurialis,	Verbasci.

Et denique omnes, nisi quid proditum
 habeat: ut de Clematide; quarum Al-
 ram vrere, ventrem laxare, bilem, pi-
 titam trahere scribit Dioscorides: Prior
 erò [Clematis] alui profluvia & dysen-
 terias sedat.

Sic Cucumis agrestis, & sativus, Pe-
 & Colocynthis. Sed hæc paucis eueni-
 solent.

De PARTIBVS etiam obseruandum.
 Nam aliquæ facultatibus differunt: ut ra-
 x Medii menses decocta sistit, per ali-
 quot dies sumpta: semen autem in vi-
 o sumptum, menstrua pellit.

X 2

Iuni-

Iuniperi fructus introsumentur ;
menta verò occidere produntur.

Coriandri herbæ succus interficere
dicitur; semen verò medicatum.

Qua ratione medicos minimè vniu-
erſalibus, ſed potiùs particularibus niti
ſtaret. Nam eorum plerumque eſt maxima
differentia, quæ eadem eſſe putantur.

Sume igitur

Pro Folio Indo, & Malabathro, f.
Citri, Canellæ vel Malabathri vulgati
vel, vt alii, Macin, aut Spicam.

Pro foliis Lauri, Citri folia.

Papaueris albi, Solani folia, Papau-
nigri, minore quantitate; vel Hyoſci-
ami albi.

Lactuca, Scariolam; & contrà.

Cichorio ſylueſtri, Dentem leonis.

Pro Eupatorio, Aſarum, & dimidium
ſinthis.

Pro Struthio, Nucem vomicam, & tertiam
partem Piperis, Auicennæ.

Pro Diſtamni prima ſpecie, ſecunda
tertiam; vel Pulegium Ceruinum.

Calamentha montana prima, ſecunda
& tertiam. Sic de ſimilibus.

Pro Chamæpity, Chamædryn, & folia
patorii.

Malua ſylueſtri, horrenſem.

Malua arboreſcente, Althæam.

Thlaſpi, Naſturtium.

M

mentha, Balsamitam
 legio Regali, Ceruinum; & contrà.
 pidio Pauli Æginetæ, Drabam, vel Iberi-
 da, vel Nasturtium.
 yllitide, Asplenium siue Scolopen-
 drium, Ceteráchve; & contrà.
 oliis Oleæ } Folia { Nucum Iuglandis,
 1 Lentisci } Cupressi,
 } Pini, vel Pinastri
 oliis Myrti { Baccas Myrti, vel Iuglan-
 } dis nuces immaturas.
 hymo, Saturciam, vel Origanum.
 ata syl. Rutam domesticam siccata, &
 maiori quantitate; vel contrà.
 pica Lauendula, Lauendulæ species hor-
 tenses.
 diantho, Saluiam vitam, Polytrichum,
 Adiantum nigrum Plinii: in asthma, &
 Violæ par pondus, cum medietate Gly-
 cyrrhizæ.
 elephio, Portulacam.
 ortulaca, Umbilicum Veneris.
 oliis Terebinthi, Lentisci folia.
 oliis Oleastri, Oleæ folia.
 oliis Sambuci, Ebuli; & contrà.
 etonica, Verbenacam.
 telissa, Marrubium, Corticem Citri; &
 contrà.
 pio montano, domesticum siccum, in
 maiori dosi.

486 DE SVCCEDANEIS

Cepæa, Portulacam.

Nardo montana, Nardum Gallicam.

Philyreæ foliis, Olex folia; & contrà.

Foliis Caprifici, Ficus domesticæ folia
contrà.

Thymbra, Thymum vel Serpillum.

Coriandri foliis, Petroselini horto
folia, in externis remediis tantum.

Hippomarathro altero, Coriandrum
Petroselinum domesticum.

Foliis Dauci, Pastinacæ agrestis vel do
sticæ folia.

Conyza prima, secundam.

Conyza secunda, tertiam, maiori quan
tate, & siccata.

Sanguinalis feminæ foliis, folia maris
contrà.

Hippuride prima, secundam; & con
Semperuiuo maiore, paruum Umbilic
Veneris; & contrà.

Foliis Labruscæ; domesticæ Vitis fe
minis cultæ.

Chamelæa, Thymelæam, Chamæpi
primam Dioscoridis, Laureolam.

Alsinæ foliis, Helxines folia; & con
Vite alba, nigram; & contrà.

Bubonio, siue Inguinaria, siue Ast
Attico, Antirrhinum; & contrà.

Foliis Sabinæ, folia Cupressi, Iuniperi
Cassiam.

Dorycnio, Mandragoram; & contrà.

Di

Draguntio, Arum.

Foliis Abietis, Populi folia.

Erysmo, Erucam; & contrà.

Foliis Hippolapathi, Lapathi folia.

Foliis Picæ, folia Pini.

Lathyridis foliis, Tithymali folia.

Libanotide sterilis, folia Libanotidis coronariæ.

Lepidii foliis, Nasturtii folia.

Nymphæa alba, luteam; & contrà.

Sorbi foliis, Mespili folia; & contrà.

Oxyacantha vera, Pyrastrum.

Foliis Pepli, Tithymali folia.

Pityusæ foliis, Tithymali folia.

Polygoni maris foliis, feminæ folia.

Filiæ femina, marem.

Seride, Condrillam.

Smyrnio, Apium aut Petroselinum.

Solano hortensi, Halicacabum.

Symphyti Petræi foliis, alterius folia.

Pro Beta alba, nigram.

Pro vnius speciei Tithymali foliis, folia aliorum, in laxando.

Pro Tragorigano, Origanum; & contrà.

Pro foliis Tribuli terrestris, in refrigerando, folia aquatici; non in humectando.

Pro Hypecoi foliis, folia Papaneris.

Pro Verbasci vnius foliis, aliorum folia.

Pro Spicâ Indicâ, Syriacâ, Valerianam.

Pro Viricis foliis & semine, Rutæ folia & semen.

X 4

Pro

488 DE SVCCEDANEIS

Pro Seridis foliis, Lactucæ folia.

Pro Myrto alba, nigram; & contrà.

Foliis Myrti, folia Pyri siluestris, Samachi, Lentisci, Sorbi, Cydoniorum & Cotinos.

Pro Semperuiuo, succum Lactucæ, & Solani Colocynthide, triplum Cucumeris asinini.

Pro prima specie Calaminthæ, secundam; pro secunda, tertiam.

Pro Buglosso siue Boragine latifolia, Buglossum angustifolium.

Pro Soncho læui, Sonchum asperam; & contrà.

Pro Fumaria, Senam.

Pro Hyssopo, Origanum, Sampsuchum.

Pro Hyperico, Androsæmum, Ascyrum, Schœnanthum.

Pro Stœbe Diosc. Stœben herbariorum, Iaceam, Scabiosam, Pastoriam bursam, Bellides, & Gnaphalia.

Pro Halica Aucnæ, ptisanam totam.

Pro Amylo, farinam siliginis siccam.

T A.

TABVLA PRIMA, REFERENS CAPSVLAS
RADICVM ET CORTICVM.

5	Costvs.	Cinnamomi sive offic. Cassiatenuis	Cortex inter- nus Nucis Moschatæ	Alarum	
4	Zedoaria	Cassia siue of- fic. cinnamo- mum crassum	Nux Moscha- ta.	Schœnan- thum	pro Corti- ce Turis
3	Zerum- bet	Phu	Macis	Spica Nardi	Cortex Pini
2	Mequin.	Anthophylli	Pro Folio malobathri	Spica Cel- tica	Cortices Lentisci
1	Pro Zin- gibere.	Garyophyllis			

Cortic. Quer- cus	Cortic. mali Granati.	Cortic. My- robal. Citri- narum
Ilicis	Cortex Nucis Englandis	Kebularum
Suberis		Indarum
		Emblicarum
		Bellericarum

In hac tabella primùm reposuimus Zingiber, quia frequentius eo utimur quàm Mequin (quod species est Zingiberis:) fortè alterum pro altero sumatur, nihil inde mali sequeretur. Zerumbet, Zedoaria & Costum in ultimis capsulis reposuimus, quia eis minùs frequenter utimur. Hoc modo medicamentis dispositis, multo minori negotio medicamenta parabuntur; ut quæ frequenter in compositionibus simul ponuntur, simul inueniantur. Adde quòd hæc medicamentorum dispositio, ἀντισταθμίζουσα indicabitur. Nam quæ in prima capsula ponuntur, pro secunda poni possunt; & eò contrà, diminuto pondere. Cùm dicimus quantitatem augeri.

augeri, nolumus duplum substitui; quia hæc medicamenta non sunt duplo fortiora; quamquam pro Cinnamomo duplum Cassiæ iusserint antiqui substitui: nam si medicamenta sint adeò imbecilla, satius est eis non uti, quàm duplo pondere substituere ea: moles enim medicamenti augetur, & vis aliorum medicamentorū minuitur. Ut omnia medicamenta ordine digerantur, oportet locū in multas classes diuidere, & in vna classe partes superiores atque inferiores. In iisdem classibus distinguenda erunt medicamenta calida, frigida, sicca & humida, tam simplicia quàm composita.

CAPSVLA RADICVM SECVNDA.

				Hermocdactylus	Asphodeli
				Arist. long.	Aristolochia rotunda
Costus dulcis	Pistolia	Clematis			
Arabum	Tussilago	Helenium	Iris Florentina	Pro radice Iridis Venetæ	
5	4	3	2	1	

Pro Asaro, Acori pars dimidia, sexta Amomi.

Acoro, pondus par Cimini, cum tertia parte Aristolochiæ.

Aristolochiâ rotundâ, Zurumbet pondus æquale.

Aristolochiâ longâ, Zurumbet pondus æquale, & medietas Piperis.

Cyclamine, æquale pondus Aristolochiæ, & sexta pars Seminis Citri, & Menthastris.

CAPSVLA RADICVM TERTIA.

5	Graminis						Glycyrrhizæ
4	Asparagi						Tussilaginis
3	Rufci	Oenanthes	Aristolochia omnis	Bryonia	Zedoaria	Cyperus	Helenii
2	Petrofelini rad.	Rubia maioris	Asari	Pyrethri	Coffi	Galangæ minoris	Venetæ radix
1	Pro Apio	Pentaphyllo.	Cappari	Mequin	Zingibere	Galangâ crassâ	Iride Florentina

Pro Gentianâ dimidium, Asari, & radice Cappari.
 Polypodio, Epithymi dimidium pondus.
 Testiculo, Vulpis, Scincus, & è contra.

CAPSVLA RADICVM QVARTA.

3	Cucumeris agrestis	Centaurei minoris	Polypodi	Ellebori vtriusque	Afari	Hermodylorum Asphodelorum
2	Asphodeli	Suc. Rosarum	Turbith	Ebuli	Cyclaminis	
1	Pro rad. Gentianæ	Rhabarbari	Agarico	Hermodyli		

CAPSVLA RADICVM QVINTA.

3	Boraginis	Maluarum	Thapsi barbati	Spondylii	Radix Vlmi
2	Buglossi	Bismaluarum	Bistortæ	Pancrati	Consolidæ minoris
1	Pro rad. Glycyrrhizæ	Liliorum	Quinque- folii	Squillæ	Pro radice Consolidæ maioris

CAPSVLA RADIGVM SEXTA.

1		Corticis rad. Lauri	Afari	Staphidis agriæ	Behen rubri
2		Cor. rad. Sam- buci, & Ebuli	Ari	Clematidis alterius, siue Flammulæ	Behen albi
3		Fraxini, vel Populi	Serpentariæ	Rad. Dentil- larie	Boraginis
4	Rubiae mino- ris	Tamarisoi	Raphani agrestis	Pyrethri	Buglossi
5	Pro rad. Ru- biæ maioris	Cortice rad. Capparis	Cortice Sam- buci		Glycyrrhizæ

TABVLA SIVE CAPSVLA SEMINVM.

1 2 3 4

5	Pro sem. Cu- curbitæ	Melonum	Citrulli	Cucumeris
4	Lactucæ	Portulacæ	Endiuæ	Scariolæ
3	Violarum	Papaveris albi	Papaveris ni- gri.	Hyoscyami
2	Bombacis	Malæ, B.f. malæ	Psyllii	Cydoniorum
1	Lini	Fœnugræci	Laurodulæ	Keyri rubri vel citriini

CAPSVLA LIGNORVM.

5	Citrinum Sant.	Xylobalfamum	Scobs Buxi
4	Rubrum Sant.	Surculi Len- tifici	Ebenum
3	Pro Santalo albo	Aspalathus	Guaiacum
2		Ligno Aloës	Echinæ ra- dic.
1			Salsaparilla

PURGANTIVM.

1. pro Scā- monio	2 Diacri- dium	3 Colo- cynthis	4 Ammo- niacum
Senā	Semen Car- thami	Folia Bras- sicae nari- nae	3 Sal gem- inae
Foliis Scā- monii	Thymelaeae	Chamaelaeae	2 Sal petrae
Semine he- derae.	Sem. Afari	Semen Ge- nistae	1 pro Sale nitro

4	Thymus	Chryfocol- la, vel fortè Chryfolith.	Elleborus albus	Alhan- dal	Coccus Cnidius	
3	Epithy- mus	Lapis Ar- menus	Ell. Niger	Diacti- dium	Semen Ca- taputiæ	Rhaponti- cum
2	pro Cassi- tha	Lapide La- fuli	Colocyn- thide	Scammo- nio	Rad. Ti- thymali	Myrobala- ni s.
1						Rhabarba- ro

Polypo- dium	Rhabarba- rum	Chamaëza	Esula
Turbith album	Lapathio	Thymelæa	Turbith
Turb. ci- neritio		Brassicâ marinâ	Polypodio

SEMINVM.

5	Capita Papaveris	Acetosa					
4	Semen Mandragorae	Portulacae	Citrulli				Semen Violariae
3	Semen Hyoscyami	Scariolae	Melonum	Bismaluae	Foenugraeci		Cnici
2	Papaveris nigri	Endiviae	Cucumeris	Maluarum	Lini	Psyllii	Urticae
1	Semen Papaveris albi	Lactuae	Cucurbitae	Bombacis	Sesami	Cyd-niorum	

SEMINVM.

5	Cumini	Pastin. syl.	Rutæ agrest.			
4	Carui	Pastinacæ domestica.	Rutæ domestica	Sinapi	Semen contra vermes	Sem. Paliuri
3	Fœniculi dulcis	Petroselinini	Ammeos	Erucae	Caulium	Hyperici
2	Anisi	Apii	Seseli Aethiopici & Peloponensis	Thlaspi	Rapæ agrestis.	Miliis Solis
1			Seseli Mafsiensis	Nasturtii	Rapæ domestica	Alkekengi

SEMINVM.

Piper longum	Cardamo- mi maio- ris	
Piper album	Cardamo- mi mino- ris	Granorum paradis
Pipere ni- gro		Cubebarum

Pro { semine Myrti, Berberis, & contrā.
Napi, Rapi.
Cathami, Vrticæ; vel Agaticus
non Trochiscatus.

3	Berberis	Sorbarum
2	Vuarum immatu- rarum	Mespilo- rum
1	Sabinæ albæ	Cornorum

Pro { Sem. Mâdragoræ, Cicutæ.
Semine Afari, Semen Ge-
nista.

SEMINVM ET FRVCTVVM.

5	Genistæ	Acerosæ	Gallarum	Cytini	Vua Corin- thia		Ficus
4	Asari	Citri	Sumach	Balaustio- rum	Passulæ mundatæ	Tamar- Indi	Sebesten
3	Sem. Hede- ræ	Berberis	Myrtillo- rum	Cortic. ma- ligranati	Dactyli	Prunis acidis	Iuiubæ
2					Pruna dulcia		Passulis mūdatis
1					Ficubus		

3	Oenanthes	Cichorei	Nymphaeae luteae	Sambuci, Abrotani	Corticum Glandis	Salviae
2	Myrti	Buglossi vulgaris	Nymphaeae albæ	Meliloti	Balaustio- rum	Stoecha- dis
1	Florib. Ro- sarum	Buglossi la- tif. sine Bor.	Violarum	Chamaemeli fol. Cha. flo.	Cytini	Anthos Sambuci

3	Leucoii albi	Flor. Cicho- rei	Spiceæ, vulgo <i>Aspic</i>
2	Leucoii rubri	Flor. Intubi domestici	Lauendulae
1	Leucoii lutei	Flor. Tama- risci	Flor. Salviae

DE SVCCIS.

Pro Acaciæ succo ; succus Prunellorum
probat, & Rhois Dioscoridis.

Dioscorides ipse succum Hypocistidis su-
stituit quidem ; verum aliquanto magis
adstringit & ficit, si in antiquorum
pharmacis recipiatur.

Pro Opio, Meconium, vel succus Lactu-
sylvestris, vel, domesticæ, quantitas
maiori.

Pro Absinthii succo, Abrotani, Eupato-
rii, vel Centaurei minoris utriusque
vel Agerati.

Pro succo Absinthii Pontici, nostratis Ro-
mani succus : differt tantum regionem
ut Macedonicum à Pontico. In exte-
nis remediis, Santonicum & Marinum
vel ablutum leuiter in internis con-
datur.

Pro Opobalsamo, Staete, id est, Sty-
liquida non adulterata, vel Oleum
Myrrhæ. In suffusionibus, ad digere-
dum, Oleum Spicæ Lauendulæ, quo
æquè tenuium est partium.

Pro Glycyrrhizæ succo, infusum & d-
coctum eiusdem ; vel succus Vuarum
Passularum, vel Vinum coctum, si-
Sapa.

Pro Lycio, Amurca.

Pro Citri succo, Limonum.

Pro Thymelææ, Chamælææ succus.

Pro Cyclaminis, Iridis.

Pro Omphacii, Rhois; & contrà.

Pro Aloë, Absinthii succus.

Pro Semperuiui, Cotyledonis succus; & contrà; vel Solani, Lactucæ.

Pro Sanguine Draconis, Laccam sustinuit Auicennas in omnibus operibus suis.

Pro Elaterio, succus Cucumeris agrestis, aliquantum coctus.

Pro Sapa, Vinum dulce; & contrà.

Pro Lycio, Gentianæ succus, in vlceribus.

Pro aqua fontana, fluuiatilis.

Pro aquâ pluuiâ, fluuii potiùs quàm fontana, contrà quàm Galenus præcipit in Diacodio, quia composita est, partim ex pluua, partim ex fontibus.

DE LIQVORIBVS ET LACHRYMIS.

Pro Opobalsamo, Staçte siue Myrrha liquida, naturâ vel arte parata, Liqueur Terebinthi.

Non { Opocarpalum, vt auctor Succedaneorum præcipit.

{ Oleum laurinum.

{ Liqueur Myrti, non Semen Myrti, & Zedoarię, vt præceptores nostri statuerunt.

Y

Pro

Pro Carpobalsamo, semen Lentisci, v
Terebinthi, cuius multæ sunt specie
Cubebæ in minori dosi; vel Terebinthi
partes dīæ, vna Cubebarum.

Pro Cedria { Oleum è ramēis Iuniper
paratum per descensum
vel Gummi Iuniperi.

Pro Xylobalsamo, surculi Lentisci.

Pro Oleæ lachryma, Gummi Elemni.

Pro Myrrha, Bdellium, vel succus Smy
nii, vel Apii.

Pro Galbano, Sagapenum.

Pro Sagapeno, Gummi Cedri, Pini; v
Opopanacis dimidium.

Pro Ammoniaco, Propolis, siue sordo
Alueariorum.

Pro Opopanace, Ammoniacum, vel Ga
banum, vel Bdellium; maximè cū
emollire volumus. Galenus vsus est Pro
poli in externis.

Pro Manna Turis, cortex cui adhæret ali
quid Turis.

Pro Ture, Mastiche, & Resina Pini sicca.

Pro Styrace, Benzoinum.

Pro Terebinthina, Mastiche.

Pro Mastiche, Abietina resina indurata
aut frixa, vt docet Dioscorides.

Pro Cupressina Resina, Laricina.

Pro Abietina, Resina Pini.

Pro Pice, Resina Pini cocta.

Pro Pice liquida; Pix oleo dissoluta, v
Pi:

DE SUCCEDANEIS.

507

Pix ex Oleo Iuniperi liquefacta.

Pro Pissasphalto, Pix & Bitumen.

Pro Mumia, Pissasphaltum.

Pro Asphalto, Petroleum, vel Gagates; & contrà. Et carbones petraei è terræ visceribus, quibus fabri ferrarii vtuntur.

Pro Lacca, Myrrha.

Pro Adipe Vrsi, Vulpis.

Pro Adipe Anseris, Anatis, vel Gallinarum.

Pro Adipe Capi, Gallinæ.

DE MINERALIBVS.

Pro Antimonio, Plumbum vstum; & contrà: Auicenn. & Stannum vstum.

Pro Lithargyro, Plumbum vstum, Molybdæna.

Pro Plumbo, Stannum.

Pro Flore Aëris, Aërugo.

Pro Spodio, Antispodium ex Myrto, Lentisco, Olea, Oleastro, Malo Cydonio; vel Cornu cerui vstum.

Pro Pompholyge, Spodium Dioscoridis.

Pro Cadmia, Lapis calaminaris.

Pro Sandaraca Græcorum, Auripigmentum; & contrà.

*De Succedaneis vtriusque Behen,
ex eodem Lobelio.*

Cum radice Behen albi & rubri destituamur, necessariò Succedaneo vtendum.

Y 2

In cor-

In cordi dicatis medicaminibus, vt Diosmoscho dulci & amaro Mesuæ, & aliis similibus, radices vtriusque Buglossi substituendæ: In medicamentis ad Venerem Horminum, Satyrium, Scincus, vel radices Pastinacæ sativæ & silvestris Dioscoridis, siue Dauci silvestris Galeni, & Officinarum; Actuarii exemplo, qui eas Ben substituit in Diasatyrio. De his plurimum in Plantarum Observationibus aut Illustrationibus nostris, aut Aduersariorum altera parte.

De Ben, siue Balano Myrepica in Aduersariis egimus pag. 414.

FINIS.

GVILIEL.

GVILIELMI
RONDELETII
MEDICI
DE
THERIACA

Tractatus,

ex ultima MATTHIÆ LOBELII
recognitione.

Y 3

THERIACA MAGNA

ANDROMACHI.

GVILIELMVS RONDELETIVS *Lectori S.*

CVM antiquissima ac nobilissima Theriacæ Antidotus à quibusdam dispensaretur, in mentem venerunt errata aliquot à Nicolao Præposito annotata, & aliquot minimè animadversa. Quamobrem plurimum me rogârunt, uti veterem illam ac vulgatam Editionem recognoscerem. quod etsi mihi difficillimum esse probè perpenderem, & planè immensi laboris; nolui tamen amicis tam singularibus, honesta præsertim petentibus, operam meam denegare: tum quia sanctum esset quod tam instanter peterent, tum etiam Reip. admodum utile ac necessarium; cùm omnia nostra studia & labores eò spectare debeant, ut Reip. & ceteris bonarum artium studiosis prodesse possint. Nihil enim existimo utilius, quàm ut illa Antiquorum medicamenta, quæ *Ἱνὸν χρίμα* appellant, fideliter præparentur, atque ex selectissimis simplicibus ad communem omnium utilitatem componantur; quod hoc hætenus, proh dolor, quorundam ignorantia ac incuria factum non

non est : quo fit , vt verissimum sit carmen
Homeri , Odyss. δ.

Φάρμακα πολλά μὲν ἰσθλὰ μίμνηται , πολλά
ἢ λυγρὰ.

Quam ob causam , Lector optime , te ad
meliora quodammodo reuocare videmur,
dam pro viribus adnitimur veterem illam
Andromachi traditionem ad germanam
Græcorum lectionem emendare. Et ne
existimes tibi à nobis imponi , consilium
fuit quibusdam annotatiunculis reddere
rationē cur à tam vulgata illa descriptio-
ne recedamus , id quæ addendo aliqua quæ
noua forsàn tibi videri poterunt ; ac expun-
gendo quæ numquam ab Andromacho ex-
cogitata fuere. Sed vnum abs te peto , vt
ne veteri rubigini addictus hæc sine ratio-
ne improbare velis , nī prius apud te probè
examinaueris , quæ prodesse & iuuare so-
leant.

Cum igitur variæ sint Theriacæ descri-
ptiones à diuersis Autoribus traditæ , in
tāta rerum varietate difficilis erat electio:
omnes tamen ad veram illam Galeni le-
ctionem contulimus , cū easdem omnes
truncatas & vitiatas offendissemus : hanc-
quæ veram ex Antidoron libro secuti su-
mus : quæ etsi perfectior videretur ; aliqua
tamen desiderabantur iniuriā temporis
omissa , quæ nos pro virili restituimus ex
Galenī , Pauli , Aëtii , Auicennæ , Aëtua-
riique

riique locis, ut postea in Annotatiunculis
declarabimus.

Nostre autem tempestatis docti quidam
impossibile quodammodo existimârunt
hanc Theriacæ confectionem absolui pos-
se; his moti rationibus: tum quòd Vipe-
ras non haberemus, quæ sanè hoc in ne-
gotio primas tenent: præterea Balsamum,
Aspalathum, Cinnamomum, Myrrham,
Rhaponticum, Calamum aromaticum,
Phu, Nardi Spicam, Pentaphyllon, Schœ-
nanthum, Dictamnium Cretense, Sigil-
lum Lemnium, Thlaspi; tum quòd om-
nibus incognitum dicunt Scordium. miror
non addidisse Malabathrum, Acaciam,
Acorum, Bitumen Iudaicum, Opopana-
cem, Galbanum, quòd non nisi adulte-
rata aduehantur, ut quibusdam placet. Sed
nos eorum rationibus faciemus satis. Ab-
surdum enim est illa medicamēta inutilia
existimare, quæ à Galeno in vsum trahun-
tur, etsi non omnia adsint. Multa siqui-
dem ipsemet Gal. suo tempore desidera-
bat, in quorum locum ἀντὶβακχόμυρα pro-
ponebat. Enimvero si Gal. pro Cinnamo-
mo Cassiæ duplum ponendum iussit, imò
& Phu; & pro oleo Sabino, oleum anti-
quissimum; pro Omphacino, oleum pa-
ratum cum foliis oleæ; quid prohibet Aco-
rum poni pro Amomo, quum Acorus cum
Amomo similem facultatem obtineat? pro
Dicta-

Dictamno Pulegium? quod etsi vires paulo inferiores habeat, augeamus dosin: pro Opobalsamo Styracem liquidam? pro Rheopontico Rhabarbarum? pro Terebinthina Mastichen? pro Viperis Elopes, Ophies? Sed quid moror? Clariora sunt quàm vt demonstratione aliqua egeant.

Consultiùs itaque ab his cauillatoribus factum esset, si tantum operæ locarent in inueniendis Succedaneis, quantum in cauillandis aliorum inuentis. Cessent igitur, precor, bona medicamina infamare; & quam prauam opinionem solent imperitæ multitudini tradere, omittant.

Tempestiuum nunc videtur ad Simpli-
cium declarationem veniamus; hoc vnum
præmonentes, pondera non respondere
ponderibus Andromachi iunioris, vel De-
mocratis: nam Democrates drachmas duas
tantùm Polii, Sefeli, Thlaspi, & aliorum,
vsque ad Cardamomum ponebat, vitupe-
rabatque illos qui constituerent quatuor,
quod tamen ferè omnes qui de Theriaca
scripserunt, faciunt; quemadmodum Gal.
Paulus, Aëtius & Auicenna, quos secuti
sumus. At de diuersitate ponderum vide
Gal. de Theriaca ad Pisonem.

THERIACA nobilissimum medica-
mentum dicta est, quòd valeat aduersus
meia, id est, bestias venenosas; non au-

X 5 tem,

314 GVILIEL. RONDELETTI
 tem, vt quidam existimant, quòd Viperas
 (ita sumpto nomine ob excellentiam, sed
 satis improprie) reciperent ; nam ante-
 quam additæ essent Viperæ, etiam Theria-
 ca dicebatur: huc accedit quòd multæ sint
 Theriacæ descriptiones , vt iam diximus,
 apud Galen. in Antidotis , quæ Viperas
 non habent. Non igitur à Viperis, sed ob
 effectum ita fuit appellata. Posset tamen
 defendi , Theriacam etiam dictam fuisse
 à Viperarum carne. Cæterùm hæc Theria-
 ca Galene , non Galeni, nominatur , aut si-
 mauis , *γαληνὴ* , id est tranquilla, vel tran-
 quillitatem afferens , Autor enim huius
 non fuit Galenus, sed Rex Ponti¹ Mi-
 thridates ; qui , vt erat exercitatus in
 simplicibus , omnia ea collegit Antiphar-
 maca , flores scilicet , femina , herbas, ra-
 dices , gummi , & cetera quæ valerent
 aduersus virus ferarum , Viperarum , Ca-
 num rabidorum , Scorpionum, Dipsadum,
 &c. nec non aduersus venenum medica-
 mentorum quorundam, vt Mandragoram,
 Cicutam, &c. & ad morbos alios complu-
 res & antiquos. Ex his omnibus collectis
 selectissima & efficacissima selegit, ex qui-
 bus parauit compositionem suo nomine
 nuncupandam ; ea est Mithridatium: An-
 dromachus postea (qui videtur inter omnes
 exactissimam calluisse normam compo-
 nendi medicamenta) eam correxit & emen-
 dauit;

THERIACA MAGNA. SIS

davit; addiditque Viperas, *ζαληνη*que vocavit, id est, Tranquillam, quod tranquillitatem inducat: & meritò quidem: quid enim magis meretur tranquillitatis nomen, quàm quod sedat dolorem? Qui à Cane rabido demorfi sunt, aut Vipera, aut alia fera venenata, multum torquentur, multumque de morte sunt solliciti: hæc compositio illos curat; magnam igitur tranquillitatem inducit. Vt in summa dicam, nulla est præstantior Antidotus ad antiquos & diuturnos morbos, ut iam dictum est. Ad defluxiones nullum est genus remedii efficacius quàm hæc Theriaca, siquidem fuerit recens. Febres quartanæ solo usu Theriacæ visæ sunt curatæ. Quid non facit Theriaca? Inexpugnabiles morbos, & quorum causa ignota est, curat: ex omnibus enim medicamentis efficacissimis constat, symphoniam iunctis.

PASTILLOS SCILLITICOS aliter præparamus, quàm antea facere solebant: nam sine delectu Pharmacopolæ Scillam vel Pancratium accipiebant, quod habeant eandem facultatem. Sed quoniam Pancratium vim habet imbecilliorē, melius est cōfici eos ex Scilla, præsertim cum nobis facultas sit. Si Scilla careamus, Pancratio uti possumus eius loco, sed in maiore dosi: ut Cassia pro Cinnamomo: cum verò adest Scilla, sumatur Scilla. Cate-

rum pastilli hi fieri debent ex carne Scillæ
 & spissari farina Orobi, quæ valet aduer-
 sus venena, & conseruat Scillam à putre-
 dine suo amarore. Pharmacopœicos sole-
 bant parare cum pane asso, aut cum Vi-
 cia, cum non nossent Eruum, vt nec adhuc
 omnes nôrunt. Cum enim nuper Auenio-
 ni essemus, & medicamentum præscrip-
 silemus Nobili à Monlau, in quo Eruum
 desideraretur, iussi Pharmacopolâ adferre
 Eruum, atque is Viciam attulit & Apha-
 cem; cum neutra illarum sit Eruum, quod
 amarum est & tenuium partium; Vicia ve-
 rò dulcis & emplastica. Porrò Erui duas
 constituunt species: Aliam enim candi-
 diorem faciunt, aliam ruffam Eruum est
 quod vulgò *des Ers* vocant, in Gallia Narb.
Effes. Quod ad Scillæ delectum attinet, ea
 sumenda est æstate, præsertim Iunii ini-
 tio, ad parandos hos pastillos; tunc enim
 multum succi habet: si hyeme legatur, non
 valebit: sub Canicula verò venenum est,
 habet enim tantam acrimoniam, vt æstu
 correpta in venenum vertatur. Sumenda
 itaque est vere, aut æstatis initio. Ea lecta
 inciditur frustulatim more ceparum, non
 quidem cultro aut instrumento ferreo, sed
 arundinaceo, aut osseo.

Maiores nostri soliti erant parare P A-
 STILLOS THERIACALES ex Ser-
 pentibus communibus, cum Viperas non
 habe-

haberent. Nec omninò certè vituperandi sunt: idem enim præstant reliqui Serpentes, sed Viperarum vis est efficacior. *Ophēia* Græci animalia appellant (latiore significatione accepto vocabulo) quæ curari non possunt. Medici verò *Meia*, quæ morſu venenato vel punctura venenum iaculantur, hominiquè nocent, appellant; sub quo nomine & Aspides, Elopes, & Ceraſtes comprehendunt. Quamobrem non erit absurdum Trochiſcos Theriacales dicere, cùm ex feris conficiantur, quæ & facultate ſua iuuant, quemadmodum Viperæ, & ſi auſim dicere, conuenientiores ſunt. præter enim id quòd calefaciendi & exſiccandi vim habent, aduerſus angues noſtros peculiariter iuuant. Nam Theriaca, vt autor eſt Galenus ad Piſonem, olim citra ferarum commixtionem confectum medicamentum ſimiliter ad eiufmodi mirificè faciebat: Sed poſtquam Andromachus Viperas commiſcuit, ad morſum Viperarum medicamentum fuit efficacius: imò, ſi credamus Galeno, lib. 2. de Antidotis, Mithridatica compoſitio aduerſus plurima venena valet, præter Viperarum miſtus. Nihil igitur habuit Theriaca additis Viperis, quàm quòd ad Viperarum morſus ſit efficacior. Sic noſtrum medicamentum efficacius erit ad morſus Serpentum, cùm nullum nobis periculum

318 GUILIEL. RONDELETTI
immineat à Viperis. Adde quòd pingue-
dinem Serpentum quotidie experimur plu-
rimùm valere, & carnes non plus veneni
in se continere quàm olim haberent Vi-
peræ, si debito modo adhibeantur, & qua-
les oportet capiantur. Nam & in capiendis
delectus seruandus est, quemadmodum
& in Viperis: vt quæ prope mare degunt,
Δψα sunt; & quæ in aquis, excrementose;
& quæ vtero gerunt, repudiandæ. Quas
æstate venantur, vel hieme, nos Elopes
vel Angues bene nobiles in vineis degen-
tes, Vere captos eligimus, non diu asser-
uatos (vt solent facere Pharmacopolæ)
& præparatos, vt ars iubet, cum pane asso
Trochiscos conformabimus: sic seruatos
& exsiccatos, vt neque situm redoleant, ne-
que cariem senserint. Quòd videatur Do-
minis Doctoribus dosin augendam esse,
quia imbecilliores sint, non improbo:
quòd si quis Viperas nancisci possit, vt
iam facimus; eas capiat, & angues omit-
tat. Paulus Ægineta etiam de Viperis lo-
quens, *ἔφις* dicit: Ea autem locutio esse
videtur per excellentiam, quo commune
aliquod vocabulum rei singulari attribui-
mus: vnde & *ἔφιδες* Viperas vocat. Cùm
autem simpliciter legitur *ἔφις*, de Vipera
intelligendum est, quia præstantissima
inter serpentes est. Vnde & in Theriaca
assumenda; non quòd remedio egeamus
aduer-

aduersus illarum morsus, siquidem in nostris Regionibus non reperiuntur, sed ob alias Viperæ facultates: deficcant enim vehementer, calefaciunt, & visum acuunt. Viperas nihilominus veras tum in Italia, tum apud Pictones habemus; quicquid dicant qui id negant: Certissimum enim signum est Viperæ, & nota certissima, si viuum animal pariat, vt inter pisces Galeus; vnde & nomen habet, vt scribit Aristoteles, & experti sumus in nostris ædibus: Adhæc Viperarum descriptio tam exactè illis conuenit, vt nihil magis; & maxime ea quæ tradita est ab Aëtio, viro perquam diligentissimo in describendis Viperis. Vt vnam è multis notam adferamus: statim in caudam desinunt, quam crassissimam habeat inter reliquos serpentes (præter Amphisbanam, quæ adeò crassam habet vt bina putetur habere capita:) omnes denique notæ feliciter reperiuntur in ea. At dicat aliquis: Elephantiasin non curat, vt scribit Galenus. Esto. Si mentiri voluit Galen. quid tum? neque enim verisimile est tempore Galeni curari potuisse Lepram iam confirmatam. Sin autem quis dicat, id non idèò præstare, quia ex Italia adferantur, quæ regio non sit satis calida; Nugæ: si enim venenum retinent, cur non & alias facultates? Nemo igitur dubitet, quin veræ Viperæ nostris

tem-

520 GVILIEL. RONDELETTI
temporibus reperiantur.

Porro vt conficiantur Pastilli Theriacales, præparatione omiffa, hoc tantum ex Gal. addam, melius effe paulo antea captas fumere, quàm diu retentas: nam quæ diutiùs retentæ fuerunt, venenofæ funt magis, vt ex hominibus iciunis conicere licet.

Andromachus MAGMA HEDYCHROON ita à coloris iucunditate appellatum, non Trochiscos de Corallo, vt Nicolaus Præpositus falsò putauit, defiderat. Multo fatius fuiffet, fi Trochiscos Alindaracorum Auicennæ posuiffet, vel Trochiscos Hedychroi, quos annotauit in Antidotario, qui etfi Tamaricem recipiant, Asphaltum defiderent; magis tamen accedunt ad Hedychroi compositionem quam hîc constituimus ex Gal. lib. ad Pamphilianum. Hæc enim paratu facilior est, & clarior, & melior. Nam in lib. de Antidotis pedestri oratione scripta est, quæ Maron & Amaracum defiderat. At Maron nobis prorsus incognitum est, nisi illa fit quam vulgo *Mariolaine franche* appellant; quam ob causam cōsultò Amaracum addidimus, & illam pro Maro: quòd si per Amaracum intelligat aliquis Sampsuchum, pro Maro poni potest Syfymbrium; sunt enim eiusdem facultatis, vt Dioscorides docuit. Quantum verò differat Hedychroon
magma

THERIACA MAGNA. 521

magma à Trochiscis Diacoralli, fidem facit vtrorumque collatio: hi enim Papauer, Pedem columbinum, vt alia omit- tam, recipiunt, quæ non sunt in Hedy- chroo. Non itaque ponendi.

PIPER NIGRUM non tam valet ad *ἀντιφάρμακα* atque Piper Longum & Al- bum: sed quia omnes sic habent, nolui immutare, & ʒ xxiiij indidimus, quam- uis aliqui sex tantum: Paulus tamen, Aë- tius & reliqui, xxiiij censent ponendas; & Nigrum, non Longum, vt in quibus- dam Exemplaribus legitur, & in carmi- nibus Andromachi. Neque tamen impro- barem si quis Longum sumat; tum quia in carnibus Longum est, tum quia Anti- dotis, si Dioscoridi credimus, aptius. Tu verò iudica.

OPIVM, vel MANDRAGORA, vel, HYOSCYAMVS addi solent in Antido- tis, quia incrassando constringunt me- tus, ne Venenum ferri possit ad cor; & sic iuuant operationem Antidoti. Eodem planè modo Bolus Armena & Terra sigil- lata lentore suo & crassitie prohibent vim Veneni ad cor deferri, non autem pro- prietate occulta, sed incrassando: quare quæ tenuissimarum sunt partium, vt Mos- chus, Ambra, non conueniunt, quia fa- ciunt citò penetrare venenum ad cor: sic Cicuta cum vino absorbita occidit citissi- mè;

mè; per se verò tardiùs.

ROSARVM, remotis vnguibus, drachma
xij ponimus : Auicenna xxiiiij ponit.

SCORDIVM, quod Fuchsius putat om-
nibus incognitum, nunquam antea in al-
qua Antidoto positum, apponendum cen-
suimus (quanquam tamen opera & dili-
gentia doctiss. viii D. Guiliel. Pelliterii
Mompeliani Episcopi vigilantissimi, pri-
mùm in Gallia iam à decem annis cogni-
tum sit) & non Allium siluestre, vt vulgo
Pharmacopolæ facere solebant. Stultum
enim esset *Σκόρδα ἀγρία*, id est Allium
siluestre, vt Auicenna docuit, collocare
cùm tam frequens apud nos sit Scordium
herba. Excusandi fuerunt Maiores nostri
quibus incognitum fuit; neque grauite-
peccârunt in hoc simplici. est enim Allium
syluestre, Theriaca Rusticorum. Vtinam
in aliis Succedaneis tam bene iudica-
sent! Non est tamen conferendum Allium
cùm Scordio : Scordium enim maiorem
habet vim aduersus putredinem, quàm
vel Myrrha ipsa, vt videre est apud Gal.
lib. de Antidotis, qui eius inuentionem
declarat. Quis autem, nisi stultus, dicat
Succedaneis esse vtendum, cùm propria
habeamus? Scordium enim copiosissimè
per totam Galliam nascitur. Reiiciendum
itaque Allium.

SEMINIS NAPI: & rectè : quan-
quam

quam nonnulli, Seminis Rapæ, legant.

IRIS ILLYRICA ea debet apponi quæ Veneriis affertur.

AGARICVM sumatur candidum, leue, &c.

CINNAMOMVM à viris doctissimis in discrimen vocatum est, cum dicant nos vero Cinnamomo carere; ac id quod pro Cinnamomo ostenditur, potius esse veram Cassiam: nos tamen putamus esse Cinnamomum; etsi non sit illa species tantopere ab Antiquis laudata: quam ob causam nos istius Cinnamomi ꝓ xxiiij posuimus (etiamsi nonnulli ꝓ xij tantum ponant) duplici nomine: tum quia in quibusdam exemplaribus xxiiij drachmas Cassiæ scriptum legimus, ut etiam in secunda descriptione Auicennæ; tum ut omnibus fieret fatis: nam si Cinnamomum esse negent, non possunt improbare consilium nostrum, cum Gal. de Compos. Pharmacorum doceat his verbis: Necessarium nobis est, ubi Cinnamomo caremus, Cassiam optimam coniiciamus, aut plusquam duplo Cinnamomi pondere, aut omnino non minus. Sed Cinnamomum verum habemus. Si cineritium illum colorem non habeat, in causa sunt mercatores, qui eius superficiem abradere solent, colorem naturalem auferentes. At odorem Rutæ non habet. Nec habere debet.

bet. Error enim est in Diosc. nam pro *zavizson* legendum est, *berzavizson*: quod facile probati potest ex eodem Dioscoridis alio loco, ubi ait Amomum habere Origani odorem. Hinc enim luce clario colligere licet, Cinnamomum Origani odorem referre; aliumque textum corruptum esse. Et quanquam Dioscor. dicat diuersas esse arbores Cinnamomi & Cassie; Galienus tamen diuersæ est opinionis; asseritque se vidisse in capsula cuiusdam mercatoris ramum vnum, cuius altera pars Cassie esset, altera Cinnamomum.

GLYCYRRHIZÆ SVCCVM apposui mus quia efficacior est quam radix ipsa; et Avicenna in tertia descriptione radicem ponat: & vere poni potest succus; ne timendum est de succi adulteratione. Nam tanta est copia Dulcis Radiculæ, ut parui veneat. Et etiam cum Theriacâ componere volumus, expressè succum extrahere debemus.

OPOBALSAMVM sincerum ad nos non adfertur, sed multis modis adulteratum: quin etiam si adulteratum non esset recens non est, sed antiquum. nam cum ex regione longinqua petatur, non potest non esse antiquum; est siquidem antiquum, si annum excesserit, fitque inutile. Etsi nonnulli dicant in Novo Orbe reperiri, incertum est an verum sit: succo daneo itaque utendum. Quid verò substituemus,

stituemus, cum succedaneo opus sit? alio-
 qui manca esset Compositio & corrupta.
 Non sequemur hac in re consilium Maio-
 rum nostrorum, qui Oleum Laurinum
 pro Opobalsamo poni docuerunt. Opor-
 tet enim succedanea & viribus & tempe-
 ramento respondere, ut doctissimè à Gal.
 monstratum est. Sed oleum Laurinum ca-
 lidius multo est Opobalsamo, cum oleum
 Laurinum inter calidiora adnumeretur,
 quod ex fructu potest cognosci: solet
 enim oleum expressum eiusdem esse tem-
 peramenti cum fructu ex quo exprimitur.
 At folia & fructus Lauri desiccant & cale-
 faciunt vehementer, plus etiam fructus;
 ergo & Oleum: Opobalsamum vero desic-
 cat & calefacit in secundo excessu tantum.
 Igitur non respondent. Adhuc Opobalsa-
 mum tenuium est partium, Oleum verò
 Laurinum crassarum: Opobalsamum ven-
 triculum roborat; Laurinū autem oleum,
 ut ait Diosc. *ἡ ξανθὰ δὲ μέλι*, id est, po-
 tum nauseam facit, & lædit ventriculum,
 non alia ratione, quàm quòd ventriculo
 aduersatur: idem autem efficere Opobalsa-
 mū, negandū est. Non enim est oleum, sed
 succus Balsami. Vnde autem id natū sit, ut
 Oleum Laurinum in Antidotis poneretur?
 Puto hinc esse natum, quòd olim Oleum
 parabant cum Myrrha & Staete, ut Diosc.
 docet. Extrà adhiberi non prohiberem, ut
 etiam

526 GVILIEL. RONDELETTI
 etiam oleum Irinum: quamuis in versio
 Vallæ & multis exemplaribus Græ
 (falsò tamen) Laurinum legatur. Bal
 mum arte compositum reiicitur. Errore
 indicavit ante 114 annos Santes de A
 dronis de Pisauro Medicus in hac par
 Alexipharmacòn diligentissimus & pr
 batissimus. Post eum Nicolaus Præpo
 tus, qui Medicorum Mompelianoru
 mentionem facit, tanquam autorum hui
 hareseôs. Alii ex semine Cirri & Corali
 ἀντὶ τῆς ἀντιόδοις conficiebant, sed inepte
 nam quamuis semen Citrivalet aduersu
 venena, reperiuntur alia multo efficaci
 ra. Alii asserebant fieri debere substitutu
 ex Myrrha destillata: quod expertum fui
 & ex destillatione oleum exceptum, se
 usque adeò fœridum, ut nemo ferre posse
 Omnibus itaque reiectis, substituam Sta
 cten, ex præscripto antiquorum, Galen
 scilicet, Pauli, Aëtii, qui assereunt easde
 Staetes vires & Opobalsami. Est autem
 Staete nihil aliud, quàm Myrrha liquida
 &, si Diosc. credimus, est pinguis
 Myrrhæ recentis cum aqua exigua tusa
 & prælo expressæ, proportionem respon
 dens Myrrhæ. Myrrha autem secundi
 ordinis excalefacientium & exsiccantium
 sicut & Balsamum. Adhæc & vulnera con
 solidat, quod facere Balsamum creditur
 neotericis Medicis, quanquam Gal. nul
 lan

nam eius mentionem faciat. Idcirco autem hîc positum fuit, quòd aduersus venenata animalia valet. quod ex eo colligere licet, quòd vbi nascitur Balsamum, nequeant habitare Serpentes aut alia venenata animalia. Qui de omnibus dubitare solent, Myrrham istam reiiciunt, quia parùm respondeat descriptioni, tùm maximè quòd *ῥιζώδης*, id est, odorata non sit, vt Diosc. & Gal. dixerunt. Nos autem Myrrham dicimus esse, non Trogloditicam vel Amineam. Et quòd non sit odorata, in causa est quòd ab ea expressa sit nobilissima Staete. Nam, vt Diosc. docet, ex pinguibus exprimitur pingue & odoratum. Minùs etiam odorata est, quia ex calentibus & aridis locis adfertur. Neque tamen dicendum est talem esse *ἄπυρον*, id est, infirmam & ignauam, vt in quibusdam exemplaribus legitur: vbi legendum *ἄορμον*, id est sine odore; illamque amittere suam commendationem, non ad sanitatem sed ad voluptatem. At hi qui dicunt nos non habere veram Myrrham, falluntur, aut in hoc, quòd, cùm Diosc. diuersas notas diuersis speciebus assignârit, omnes eas in vna specie reperiri velint, alioqui veram negent esse Myrrham: aut quòd dicât *ῥιζώδην* non esse, vt vult Dioscorides. Sed id planè negamus. Sumitur autem vox *ῥιζώδης* pro eo quod bonum spirat odorem.

528 GVILIEL. RONDELETTI
odorem. In hoc autem error est. Nemo
Diosc. & alii plerique scriptores εὐώδης
munt pro eo quod multum olet, siue
num spiret odorem, siue malum. Signi-
catio autem vocabulorum non aliunde
petenda est, quàm ab eo authore qui res
ipsam describit; quemadmodum Dioscori
ut dixi, hoc modo sumit εὐώδης, ut videtur
licet cap. de Pice arida, ubi ait debere esse
puram, pinguem, εὐώδην. Nemo autem
interpretabitur intelligi de suavi odore,
forti & graui, quia quæ igne eliciuntur
non possunt non fenum redolere &
trum odorem spirare. Idem esto iudiciu
de Blatta Byzantia, quam dicunt esse εὐ-
δην. Sin hæc ratio non placeat, dicemus
Veteres non adeò delictos fuisse atque
fumus, & quod nobis malè olet, ut Myrrh
illis benè & suauiter oluisse: quod in
probari potest, quòd in suis vnguentis &
delicias paratis, Galbanum admiscebant
quod haud dubiè fœtidi admodum est
odoris.

De CROCO & GINGIBERE nullo
dubitant.

Reclamant Sceptici Medici, quòd pro
RHEOPONTICO Rhabarbarum (se-
quuti Auicennam) ponimus. Non autem
remerè id factum est. nam cum Rha-
ponticum hoc Pharmacopolarum nullo modò
respondeat picturæ Rheopontici, fatius
est Rha-

est Rhabarbarum vocatum coniicere: quanquam istud Centaurium maius à viris doctissimis iudicetur esse, nec ineptè. Rhaponticum enim & Centaurium hoc maius easdem ferè habet facultates. Componitur Rhaponticum ex diuersis partibus: ex terrea videlicet & frigida substantia, quod indicat adstrictio: habet etiam adiunctam caliditatem; subacre enim reperitur, si plusculum mandatur, qua facultate potest aluum ducere: quinetiam aëreæ cuiusdam est substantiæ particeps, quod indicat laxitas & dulcedo. Conuulsis, ruptis, dysentericis, sanguinem exspuentibus vtile est, & orthopnoæ. Centaurium maius in gustu contrarias qualitates habet; ita in vsu contrarios effectus præstat: gustu itaque acre simul & adstringens apparet, cum leuiuscula dulcedine: quæ omnia in Rhapontico esse monstrauimus. Prodest iisdem reiicientibus sanguinem, ruptis, conuulsis, dyspnoæ: orthopnoæ: quamobrem medicamentum imbecillius non erit, si pro Rhapontico Centaurium maius posuerimus. Nam Rhaponticum & Rhabarbarum sola regione differunt & leuitate: vt Rapæ quæ apud Lemouices nascuntur, & quæ solo sterili, differunt solum dulcedine aut crassitie, aut alia differentia à solo desumpta. At dicces; alterum magis rarum est, alterum
 Z densius.

530 GUILIELM. RONDELETTI
densius. Respondeo, id facere copiam
inopiam alimenti : aut dicendum, Me-
tores qui aduchunt Rhabarbarum , il-
comprimere cùm recens est , ut minus
ci occupet , & densius reddatur ; qu-
sciant densum laudabilius esse. quod fa-
lè fieri potest : si enim compressam ra-
cem desicces , minor erit , minusque fa-
rium occupabit , nec diminuetur quan-
tas. Si verò Rhabarbarum nostrum non
veterum Rhaponticum , quid erit ? Qui-
dam aiunt esse radicem Centaurii ma-
ris , & Galenus ait radicem Centaurii n-
ioris easdem facultates habere quas Rh-
ponticum.

Malè negat Manardus , nos verum
PENTAPHYLLON habere : nam passim
nascitur , & omnino descriptioni respo-
det. Est præterea alia nota à Theophrasto
tradita , quæ nobis est certissimo indicium
nos Pentaphyllon habere : scilicet quod
Pentaphylli radix exsiccatione fiat qua-
drata : quod sanè illi proprium est : con-
uenit enim soli Pentaphyllo quadrata
fieri exsiccata radicem ; quæ nota falli
re nos nequit. Sunt ex Practicis qui p-
tent Tormentillam esse Pentaphyllo
quod non improbo ; cùm Diosc. det i-
radicem oblongam, Veratro nigro crassi-
rem , & propiùs accedat ad veram Pent-
phylli descriptionem. Sunt qui Heptaphyllo
phyllon

Theriaca Magna. 531

hyllon vocent, à numero foliorum; quod in vulgari etiam inuenies. Diosc. etiam it habere quinque folia, aliquando plura. Verum quamcumque assumpseris, tunc ne Diosc. an illam Theophrasti, non trabis: amba enim valent aduersus venena. Poteest itaque sumi Tormentilla pro pentaphyllo, & Pentaphyllon pro Tormentilla.

N E P I T A M [aut Nepitam] Latini, Græcorum Calamintham appellant: quæ e causa Galenus miratur quod Andromachus, cum Græcè scripserit, hoc tantum nomen Latinum addiderit. At hoc πνεύμα dictum sit.

M A R R V B I V M lippis & tonsoribus notum est. eam ob causam prudens præcreo.

Danda est opera vt **S E L I N O N** quod in petris nascitur recuperemus: non quod ob eam causam Petroselinon dictum veniam, sed quia maioris est efficacis, & propius accedit ad Macedonicum, ob amorem. Nec ob eam causam damnanda erit hæc compositio. Nam, vt Gal. de Petroselino scripsit, Quod si Estreaticum desideres Petroselinum, nihilo tibi deterius fore putato Theriaces medicamentum, alterum iniicias. Cuius rei subdit rationem: Non enim, inquit, si mortiferis venenis, si venenatorum moribus aliud ab

Z. a. Estrea-

Estreatico Petroselinum minus congruum propterea reliquis etiam morbis, ut terminibus, ventriculo debili, hydropisi, id genus aliis segnius opitulatur, quod in primis sanare Theriaca promittit. Ad præterea causam assignat, cum inquit Adhuc Estreaticum Petroselinon amarum etiam plus æquo Theriacam facit, præsertim cum recens adhuc imponitur: nam ut acrimonia, sic amaritudine hoc alia superat. At, ut abibi docuit, suauitas in medicamentis quod deglutiuntur, est spectanda, cum inest habeat multa amara. Auicenna semina Apii montani posuit in tertia descriptione. Petroselinum verum nascitur in montibus Delphinatus, & apud fontem Valsclusæ.

STOECHAS satis nota est: agroque Mompeliano frequentissime provenit.

COSTVM nonnulli in discrimen vocant. Certissimum autem est, nos duas habere Costi species: primam scilicet (quam Zedoariam vocant vulgò) & tertiam quam nemo negabit eam esse quæ ad nos adfertur, præsertim cum acerrima sit.

DE PIPERE Albo tantum sciendum est, Galenum ibi Piper Album legere, vnde Auicenna Nigrum; & econtrà. Piper Album & Longum magis medicaminibus & Antipharmacis conueniunt: Nigrum

ver

verò eduliis & alimentis condiendis. Pi-
per Longum facillimè adulteratur. Adul-
teratum aut cognoscitur, si aquâ insper-
sum dissoluatur. Non reperitur hoc Pi-
per Longum in descriptione ad Pamphi-
lianum.

DICTAMNUM in Creta tantum cresce-
re, & inde CRETENSE dici, existimant
Autores, quòd sic depictum sit à Diosc.
Cretensis herba est, acris, levis, Pulegio
similis, sed maioribus foliis, quæ tomen-
to quodam spissaque lanugine pubescunt.
Florem nullum aut semen profert: (et si
apud Paulum falsò legatur Διτάμνος ἄν-
θος.) Pharmacopolarum *ῥιζὴ διτάμνου* &
florem & semen profert: quam ob causam
malumus succedaneo uti, quàm incognita
illa radice qua pro Dictamno utuntur
Pharmacopola. Pulegium itaque pro Di-
ctamno inieciimus, quia nulla est herba
quæ propiùs accedat ad Dictamni facul-
tatem ipso Pulegio, docente ipso Diosc.
Præstat omnia quæ satium Pulegium, sed
efficaciùs multo: & Gal. Dictamnum
enuiore essentia constat quàm Pulegium,
cetera illi simile. Quòd si per omnia simi-
le, haudquaquam malè pro Dictamno re-
cipietur, cum ipse Auicenna in omnibus
descriptionibus pro Dictamno Pulegium
posuerit. Præterea à Nicandro (in suis
Theriacis,) Dioscoride, Serapione, Paulo
Z 3 & Aëtio

& Aëtio ad morsus venenatorum commendatur.

Non mireris, candide Lector, si in FLORE IUNCII ODORATI, quod vno vocabulo Schœnanthon vulgus appellat, herbam ipsam monstremus. A Gal. Adhuc Iuncum ex Arabia petitum imponere præcipit, nescio qua de causa Schœnanthum, id est, Iunci Florem vulgaribus appellatum. Nos siquidem cum Florum copia non adsit, Iunco utimur ex Arabia comportato, cuius summitatem Cameli sæpenumero abroserunt: cunctissimè namque hunc Iuncum Cameli pascuntur, secus vias ibi plurimum nascentem. Ex his discere, multa fuisse simplicia tempore Galeni, qualia nunc sunt. Non itaque peccant, qui Iuncum ipsum huic compositioni imponunt, ut ex Gal. loco iam citato patet, & Diosc. qui radicem & herbam eiusdem esse facultatem cum flore & efficacie. Imò si flores adferrentur, abiiciendi essent & postponendi. Iunco ipsi nam cum sint admodum tenuium partiū, eorum vis facilè evanescit & priusquam ad nos pervenissent, plane inodori redderentur.

DE TURE nihil in præsentiarum dicemus.

Quamquam TEREBINTHVS hoc agro Mompeliano frequens sit, non tamen
me

nen Terebinthinam habemus : & quem-
 modum Lentiscus , hñc alioqui fre-
 quens , Lentiscinam non stillat , obSolis
 imbecillitatem ; sic nec Terebinthus Te-
 rebinthinam. Sed , Galeni doctrinam se-
 cuti, pro Terebinthina Abietinam conie-
 cimus. nam 4º sanitatis tuendæ sic scrip-
 sit: Quòd si copia Abietinæ non adsit, eius
 loco Terebinthina. Cùm pro Abietina
 Terebinthinam ponendam doceat ; sic
 contra pro Terebinthina Abietinam re-
 cipiemus. Quod evidentiùs monstrat
 alio in loco, his verbis : *Quinetiam in*
penuria Terebinthinæ tum ἐν τῷ ξηραίνῳ
ῥηγῇ, tum frictam commodè admisceas ;
 non minùs etiam iis & Abietinam immit-
 tas. Quòd si fortè quis hanc Resinam Ab-
 ietinam esse neget, Mastichen ponemus,
 quæ ipse Resinas principatum obtinet,
 este Gal. vel (vt Diosc.) Terebinthinæ
 respondet viribus. Fidem forsitan auge-
 bit, quòd in Paulo legatur, *Τερρεβινθίνῃ*
Μαστίχῃ, quasi veller dicere Resinæ Masti-
 chinæ, vel Mastichen & Terebinthinam
 imponi velit. Tu iudica.

CASSIAM FISTVLAREM vocat
 Cassiam Ligneam , aut Cinnamomum
 crassum ; ne qui existiment eum intelligen-
 re Cassiam illam Fistalarem Arabum, quæ
 vim habet laxandi ventrem. Est enim Cin-
 namomum crassum efficax, vt odor & sa-

por monstrant. Nec absurdum est, dimidium Cinnamomi pro Cassia constituere, cum pro Cinnamomo duplum Cassiae ponendum sit.

STYRAX eligenda optima.

NARDVM nemo debet damnare, quòd spica non sit, sed potius radix. Nam Galenus his verbis docet esse radicem: Iubet deinde de Andromachus Nardum Indicam imponere, quam ex eo quia Spicae figuram imitetur, Nardi spicam nominant, quamvis radix sit. Rursus Damocrates *Náγδιονρίζα* *Ἰνδῆς* scripsit, non spicam. Indica autem dicitur, non quòd in India nascatur, sed quòd in aliquo monte nascatur Indiani spectante; quemadmodum Syriaca, quae in monte Syriam spectante. Eodem modo & Britannica dicitur (ea est Bistorta vulgaris) non quòd in Britannia solum nascatur, sed quòd in regione Britanniam spectante. Ceterum Nardus Indica ceteris efficacior est.

Nunc ad THLASPI veniendum: quod omnibus incognitum putat Manardus, eo fortasse quòd nunquam viderit. Vt autem verum fatear, non omnibus cognitum fuit Thlaspi, sed iis dumtaxat qui de re herbaria bene meriti sunt. Eius descriptionem require in Diosc. Frequens est in semitis Tolosani agri, & aliis plerisque locis. Temperamento calido est, ut Nasturtium.

tium. Auicenna pro Thlaspi, Sefeli habet : at in Arabico Thlaspi legitur. Vulgus Pharmacopolarum, quod Sinapi species quædam sit, album appellant.

SEMEN APII restituimus ex descriptione ad Pamphilianum. In Paulo enim & Auicenna idem scriptum reperimus, tum etiam in Theriaca Antiochi Philometeros, in medicamento anodyno *Κάριον* dicto : rursus in Zenonis, Aëtii, Galli, Theriacis : quod etsi ut Petroselinum aduersus venena parum aut nihil proffit, ad alios morbos non parum iuuat.

Pro MALABATHRO, ut benè à maioribus nostris visum est, ponendam censuimus Spicam. Habet enim Folium eandem cum Spica facultatem, teste Gal. lib. 6. de simpl. Idem scripsit Paul. in Succedaneis. Quod si æqualem vel similem habet facultatem, frustra additur Macis ; cum neque addendum quicquam dicat, neque detrahendum. Auicenna post Malabathrum addit Epithymum ; qua ratione nescio ; quemadmodum & Moschum post Piper Longum.

HYPOCISTHIS etiam sub Lado [aut Ledo] reperitur : quod Cisti species est, longiora habens folia, & glutinosa.

NARDVS nostra CELTICA ea verè est quam Antiqui Celticam vocauerunt:

Z s non

non igitur reiicienda : neque audienda
 Marcellus, qui negat Spicam nostram esse
 Celticam. Rarò autem visitur, quia in
 summis montibus nascitur, quos perpetu-
 nix ferè obsidet. Radix sumenda.

Pro TERRA LEMNIA sumimus Bo-
 lum præparatum, ut Gal. docuit. Neque
 eam ob causam vituperanda est hæc terra
 quòd à Lemno non aduehatur. Est enim
 hæc terra medicamentosa, lutumque cum
 aqua ex ea fit, quod habet desiccandi fa-
 cultatem, & astrictionem non contem-
 nendam, quæ catarrhos sistit. Prodest tem-
 pore pestis. Ut in summa dicam, malle
 hac vii, quàm Terra sigillata egregiè adul-
 terata Rubrica Lemnia à Galeno vocatur.

Difficilius fuit iudicare, quid pro CHAL-
 CITIDE accipiendum esset, cum Attramen-
 tum Sutorium (quod *Χάλκανθον*,) *Σῶρον*,
Μίσου, *Χαλκίτης* parum ab inuicem differre
 videantur. Et quanquam non grauis esset
 error, si *Χάλκανθον*, vel *Μίσου*, vel *Σῶρον*,
 pro Chalcitide posuissemus (sunt enim fa-
 cultatis eiusdem) tamen Chalcitin veram
 maluimus accipere : quam (ut præcipit)
 assari curauimus, & quod magis spumo-
 sum erat accepimus. *Χαλκίτης* Vitriolum
 Romanum non est, quanquam easdem ha-
 beat facultates, sed Chalcanthi videtur
 species: quæ vrenda est donec nihil viridis
 appareat; estque *χαλκωδής*, id est, similis
 æri.

eri. Vrunt Pharmacopœi Chalcitin donec rubra fiat : sed ineptè illi ; non enim usque adeò est adurenda Ait enim Galen. urandam donec fiat cineritia , & amittat viride , vt ostendat quantitatem adustionis. Nos itaque legimus, *costa* ; & non, *vsta* , vt est apud Galenum.

Quid sit AMOMUM , vt ingenuè fatear, ignoro : malo enim meam fateri ignorantiam , quàm studiosis hac in re aliquomodo imponere. Non me latet , multos fuisse in Gallia & in Hispania, qui se inuenisse gloriantur ; cum nihil minùs fecerint. Nam semen illud quod pro Amomo monstrant , inodorum , nigrum , lene, gustu neque acre neque erodens est ; cum debeat esse candidum , modicè rufum, semine plenum , vuarum racemis simile, ponderosum , odoratissimum , acre gustu, & erodens. Nos pro Amomo Acorum posuimus. Amomum , vt inquit Gal. Acoro similem facultatem obtinet. Ergo Acorum pro Amomo nefas non erit ponere. Sunt qui Amomum Rosam [seu Pomum] Hierichontis dicant : quod carè admodum venditur, ob id quòd mulieres fabulentur cōducere ad partum. In Alexandria frequens ; & ad nos adueheretur, si pramoniti essent mercatores.

Mirabitur aliquis ; quòd pro ACORO in omnibus locis Galangam crassam, non

vulgarem illam radicem posuerimus. Sed ne id temerè factum existimes, sciendum est, hanc vulgarem radicem Acorum non posse esse, tum quia rubra est, & ingratus odore: cum vera Acorus albam habeat radicem, gustu acrem, odore non insuauem, vt ait Diosc. Cum autem hæc omnia in Galanga manifestissimè inueniantur, & vt Musa testatur, florem croceum & folia Iridis angustiora habeat, Acorum dicimus esse.

Et si Fuchsius Valerianā neget esse Phu Valerianam pro Phu posuimus: non enim valet eius ratio. Phu caulis λεῖς καὶ τρυφῶς, id est, lenis & tener existit: Valerianæ caulis angulosus: cum herba & lenis & quadrato caule possit esse. Quod de floribus dicit, similes Narcisso non esse, verisimile videtur: flores tamen habere pallidos, sicut & Narcissus: quod sufficit, cum omnes aliæ notæ nullo pacto discrepent.

CARPOBALSAMVM vulgare nullam aut paucam vim habere videtur; & putrefactum semen esse Terebinthi. Eam ob causam Cubebas vulgò vocatas ponendas dixerim quæ forsitan veriùs sint Carpobalsamum quàm Carpesium; nisi reclamet Actuarius. At Gal. lib. de Antidotis Carpesium dicit esse herbam Phu appellato genere similem; validiorem tamen, atque aromaticum quiddam plus olentem. Et eodem loco

co : Tenuia quædam Carpesii sarmenta Cinnamomi virgultis similia sunt; non semen igitur potest esse. Cubebæ autem non multum viribus & temperamento differunt à Carpobalsamo. Diosc. ait Carpobalsamum adulterari semine Hyperico simili; quod Terebinthi semen esse videtur, ut ex Theophrasto patet.

Pro ACACIA, Prunellorum succum ponere, non est absurdum. Potest & Rhus pro Acacia poni; quia, ut ait Diosc. folia Acaciæ effectus præbent, ut in Succedaneis reperitur succus Lentisci.

BITUMEN IYDAICVM, Græcis Ἀσφαλτῶν, communiter laudatur quod purpuræ modo splendet. Nigrum adulteratum est. Sed cum aliud non aduehatur nisi pice imbutum, dosin augere oportet. Eiusdem facultatis est cum Pissasphaltum, quod vulgo Mumiam appellant. Pissasphaltum autem mediam facultatem habet inter Picem & Asphaltum: eam ob causam Auicenna & quidam alii pro Bitumine Mumiam ponunt, Asphaltum deprehendes ex odore Trifolii foetidi, quod à Bituminis odore Ἀσφάλτου dictum est. Quod ad nos adfertur, Pissasphaltum est. Cum Diosc. ait probari si purpuræ modo splendeat, non ita intelligendum est quasi velit habere purpuræ colorem, sed quod in sua nigredine splendeat ut Purpura in
 Z 7 suo

fuco colore; aut quod simile sit purpure
exsaturatæ, quæ quodammodo ad nigre-
dinem tendit. Plurimis locis provenit, v
in Aruernia, &c.

CENTAVRII TENVIS [aut M I N O R I S
folia & flores ponimus, non radices, quæ
tanquam inutiles reiicit Galen. & Diosco-
et si Lumen illud Pharmacopolarum alite
sentiat.

Ne quis nos reprehendat, quòd A R I-
S T O L O C H I A M tenuem, non Clema-
titin aut Rotundam, vt in lib. ad Pamphi-
lianum scriptum est, adiecerimus: non
enim id temerè factum est: Nam in car-
minibus scriptum inuenimus, Ἐλεπὶ τῷ
ῥίζαν Ἀελελόχης: & ad Pisonem tenuem
dicit. huc accedit quod de Clematiti ai-
Galen. Quæ Clematitis appellatur, fra-
grantior est, ita vt ad vnguenta vrantur
vnguentarii; sed ad sanationes infirmior.
Hic autem non ad voluptatem sed ad sa-
nitatem ponitur: *tenuis* igitur ponenda est:
castigandusque est locus ille, ne parum
canti fallantur. Interpres Centunculum
vertit: Centunculum autem Latini appel-
lant Gnaphalion. Si autem addatur Gna-
phalion, id erit præter Andromachi, Gale-
ni, aliorumque mentem. Nec interpretibus
semper fides est adhibenda, etiam si Græ-
cè & Latinè periti sint. Malim enim illos
minùs disertos esse, & rerum bene peri-

ros: hi siquidem solœcisum in nominibus dumtaxat committunt; illi autem in rebus & sēpē in vita. Hīc itaque neque rotundā Aristolochiam, neque Clematitin aut [Pistolochiam, aut] Polyrhizon, quæ vnguentis parandis aptiores sunt, impone-
mus: sed Longam dumtaxat Aristolochiam, siue Tenuem, quæ ad medicamenta conuenit. Proueniunt autem omnes Aristolochiæ species, quæ quatuor sunt, frequentissimē agro Mompeliano. Quam pro Longa pingit Fuchsius, Clematitis est.

Qui cornicum oculos configunt, hunc CALAMVM ODORATVM reiiciunt; non quia inefficax sit, sed quia Calamus araneis non est plenus. Fieri autem potest, vt Calamus dicatur, eius autem radix tantum sit in vsu, vt de Spica admonuimus. Sin tibi hæc ratio non placet, aliam accipe. Duæ sunt species Calami odorati: Alter, qui à Galeno describitur: Alter in Mæotide nascens, radice subalbida, sine calamis, intus plena & amara, specie Acori: quem Calamum falsò quidam Acorum esse putauerunt; in quorum numero fuit Mæoardus, qui pro Acoro Calamum aromaticum semper ponit. At vtrumque genus Acorum odore superat. Non igitur reiicienda hæc radix, cum Calami sit radix.

XYLOBALSAMVM hoc commune

verum sit nec ne, incerti planè sumus
nam quicunque de Balsamo scripsere, inter
se dissentiunt. Quòd inefficax sit, facile
quilibet iudicare potest ex odore, saponi
& crassitie partium. Sin autem pro e
ligno incognito & adulterato, Zedoaria
vulgo dictâ quis uti voluerit, sine noxi
poterit. Zedoaria enim calidâ & sicca est
in secundo ordine, ut Xylobalsamum; va
let aduersus venena, & pestem. Commo
dè itaque illa uti possumus, quando qui
dem temperamento & viribus respondeat
Xylobalsamo. Non autem in omnibus su
menda pro Xylobalsamo: sed hîc, quia
iam semel in hac compositione posita
sunt succedanea eius, maluimus hac ra
dice uti.

De AMARACO si Nicolaus Præposi
tus dubitet, non mirum est; cùm res ad
modum obscura sit, & ad iudicandum
difficilis. Nam Diosc. Plin. Columella,
Lucret. Virgil. Diocles medicus, vno ore
Amaracum Sampsuchum appellant: Ga
lenus tamen & Paulus diuersas herbas tra
dunt. nam in 3^o ordine calef. & exsic. Sam
psuchum collocât; Amaracû verò in 2^o sic
care & tertio calefacere volunt. Amaracus
Galeno & Paulo Matricaria vulgaris est,
& Parthenion Diosc. atque vtramque po
nemus: quanquam non multum referret
si neutra poneretur; nam, ut Gal. testatur,
multi

Theriaca Magna. 545

multi suo tempore & Marum & Amara-
cum reiciebant.

Hæc sunt, Candide Lector, quæ cum
festinatione quadam annotauimus. Et hoc
esto Exemplar eius quæ ex Consilio Docto-
rum Mompelii dispensatur.

Theriaca Andromachi, quæ *αλγηνη*, id
est, Tranquilla cognominatur.

Rx. Passillorum Scillinorum ʒ xlviij.

Passillorum Theriacorum

Magmatis Hedychroi

Piperis nigri

Opii singul. ʒ xxiiij.

Rosarum siccarum

Scordii Cretensis

Seminis Napi

Iridis Illyrica

Agarici Pontici

Cinnamomi

Glycyrrhizæ succi

Opobalsami Singul. ʒ xij.

Myrrha, Croci

Gingiberis

*Rhapontici, [non Rhabarbari, ut habet
Cordus]*

Radicis Quinquifolii

Nepita, siue Calamintha montana

Marrubii

Petroselinii Macedonici

Sta-

*Strackados**Costi**Piperis albi**Piperis nigri* [*al. longi*]*Dictamnus Cretensis**Iunci odorati**Turis**Terebinthina**Cassia* [*fistula*]*Nardi Indice* *sing. 3 vj.**Polis Cretensis**Seselsos**Styracis**Seminis Apii* [*in aliis deest*]*Thlaspi**Ammeos**Chamadryos**Chamapsyos**Succi Hypocisthidis**Malabathri**Nardi Gallica**Radic. Gensiana**Anisi**Mes Athamantici**Seminis Fœniculi**Terra Lemnia**Chalcitidis tosta**Amomi**Acori**Phu Pontici**Carpobalsami**Hypo-*

*Hyperici**Acacia**Gummi**Cardamomi sing. 3 iij.**Seminis Dauci**Galbani**Sagapeni**Opopanois**Bituminis**Castorei**Centaurii tenuis**Aristolochia tenuis sing. 3 ij.**Mellis Attici despumati 3 CL [male 3 pro 3
posita] hoc est lib. xij. unc. vj. alibi Ron-
let. lib x tantum habet.**Vini Falerni q. s.*

ADMONITVM autem hñc velim Lecto-
rem, vt huius Compositionis normā exactè
contempletur, quæ illi plurimum prodesse
poterit in aliis Medicamentis diiudican-
dis. Omnes enim hñc ferè traduntur
Canones qui in huiusmodi compositioni-
bus tradi solent. E quorum numero pau-
cos colligemus, vt memoria suppetabit.

Primum itaque in omni Compositione
id obseruandum, vt præcipua & veluti to-
tius medicamenti fundamenta primo lo-
co ponantur, quod hñc etiam obseruatum
est in Pastillis Scillinis & Theriacalibus.
Inuat enim plurimum non in Composi-
tionibus solùm, sed in reliquis omnibus,
si aptus

fi aptus ordo seruetur. Paraturus igitur medicamentum, in summis digitis habere debet quæcunque illud ingredi debeant & ex his considerare quæ decoctionem ferre possint, quæ minimè: Ex his rursus quæ decoctionem ferunt, ea primo loco imponat quæ diutius decoctionem ferunt, ut radices densas & inodoras: Odorata enim & rare decoctionem non ferrent: Deinde ea iniiciat quæ minùs coctionem ferunt, ut herbas: Postremò quæ nullam omnino. Præterea quæ simpl. maiori quantitate assumuntur, ea primo loco imponenda: quæ minori, secundo loco: atque ita deinceps gradatim; ut in hac Compositione est observatum. Eius enim prima dosis est drachmarum 48. Altera 24. tertia 12. quarta 6. quinta 4. vltima (melle dempto) drachmarum 2. Sed & alius Canon observandus est, & hîc observatus, nempe: Ea quæ ad alterationem ponuntur. maiori debere esse quantitate: quæ verò ad castigationem, minori. His annexæ sunt Regulæ generales, ad maiorem institutionem.

THEO.

THEOREMATA
SIVE PRÆCEPTA DVO

*Ordinis aut Dispositionis Simplicium
medicamentorum,*

*desumpta ex libro de Ponderibus
Dom. Rondeletii.*

THEOREMATA duo sunt in hac re
spectanda : quorum vnum, & magis
necessarium, vt imperitiæ iuniorum
Pharmacopolarum subueniatur, à bene
parandi ratione desumetur : Alterum à
quantitate vel dignitate medicamentorum
tam simplicium, quàm compositarum,
quæ ratione compositionis faciendæ Sim-
plicium conditionem præse ferunt.

Ad primum veniamus: illudque ita con-
stituamus. Quæcunque accuratiore &
longiore præparatione egent, ea priorem
locum debent obtinere : hoc est, si quid
difficilius tritureretur, infundatur, coqua-
tur, aut misceatur, prius triturationi, in-
fusioni, coctioni, mixtioni est mandan-
dum : quod vt indicetur, inter trituran-
da, infundenda, coquenda, miscenda,
prius scribatur. Si autem infundendorum,
vel coquendorum, vel miscendorum
vnum

§50 GVILIEL. RONDELETTI
vnum aliquod, breuiori infusione, vel
coctione, vel mixtione egeat, & præter
ea trituratione, hoc postponatur; duplici
de causa: vna, quæ iam dicta est, altera, v
dum alia infunduntur, vel coquuntur, vel
miscentur, hoc trituri possit; sicqu
nulla fiat temporis iactura: cuius metu
sæpenumerò Pharmacopola, tātocum sce
lere, omnia perturbant; vt eorum quæ mi
nùs coquenda sunt, sæpe vis prorsus de
perdatur nimia coctione; contra, ea quæ
longissima coctione egent, cum eorum
vis à mediocrietate erui non possit, quāta
necessaria est non extrahatur. Quod idem
in aliis præparandi formis euenit. Quam
rationem hodie à quamplurimis, dicam,
Empiricis negligi apparet, qui infundunt
simul & decoquunt Guaiaci rasuram, San
calos, Cinnamomum, Sennam, & alia
multa: quorum vel ea quæ sunt odorata
& laxantia, vim suam amittunt, vel alia
non satis decoquuntur, vel vtrumque con
tingit.

Secundum Theorema est, vt ea quæ ma
iorem sui quantitatem toti Compositioni
tribuunt, & nobiliora sunt, priorem sedem
occupent: quod est erutum ex præscriptis
antiquorum, qui in componendis medi
camentis hoc solum spectarunt; tantum
excipientes ea quæ materiæ vice aliquan
do in fine collocantur. Vt videre est in
descri-

551
THERIACA MAGNA.

descriptione Pilularum de Hermodactylis, apud Mesuem. Recipiunt enim primo ordine Hermodactylorum 3 v. deinceps alia in mediis sedibus sequuntur, pro maiori & minori quantitate: tandem Aloë, quia materię vices gerit, ad 3 x ponitur. Idem factum est in Pilulis Sebillinis; in quibus Spica Nardi ponitur in prima sede, ob quantitatem & nobilitatem.

In Aromatico Rosato maiore, ex descriptione Gabrielis, Rosę in prima sede positę, reliqua copiā superant.

Idem in Antidoto Philonis, apud Mesuen, Piper album, & Hyoscyamus, obtinent; in qua Compositione manifestè apparet ordo medicamentorum seruandus secundum maiorem & minorem quantitatem; ita vt maxima quantitas primo loco ponatur, minima verò vltimo; cum Piperis albi & Hyoscyami hęc recipiantur ana 3 xx. Opii 3 x. Croci 3 v. Spicę, Pyrethri, Castorei, ana 3 j.

In Theriaces descriptione hoc palam fit: sed quia ea est longior; vtque mos antiquorum melius innotescat, non me tædebit separatim eam transscribere, & crassa Minerva excutere doses. Exactę eius castigationem, & rectum componendi modum, precedenti opusculo tradidi.

Animaduertendum igitur est antiquos postea quam se ita collocationi petendę a sola

sola quantitate addixissent, vidisse
 mum rationem præparandi: & in hac
 ordinem esse apprimè necessarium: co
 ctosque fuisse multa verborum conger
 explicare, quod ipse in scribendo oro
 indicare potuisset: & is mos eos excu
 uit in magnis Compositionibus faciend
 cum neque forsan solus ordo satis id i
 dicasset.

Sed cum in illis quæ ad horas præsc
 buntur, hoc fieri non liceat, neque etia
 ipsi fecerunt in iis quæ nobis scripta re
 querunt, nisi admodum paucis: in eo quod
 mox dicturus sum, totus collocatio
 cardo vertetur; vbi annotauero, antiqu
 minus bene & comptè fecisse, qui aliqua
 do dosim medicamentorum, quorum
 idem ordo erat, diuiserunt: vt in Theri
 ca videre est, Rosarum siccarum 3 xij. In
 dis Illiricæ 3 xij. cum per ana, quod
 notatur añ. vno numeratore designare po
 tuissent.

Nec mihi minùs ridendi, qui idem ho
 die faciunt, (nisi id præparationis ratio
 fiat) videntur.

Igitur, secundū Theorema priori adiu
 gentes, hunc ordinem in præscribendo
 constantissimè obseruemus, vt primo o
 dine collocemus ea, quæ longiori eger
 præparatione. In hoc autem rursus id con
 sideremus, vt eandem præparationem po
 stular

stulantium ea primùm ponantur, quæ maiorem copiam requirunt.

Eandem præparationem & quantitatem requirentium, & mensurandi modum, vt lib. vel vnc. vel M. vel P. ea prima collocentur, quæ commoditate, aut nobilitate aliqua præstant. Sicque fiet, vt maiorem præscriptionibus admouentes, nullo pacto hæreamus mente, ab hocne, vel illo, ordiendum sit: sed cognito scopo, medicamentique proprietate, & nobilitate, statim ab eo quod opus est, initium faciemus: id quod erit vice materiæ (siue vnum, siue plura id faciant) si in eo vel decoctio, vel infusio, vel mixtio sit facienda totius compositionis, primùm omniū; si autem infusum, vel decoctum, vel tota mixtio, iam facta, ei sit adiungenda, vltimum, quantæcunque sit copię, & quantitatis, collocemus.

Quod vt exemplo aliquantulum illustremus, id petamus à re quæ est frequentior, videlicet plantarum partibus: vt cum earum radices duriori sint substantiâ, & magis crudâ, longiori que decoctione & trituratione egeant; proinde in primâ sede ponantur, præcipuè quæ aperiant, & incidunt: tum ligna non odorata, & cortices; deinde folia herbarum: tertio loco fructus: quarto semina: vltimo flores, & quæcunque sunt odorata, vel laxantia.

ΔΔ

Quod

Quod facit vt radices inde patiantur
ceptionem: laxantes enim primo loco
ponuntur.

Denique ratio preparationis tantum
potest, vt nihil tam generale adferri po-
sit, quod frequenter non patiatur aliquod
peculiaris & singularis doctrinae: vt si quod
adalicuius medicamenti meliorem,
faciliorem actionem faciendam vel ca-
gandam adhibeatur, cuiuscunque sit qua-
titatis, id quod habet castigandum illi
sequatur necesse est, vt eius vis non
castigata & melior facta, ne tantillum quod
dem extrahatur: vt Zingiber & Sal Ge-
mæ mox post Agaricum: Spica & Cin-
momum post Rhabarbarum: Castoreum
Crocus & Myrrha post Opium: & sic
similibus.

Primum animaduertendum est, id quod
in prima acie descriptionis Theriacis co-
positum, esse in maxima quantitate. Id
autem factum fuit fortè, quòd medic-
amentum ex Scilla, scopis magis conueni-
Facta enim est hæc Compositio primùm
ad venena, & morbos contumaces & diu-
turnos: sed Trochisci de Scilla venena
frigidis manifesta qualitate aduersantur
item puncturis & moribus venenatorum
animalium: nec minùs valet ad humorum
contumaciam. Tales enim morbi sunt
crassis, frigidis & viscidis humoribus

ve

THERIACA MAGNA. 555

in remotis & profundis partibus sitis,
quas causas valet potissimum Scilla, in-
dendo, attenuando, & ad altas partes
intrando; digerendoque humores cras-
sis.

In secundo ordine, Trochisci Theriaca-
s, & Magma Hedychroi, Cinamomum,
per nigrum, vel longum: sed longum
magis conuenit; & descriptio quæ legitur
ad Galenum ad Pisonem, & apud Aui-
ennam, *longum* habet; tum descriptio
arminæ scripta. Conuenit enim magis
antidoti Longum, si Dioscoridi credi-
mus.

Hæc omnia, cum Trochiscis de Scilla
ad venena, & ad morbos contumaces,
conueniunt.

Opium autem in hac descriptione, ut
precedentia ad drach. xxiv. ponitur, quia
hec compositio ad dolores sedandos pa-
ta est, unde nomen sibi *καλὴν*, quod
transcribunt Latinè *Galene*, comparauit,
quia tranquillitatem adfert; & propter
vim Opii, & ad veneni præcautionem &
rationem facit, ut ex Galeno colligi-
mus.

Valet enim Theriaca, eodem teste, cum
recens est, ad venena; cum verò antiqua,
ad morbos diurnos. Quod si recens va-
let ad venena, id fit propter vim Opii, quæ
maior est in recenti, quàm in antiqua.

A a 2

Et mi-

Et mihi placet Ioannis Schironii ratio
nostræ quondam Academiæ Cancelli
eruditissimi, qui dicebat Opium additum
istis magnis compositionibus, magis
ad vires calidorum medicamentorum
seruandas. Calida enim, & quæ tenuiū
tium sunt, continuò exsoluuntur ab a
ambiente, qui semper agit in medicamē

Quare cū tot sint in hac Compositi
ne calida, & anodyna fortissima esse
beant; nemini mirum esse debet, quod
ad drach. 24. Opium posuerint.

Hanc rationem non nōrunt, qui
Trypherā magnā Opium expungūt, etiam
ad affectus vteri præscribatur. Nam si ta
ropere narcotica verentur, cur Mand
goræ corticem non expunxerunt? ne
enim minùs vtero sua frigiditate aduer
tur, quàm Opium. Sed hæc missa faci
mus; & ad reliqua veniamus.

Iris Illyrica, & Glycyrrhiza, Opobas
samum; Rosæ aridæ, Scordium, semen
Napi, vel Rapæ agrestis (quod magis
conuenit,) vel quia minùs aduersant
venenis, vel minùs conueniunt, quàm
supradicta, vel ad meliorem actionem tan
tùm adhibentur, dosim habent dimidiā
secundæ doseos, vt secunda primæ ite
est dimidia, scilicet 3 xij. Quæ sequuntur
3 vj. recipiunt, hoc est, dimidium præ
cedentis dosis.

Qu

Quæ sequuntur hanc, eadem quantita-
te ponuntur : sed censeo omnia iungen-
da, quæ eiusdem sunt quantitatis: alioqui
erunt duæ classes eiusdem ponderis in eo-
dem medicamento ; quod ridiculum , ut
iam dixi.

Quintiverò ordinis pondus est drach. 4.
quia quæ ponuntur in hac classe, partim
ingrata, partim rara, partim efficacissima
sunt: quare si præcedentium copiam essent
secuta, maior eorum quætitas fuisset, quàm
ar erat. Chalcitis enim suo odore, sapore,
adstrictione periculosa est: alia autem sunt
efficacia valdè calfaciendo , vel adstrin-
gendo ; quare minore quantitate posita
sufficere. Quod si præcedentem progredien-
ti modum secutus fuisset , prioris dosis
dimidium sumendo , minor iusto quan-
titas fuisset assumpta ; ob id non 3 iij.
sed 3 iij. posuit.

Quæ sequuntur, vel quia fœtida, vel
duo sapore vel consistentiâ ingrata , ad 3
ponuntur, dimidium scilicet proximè
præcedentium. Sunt autem , semen Dau-
ci, Bitumen, Opopanacum , Castoreum,
Centaureum minus, & Aristolochia. Hæc
efficacissima sunt, & ingrata : quare mini-
ma quantitate , & vltima sede ponuntur.

Vnde apparet illius Theorematis veri-
tas, quo docebamus, Efficacissima , & in-
grata , & rara , & scopo minùs conue-

A a 3 nientia,

558 GUILIEL. RONDELETTI
nientia, in parua quantitate esse im-
nenda.

Quòd autem Mellis lib. 14 [al. 10.] p-
nat, ostendit illud Theorema verum et
quod de materia remediorum diximus
nempe materiam, vel quæ materiæ vi-
gerunt, quantitate reliqua medicamen-
superare debere.

Quòd Vinum addiderint sine quanti-
te, id factum fuit, quia quantitas in-
dari non potest. Ponenda proinde ea er-
quæ necessaria est ad diluendam medic-
menti spissitudinem. Mel enim inspissat
conseruat, & dulcorat tantum: & quia al-
quando crassius, aliquando liquidius; al-
quando etiam plus Vini, aliquando minu-
imponimus.

Quare nemini mirum esse debet,
Temper Vini, Mellis, Syrupi, Sacchari
Olei & Cerae quantitatem non annotemus
sed quod sufficit dicamus.

Hic præterea notare oportet, herba
pondere mensurari, quia sicce vsurpantur
item radices, fructus, flores, semina &
lacrymas etiam pondere.

Chalcitis semi-usta in hoc remedio po-
nitur; quanquam inter venenosa annu-
meretur; valet enim ad Fungos.

Multa etiam alia hic annotare possem
quæ in castigatione huius nobilis Com-
positionis docuimus. Sed quia hæc præ-
ter

et institutum sunt, silentio prætereo.

Sed de his hætenus. Nunc Theriaces facultates breuiter persequamur.

THERIACA MAGNA ad eadem valet ad quæ Asyncritum. Efficacior tamen est ad omnia. Sed eadem hîc obseruandæ imitationes, quæ illîc, sit ne scilicet Recens, an Antiqua. Recens enim vt frigidior est, sic ad morbos calidos conuenit: Antiqua frigidis opitulatur: Quæ mediæ ætatis est, morbis medio modo se habentibus confert. Sed neque id nouisse sufficit. Nam propriis cuiuslibet affectui medicamenti commisceri debet. Exempli gratia: si ad fluxum sanguinis, cum aqua Bursæ pastoris misceatur: & sic de reliquis.

Apoplexiæ prodest, si valdè antiqua debeat: quia in tali affectu egemus attenuatione humorum crassorum apoplexiam comitantium.

Epilepticis conuenit recens; etiam si epilepsia sit à nimio sensu: nam recens obundit sensum illum exactum. Si verò fiat ab humore crasso (quod scio rarissimè accidere) exhibenda antiqua.

Raucedini vocis, si à crassis humoribus fiat, conuenit antiqua; sin à defluxione tenui, recens.

Asthmati recens, si à retentione calidiorum; sin à crassis humoribus, antiqua.

A a 4 Icteri-

Ictericis & Hydropicis antiqua. Peripneumonics & pleuriticis recēs datur in principio, cū tales affectus fiāt per defluxionem; idque cum aqua hordei. Ilios recens, quia inflammatio est. Dysentericis recens, cum succo aliquo refrigerante. Nephriticis recens, ad sedandum dolorem.

Menstrua educit antiquissima. Neque solum educit & prouocat menstrua; sed & immodicas menstruas fluxiones sistit vt inquit Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem: Mistam variamque facultatem inquit, habet. Ideo alia diffundens extenuansque cogit excerni; alia, quæ ob nativæ virtutis imbecillitatem superflua excernuntur, viribus partium confirmatis solet inhibere.

Lepras & Variolas emendat antiqua.

Præcipuè contra omnia venena recens quia venenum est tenuissimarum partium. Tota itaque cura consistere debet in conservando corde, ne ad illud scilicet penetret vis veneni. Incrassandi sunt ergo meatus: Hoc autem medicamentum recens non modò incrassat, sed & refrigerat, verumque est Alexipharmacum.

Omni deflectionem sensuum leuat antiqua: recens enim magis sensus stupefaceret. Retardat senectutē, inquit Gal. quia excrementa corporis absomit, & euacuat.

Quar-

Quartanis febribus & contumacibus soluendis apta est Theriaca antiqua (quod experientiâ comprobatum est Mompelii ann 1551.) vbi iam appârent signa concoctionis. Cùm enim Pharmacopœus quidam iamdiu laborasset quartana inexpugnabili, eâ solutus est media hyeme, solo vsu triduano Theriacæ à nobis præscripto.

Expertus sum præterea Dysentericæ conuenire. Acceperat enim Scriba quidam satis inconsultè 3 ij Colocynthidis; vnde in Dysenteriam inciderat. Præbui illi 3 j. Theriacæ nuper paratæ: & conualuit eo solo remedio exhibito. Rursum ederant quidam salsamenta putrida: è quibus duo obierunt; tertius, me consulto, vomitione factâ Theriacam sumsit, & curatus est.

UT autem finem dicendi faciam: Recens valet aduersus venena; antiqua verò aduersus morbos diuturnos & inueteratos.

Rejicio eorum sententiam, qui Theriacam pueris recens natis præbent, ne sint obnoxii (vt aiunt mulierculæ) venenis. Data enim pueris iam primùm in lucem editis, calorem natium obruere potest. Recens, cùm frigida admodum sit: Antiqua vero sua caliditate euanescere faceret eundem calorem.

Varia autem eius est dosis: quæ à mul-

A a 5 tis

ris indicationibus sumitur. Si enim a
 ſta pars ſit remota, ratione optima dabi
 tur maiori quantitate, quàm ſi ſit propin
 qua: vt ſi ad Podagram, dari debet maio
 ri quantitate, quàm ſi ad Ventriculum.
 Recens item minori quantitate danda eſt
 quàm antiqua. Recens enim periculo non
 vacat; at antiqua, ratione caliditatis, na
 turæ amicioꝝ eſt. Calidum enim quodam
 modo ſecundum naturam eſt.

Hæc ſunt Theriacæ commoda, qua
 perſequi nobis libuit. Plura requirere apud
 Galenum de Theriaca ad Piſonem; qui
 ſigillatim eius facultates deſcribit.

THERIACES & MITHRIDATII

*miſcendi parandique ratio,
 ex Lobelio.*

P R I M A R I I huius nobiliſſimi Anti
 dori concinnatores Veneti, terenda
 duriora & craſſiora, ordine contun
 dunt, in lebetem iuſtæ magnitudinis in
 dunt, permifcent: quæ deinde in variis
 pilis æneis, ſiue mortariis exactè & ope
 roſè ab operariis tunduntur; humidis fic
 cis immixtis, diſtributisque, & pilis in
 ter tundendum Opobalfami ſuccedaneo
 inunctis, ne pilis & piſtillis adhæreant, &
 pollinis inſtar exhalent.

Oliba-

THERIACA MAGNA. 563

Olibanum, Gummi, Lachrymas per se terunt, ne cum aliis trita coëant, aut coherendo in grumos coalescant, cribrationemque impédiant.

Agaricum, prius derafum, teritur & cribratur, aut Cerusæ modo ad Emplastra fricando per setaceum traicitur.

Trochisci per se teruntur.

Sagapenum, Galbanum, & huiusmodi lachrymæ Vino passo siue Cretico solvuntur, & per cribrum fricando cernuntur.

Styracis dosim quidam avarè sordidi augent, qui Styrace purissima in guttis vocata (reperit sedulis tamen hodie facili) carent: quam exactissimè terunt, mortario & pistillo calefactis, æquali affuso Mellis defæcati pondere, per setaceum traiciunt: cui deinde Terebinthinam felicius miscent, quàm Galbano, ex Galeni tamen præcepto.

Quidam Bitumen hodie, si liquidum sit, quale est illud Gallicum Auerniense, miscent cum Terebinthina, & præparata siue transcolata Styrace. Si verò durum aut aridum sit, cum Chalcitide in marmoreo lapide læuigant.

Inclyti Collegii Medici Londinensium

THERIACIS formula,
ex eodem Lobelio.

Ab inclyto Medicorum Londinensium

A a 6

Col-

964 THERIACA LONDINENSIVM.

Collegio vtilissimum hoc Alexipharmacum, Epidemicis contagiosisq̃ue febribus grassantibus, ciuem etiamq̃ue egenum seruandi gratiâ scitè excogitatum fuit. Eadem ferè recipit, iisdemq̃ue viribus pollet, quibus Fracastorii Diascordium & celeberrimum Dodonæi aliorumq̃ue practificantium Belgii ad Pestem Electuarium, Carlinæ radice addita, sine tamen Opio. Ab effectû Theriaca vocata.

℞. Cornu ceruini lima derasi ℥ ij.
 Seminum Citri Oxalidis Præoniæ
 Ocymi ana ℥ j.
 Scordii, Corallinæ ana ℥ vj.
 Radicum Angelicæ Tormentillæ
 Præoniæ
 Foliorum Dictami
 Baccarum Iuniperi Lauri ana ℥ β.
 Florum Calendulæ
 Caryophyl. Anthos
 Summitatum Hyperici
 Nucis Moschatæ Croci ana ℥ iij.
 Radicum Gentianæ Zedoariæ
 Zingiberis
 Macis Myrrhæ
 Scabiosæ, Succisæ
 Cardui benedicti ana ℥ ij.
 Caryophyllorum, Opii ana ℥ j.
 Omphacii & Mellis optimi ana q. s.

FOR-

FORMVLÆ

SELECTIORVM PHARMACORVM,

quorum vsus post Valerium Cordum
in Illustrium aliquot Rerumpublica-
rum Officinis receptus est.

*Theriaca Pauperum, ex Diateffaro
composita.*

℞. Gentianæ Baccarum Lauri
Myrrhæ
Aristolochiæ rotundæ ana ʒ ij.
Boli Armeni præp. Dictamni albi
Tormentillæ Scordii
Carlinæ Zedoariæ ana ʒ j.
Rob Sambuci Iuniperi ana ʒ x.
Mellis q. s. Misce.

*Electuarium contra pestem,
pro pauperibus.*

℞. Ficum pinguium lib. dimidia
Nucum iuglandium ʒ ij.
Fol. Rutæ ʒ iiij.
Zedoariæ ʒ ij.
Boli Armeni ʒ iiij.
Rob Iuniperini ʒ ij.
Rad. Gentianæ ʒ j.
Theriacæ electæ ʒ iiij.

A a 7

Sy-

Syrupi de succo Acetosæ q. ℥.
Fiat Electuarium.

Diascordium Fracastorii.

R. Cinnamomi

Cassia lignæ ana ℥ β.

Scordii veri ℥ j.

Dictamni Cretici Tormentilla

Bistortæ ana ℥ β.

Galbani Gummi Arabici ana ℥ iiij.

Opii ℥ j. β.

Styracis Calamitæ ℥ iiij. β.

Seminis Acetosæ ℥ j. β.

Gentianæ ℥ iiij.

Boli Armeni ℥ j. β.

Terræ Lemniæ ℥ β.

Piperis longi Zingiberis ana ℥ ij.

Mellis albi lib. ij. β.

Conseruæ Rosarum lib. j.

Vini aromatici lib. β.

Fiat Electuarium ℥ a.

Confert in febribus contagiosis pesti-
lentibus, vbi potissimum Theriaca & alia
magna Antidota locum non habent, vt in
pueris & grauidis. In Cephalalgia etiam
Epidemica, cum aqua Oxalidis aut Tri-
folii acetosi feliciter exhibetur. Fraca-
storius in peste correptis ac extremè de-
speratis hoc modo exhibet: Succi Liniulæ
sue Oxydis ℥ ij. Succi Citri ℥ j. Dia-
scordii

cordii 3 j. Specier. cord. è Gemmis
3 ij. Aceti 3 j. misce. Omnia mixta
lentur simul : & repetatur quoties opus
fuerit.

*Electuarium de Ovo, Maximiliani I.
Imperatoris.*

2. Ouum Gallinæ recens : & educto per
picem Albumine, id quod vacuum est
Croco Orientali non puluerisato, imple,
vitellum non auferendo : postea cum alio
utamine iterum occlude, ne quid tran-
spiret, & lento igne, vel post fornacem
amdiu assa in ollula, donec rora oui testa
igrescere incipiat; diligenter cauendo
ut Crocus comburatur. Exempta è testa
materia exsicceetur, vt in mortario exqui-
sissimè contundi, & in puluerem redigi
possit; addendo pulueris Sinapis albi quā-
tum prædicta omnia ponderant. Postea

1. Pulueris Dictamni albi

Ormentillæ ana 3 ij.

Syrthæ Cornu cerui

Lucis Vomica ana 3 j.

Rad. Angelicæ

Impinellæ

ranorum Iuniperi

edoariæ

amphoræ ana 3 β.

Misce omnia simul in mortario : &

tan-

tandem adice Theriaces optimæ ad pondus omnium, ac iterum pistillo fortiter contunde, & commisce, per tres quasi integras horas agitando: deinde fiat Electuarium ut est artis.

Quibus Nux vomica suspecta esse solet (quamvis experientia comprobatum sit illam Nucem potius canibus & felibus quam hominibus, adueniari) substituunt semen Citri, aut Rad. Petasitidis. Præterea si qui à Camphora vehementer afficiuntur, dimidium tantum Camphoræ sumatur, aut etiam omnino omittatur præsertim si frequenter usurpandum sit hoc Electuarium loco præseruationis.

Multis experimentis comprobata est excellentia huius Electuarii, & pro secreto habitum fuit, neque diuulgandum esse censuerunt quidam. Datur ieiuno magnitudine ciceris, & horas xxiiij à peste præseruat. Peste correptus, si febris adfuerit, capiat de eo aureum vnum ex aqua Plantaginis. Creber apud Germanos huius usus est, non in peste solùm, sed & in venenis omnis generis depellendis.

*Electuarium de Limatura Chalybis,
pro oppilatis.*

℞. Limaturæ Chalybis ℥ ij. ꝑ.

Teratur benè super marmor duriss.
cum

cum aceto in subtiliss. puluerem exsic-
cetur in loco calido, vel ad solem: id-
que septies repetatur. Huius limaturæ sic
præparatæ ℥ ij.

Cinnamomi opt.

Nucis muscatæ ana ℥ j.

Rhabarbari opt. ℥ ij.

Specier. Aromatici Rosati ℥ j. β.

Mellis opt. despumati & Sacchari clari-
ficati ana ℥ iij.

Lento igne fiat Electuarium.

Virginibus cachecticis, quibus menses
non ritè fluunt, & in hepatis obstructio-
ne hoc multum prodest.

Aliter.

℥. Limaturæ Chalybis præparatæ ℥ ij.

Specier. Diarhodon abb. Diacurcumæ
ana ℥ β.

Epithymi Thymi ana ℥ ij.

Mellis despumati q. s.

Est eius vsus frequens in jecoris diu-
urna obstructione, & albo virguncularum
stero. Datur post purgatum corpus à ℥
j ad ℥ β. subsequente valido aliquo exer-
citio, aut corporis motu vehementiore.

Electuarium Opticum Occonis.

℥. Specier. Pliris archontici

Semi-

Seminis Fœniculi ana ʒ j.

Macis Cubebæ

Cinnamomi

Piperis longi

Caryophyllorum ana ʒ β.

Euphrasie ʒ β.

Succi Saluie Rutæ

Chelidonii ana ʒ β.

Sacchari clarificati ʒ j.

Mellis Rosati ʒ v.

Coquantur Succi cum Melle ad solidam consistentiam, deinde species tritæ addantur.

Ad visus imbecillitatem, & suffusionem confert.

*Pulvis Epilepticus, minùs pretiosus,
sen pro pauperibus.*

℞. Rad. Præniæ collectæ luna decre-
scente ʒ ij.

Dictamni albi ʒ iiij.

Visci quercini ʒ j. β.

Cubebæ

Coriand. præpar. ana ʒ β.

Nucis Moschatæ ʒ j.

Fiat pulvis.

*Pulvis partum promouens, Helidei
de Paduanis, medici Bononiensis.*

℞. Cinnamomi Croci ana ʒ j.

Bora-

Boracis \mathfrak{z} iiij,

Datur ex aqua Artemisiæ, vel simili.

Augerur efficacia, si (pro prudentis
Medici arbitrio) exigente necessitate,
admisceatur testiculorum equinorum as-
pidorum aut iulorum Nucum iuglandium
pulis.

*Pulis aduersus Scabiem,
in Italia vsitatissimus.*

R. Sulphuris viui

Nitri veri, vel eius loco Salis Gemmei

Foliorum Maioranæ ana \mathfrak{z} ij.

Lithargyri aurei

Cort. rad. Ellebori nigri ana \mathfrak{z} j.

Pimpinellæ \mathfrak{z} β .

Seorsim trita, cribrata & mista, ser-
uantur: & cum oleo Rosato ac Costino
cuti affricantur.

Pulis pro vlcerebus gutturis.

R. Sulphuris viui \mathfrak{z} iiij.

Myrrhæ rubæ

Aluminis Saccharini ana \mathfrak{z} ij.

Mastiches Turis ana \mathfrak{z} j.

Pyrethri \mathfrak{z} vj. Fiat puluis.

huius pulueris \mathfrak{z} j.

Vini sublimati lib. j.

Pulis hic felici successu gutturis anti-
qua

qua ac foeda vlcera repurgat & perfana
præcipuè in lue venerea.

Puluis Violarum odoratus.

℞. Iridis Florentinae ℥ vj.

Rosarum rub. ℥ iiij.

Cyperi ℥ β.

Maioranae Caryophyllorum

Syracis ana ℥ j.

Beniouin Santali Citrini ana ℥ β.

Violarum ℥ iiij. [al. ℥ iiij.]

Moschi ℥ j. Fiat puluis.

Puluis hic tametsi ad odoramenta præ
standa potissimum expetitur, caput tamen
extrinsecus adhibitus eximiè roborat, nec
non cordis palpitationi medetur.

Syrupus è Rosis siccis.

℞. Infusionis Rosarum aridarum aliquo-
ries lege artis factæ,

Sacchari ana.

Decoquatur in formam Syrupi.

Alii sumunt dimidiam partem Sacchari,
ad infusionem.

Syrupus Althææ, Fernelii.

℞. Rad. Althææ ℥ ij.

Cicerum rubcorum ℥ j.

Rad.

Rad. Graminis Asparagi
 Glycyrrhizæ mund. Vuarum passar. ex-
 purgat. ana \mathfrak{z} β .

Summitatum Althææ Maluæ
 Parietariæ Pimpinellæ
 Plantaginis

Adianti vtriusque ana manip. j.

Quatuor seminum frigidorum maio-
 rum & minorum ana \mathfrak{z} iij.

Coquantur ex aquæ libb. sex, dum qua-
 tuor supersint, cum Sacchari albi libris
 quatuor, ad consistentiam Syrupi.

Crassam obstruentemque pituitam, pu-
 rulentamque sanie & arenulas blandè
 expurgat, citra manifestum calorem. Uri-
 næ præterea mitigat ardorem.

Syrupus Melissæ, Fernelii.

R. Rad. Dictamni albi Pentaphylli

Rad. Betonicæ

Doronici Romani ana \mathfrak{z} β .

Foliorum Melissæ Stœbes vel Scabiosæ

Succisæ vel Morsus Diaboli

Florum Buglossi vtriusque

Rorismarini ana manip. j.

Seminis Acetosæ

Citræ mali

Fœniculi Cardui benedicti

Ocimi ana \mathfrak{z} iij.

Coquantur in aquæ libris iij. ad dimi-
 dias,

dias. Expresso addantur

Sacchari albi lib. iij. Succi Melissæ
Aquæ Rosarum ana lib. β.

Percoquantur in Syrupum conditur
Cinnamomi & Santali citrini ana ℥ β.

Ante alios cordis palpitationi & syn-
copæ succurrit: peculiariter verò pestilen-
tium & venenatorum morborum malī-
gnitatem obtundit.

Syrupus Augustini Niphi.

℞. Corticum Myrobalanorum citrinorū
Rad. Rhapontici vulg. siue Centaurii ma-
ioris recent.

Fol. Senæ Epithymi ana ℥ j.

Polypodii quercini

Fol. Fumiterræ

Lupulorum recent. ana lib. j.

Glycyrrhizę contusę

Sem. Anisi ana ℥ iij.

Florum Boraginis Buglossæ

Violarum [ana] ℥ ij.

Fiat omnium decoctio ut moris est. De-
cocto excolato, quod erit, ad lib. ij. ad-
miscetur

Succi Lupulorum

Succi Fumi terræ depurat. ana lib. j.

Sacchari clarificati q. s.

Fiat Syrupus s. a. & condiatur cum pau-
culo Moschi & Ambra.

Datur

Datur ab vnciis iiij. ad vj. cum aqua
Lupulorum.

In Italia, præsertim Neapoli, est vñta-
tissimus ad cutis vitia, lue[m] venereã, epa-
is calidam & siccam intemperiem; quar-
anam ac lentam febrim. Eductit pitui-
am salسام, & humores melancholicos.
Patauii addunt Hellebori nigri non nihil.

Syrupus de Scolopendrio, Fernelii.

℞. Polypodii quercini
Rad. Buglossi vtriusque
Cort. rad. Capparorum
Cort. Tamarisci ana ʒ ij.
Scolopendrii; veri, seu Ceterach, ma-
nipul. iij.
Capillorum Veneris
Muscule Melissophylli ana manip. ij.
Coquantur in aqua libris nouem ad
emanentiam librarum quinque: colaturæ
huic adde Sacchari albi lib. iiij. Perco-
quantur in Syrupum.
Crassam terrenamque melancholiam
tenuat, mollit, fluxilemque reddit:
enem obstructione liberat, tumentem-
que soluit.

Syrupus de Polypodio.

Varia sunt Syrupi de Polypodio de-
scriptio.

scriptiones. Sed quarum omnium vice
supplere potest alteruter præcedentium
Syruporum duorum.

*Lohoch è Caulibus, seu Brassica,
Gordonii.*

℞. Succi Caulium rubeorum depurati
clarificati libram vnam

Croci ʒ ij.

Mellis despumati Sacchari ana lib.

Fiat Eclegma secundum artem.

In morbis pectoris vtile: plurimum quod
valet in omni raucedine & ablatione voci

Hydromel simplex.

℞. Mellis libram vnam

Aquæ pluuiæ vel fontis libras octo

Decoquantur donec Mel non ampliù
spumet.

Hydromel compositum.

℞. Aquæ fontis libras viginti

Mellis despumati libram vnam

Saluæ Origani an. pug. semis

Anisi Coriandri ana ʒ j.

Glycyrrhizæ ʒ ij.

Cinnamomi ʒ j. β.

Bulliant ad consumptionem quartæ par-
tis, & colentur,

Hydro-

Hydromel purgans.

℞. Hydromelitis ℥ xxxij.

Caricarum pinguium num. viij.

Fol. Senæ electæ

Polypodii quercini ana ℥ β.

Sem. Anisi ℥ j.

Cinnamomi ℥ β.

Zingiberis ℥ j.

Coquantur ad dimidium : colaturæ adde

Sacchari Candi rubei ℥ ij.

Misce vt artis est.

Eccoproticon felix ; pueris , senibus , ac
iis quos sedes remorantur , familiare.*Oxymel elleboratum , Gesneri.*

℞. Calamenthi Thymi Pulegii

Cardui Benedicti

Rosarum rubrarum

Menthæ crispæ ana p. j.

Sem. Anisi Ocymi

Sem. Vrticæ Romanæ

Sem. Anethi ana ℥ j.

Rad. Angelicæ

Rad. Fœniculi Althææ

Scillæ Iridis nostræ

Turbith ana ℥ β.

Ellebori albi

Esulæ præparatæ ana ℥ ij.

B b

Rad.

Rad. Asari ʒ j. β.

Galangæ Cinnamomi

Calami aromatici ana ʒ j.

Omnia trita infunde in aceti acerrimi lib. ij. vel q. s. triduo in sole vel ad fornacem in vitreo vase obturato. Tum decoquantur in olla vitreata ad dimidium ferè; tum colabis, modicè exprimendo, addesque Mellis despumati, Sacchari albi lib. j. & ad consumptionem Aceti decoques in Syrupi consistentiam. Dosis ad manducandam aluum ab ʒ β. vsque ad ʒ vj. cum decoctione Senæ & Polypodii, vel Symplo Violato, aliòve solutiuo.

Confert Epilepsiæ, asthmati, & omnibus morbis à materia frigida, crassa, tenaci, à phlegmate & melancholia dependente.

Potus Hippocraticus.

℞. Cinnamomi electi ʒ ij.

Zingiberis

Galangæ ana ʒ ij.

Nucis Moschatae ʒ j.

Sacchari albissimi ʒ xvj.

Vini albi potentis ac odoriferi lib. v.

Macerando probè tecta per horas octiduas vel decem, posteaque sæpe sæpiùs percolanda redigantur in potum Hippocraticum; transcolatum liquorem aromatibus in ma

manica Hippocratis contentis semper
affundendo.

Cerebrum & ventriculum laborat, spi-
ritus augeat, vitales facultates fulcit, animæ
vires reparat, ac infirmæ coctioni opem
præstat.

Cremor Ptisanæ.

℞. Hordei mundi excorticati lib. j.

Aquæ q. s.

Bulliat semel. Facta ebullitione re-
noueatur prima aqua, & affundatur re-
uens; quæ iterum coquatur ad consumtio-
nem medietatis, ac per pannum cole-
ur.

Tabidis ex usu est; hecticis, consumtis,
& à prolixo morbo extenuatis idoneus ac
perutilis.

Mostarda, seu Diasinapi.

℞. Pul. seminis Sinapi lib. iiij. β.

Alis communis albiſſ. lib. ij.

Vini rubei q. s.

Infundantur per noctem agitata in vase
lapideo aut testaceo vitreato amplo; ma-
tè addendo

Corticum Citri melle conditorum, &
rassiusculè incisorum ʒ iiij.

Conseruæ pro Mostarda lib. xvij.

Melazii, id est, Spumæ Sacchari nigræ

Bb 2

& li

& liquida [quam Syrupum vulgus vocat]
lib. xliij.

Caryophyllorum ℥ j. β.
Nucis Moschatae ℥ ij.

Aromata etiam crassiusculè incidantur
ac cum prædictis omnibus misceantur
seruenturque sic in usum debitum.

Conserua pro Mostarda.

Rx. Cydoniorum recentium in radula se
tyrocneftiderasorum partes tres
Mellis despumati partes duas.
Coquantur s. a. & seruentur vsui.

Mostarda ventriculum laxum ac frigi
dum corrigit, mollitiem eius aufert, co
ctionem procurat, appetentiamque deie
ctam erigit. Adhibetur potissimum ac
embammata seu intinctus mensis magna
tum.

Passula Laxativa.

Rx. Fol. Senæ Alexand. ℥ iiij.

Cinnamomi electi

Zingiberis ana ʒ iiij.

Aq. Endiuiae & Vini albi ana ℥ xiiij.

Infundantur per horas sex aut octo: de
inde ebulliant, ac leniter exprimantur.
huic decocto post colaturam adde Saccha
ri albi ℥ iiij.

Coquantur simul ferè vsque ad consi
sten-

stentiam Syrupi; iniiciendo tum, vt adhuc simul leniter bulliant, Passularum minorum repurgatarum \mathfrak{z} xij. Atque sic lege artis post iustam coctionem teponatur.

Eodem modo parantur & Zibebæ, & Pruna laxatiua.

Quamuis à longinquis partibus ob facilitatem vix quicquam educere possint; dantur nihilo minùs pueris, delicatulis, & hominibus alias medicinas purgantes respuentibus. Adstrictam enim aluum leniunt, fæcesque diutius detentas expellunt.

*Electuarium purgans,
de Pomo Citrio.*

℞. Corticum Citrii Pomi conditorum

Conseruæ Boraginis

Buglossæ

Violarum ana \mathfrak{z} β. [al. \mathfrak{z} v.]

specier. Diarragacanthi frig.

Diacrydii ana \mathfrak{z} β.

Surperi opt. \mathfrak{z} vj.

Sacchari albi lib. j. in aquis cordialibus
destillatis dissoluti.

Fiat Electuarium.

Plurimum in Gallia in usu est: sed in
confectione solida. Nonnulli additis fo-
lis Senæ, & pauculo Zinzibere ac Croco
labellas conficiunt s. a. loco Electuarii.

Euacuat omnes humores.

Bb 3 Holip-

Holippæ purgantes.

℞ Turbith electi ℥ v.

Diagridii ℥ ij.

Zingiberis Cinnamomi ana ℥ j.

Hermodytylorum ℥ j.

Puluerisata infundantur per noctem in aqua Rosarum fragrantissima : manè coquantur & exprimantur. Cum hoc expressum accolato, & sufficienti Farina Triticea candidissima, ac Sacchari albi ℥ iij. fiat Holippæ s. a.

Pituitosos biliososque humores educunt, nec non serosa excrementa euacuant. Vtui sunt iis potissimum quibus appetitus peruersitas alterius medicamenti summationem dissuadet.

Diasarum Fernelii.

℞. Syr. de Mentha

Violarum ana ℥ iiij.

Coquantur ad Mellis crassitiem : sub leni calore, amoto igne, inspergantur

Radic. Peponis aridarum

Sem. Raphani, Vrticæ,

maceratorum in aqua Rosarum, & rursus

arefactorum ac tritorum ana ℥ β.

Rad. Asari contrit. & per cribrum excoriatum ℥ j.

Cinnam.

Cinnamomi

Sem. Fœniculi ana ʒ i. β.

Fiat Electuarium liquidum.

Dantur ʒ iij. ex aqua Hordei, vel
Mussa, aut Sero lactis.

Omnis generis humores circa ventri-
culum & præcordia exuperantes vomitio-
ne ducit, non continuato, sed ex inter-
uallis facto impetu; vt senibus quoque
& aliis imbecilibus corporibus non ob-
stat. Eadem emendatiùs habebis infra.

*Pulvis contra Hydropem,
Erasti.*

2. Pul. Foliorum Soldanellæ ʒ j. β.

Sol. Senæ ʒ ij.

Turpeti vel Rhabarbari ʒ j.

Sacchari ʒ j.

Misce, fiat Pulvis.

Quidam addunt pulueris Lumbrico-
rum terrestrium præparatorum & exsicca-
torum ad pondus omnium.

Pulvis contra Vermes.

2. Sem. Santonici ʒ ij.

Coriandri præparati ʒ j.

Cornu Ceruini vsti ʒ j.

Corallinæ ʒ β.

Sem. Caulium ʒ j. β.

Bb 4

Rha:

Rhabbari opt. ʒ j.

Sacchari ʒ j. β.

Misce. fiat Pulvis.

Cum Rhabbarum pueris non semper sit acceptum, quidam loco Rhabbari sumunt tantundem vel paulo plus foliorum Senæ.

*Pilule de Nitro, Alexandri
Tralliani.*

℞. Aloës Colocynthidos

Scammonii Bdellii

Hellebori nigri præparati

Gummi Arabici ana ʒ ij.

Euphorbii præparati Nitri ana ʒ j.

Cum Succo Brassicæ & Melle cocto fiat massa.

Valent ad omnem humorem euacuandum à partibus remotioribus. In doloribus luis Venereæ, Epilepsia, & aliis pertinacibus morbis plurimi in Italia & alibi vsus.

Pilule Ilicæ Rhafis.

℞. Colocynthidos

Sagapeni ana ʒ vj.

Diagridii ʒ ij.

Cum Succo Porri fiant pilulæ.

Cum iudicio vsurpandæ sunt hæ pilulæ. Dantur à ʒ ij. ad ʒ j.

Velo-

Velociter passionem solvunt iliacam.
Cephalalgicis, hemicranicis saluberrimæ:
nec in hydropè & cachexia contemnen-
dæ. De iisdem infra agetur.

Trochisci de Rosis simplices, Mesuæ.

℞. Folior. Rosarum ʒ x.

Glycyrrhizæ ʒ v.

Spicæ Aromaticæ, siue Indicæ ʒ ij. β.

Tritis omnibus fiant Trochisci ex vi-
no albo.

Ventriculum & hepar roborant, hu-
moresque detergunt; atque aded phleg-
maticæ feбри conueniunt.

His si Scammonii opt. ʒ iij. adiciantur,
conficiuntur Trochisci purgantes.

Trochisci de Violis purgantes, Mesuæ.

℞. Violarum purpurearum mundatarum,

& mediocriter exsiccatarum ʒ vj.

Turpeti albi & gummosi ʒ iiij.

Succi Glycyrrhizæ Mannæ ana ʒ ij.

Succus Glycyrrhizæ, Manna & Violæ,
simul benè conterantur: quibus addatur
pulis tenuissimus Turpeti: diu simul te-
rantur, & cum Syryo Violato, si opus
fuerit, formentur Trochisci. Validiores
autem efficiuntur si Diagridii ʒ viij. ad-
dantur.

Bb 5

His

His vtimur ad expurgandam pituita
lentam in thorace, cui bilis vitellina c
permista: faciuntque ad difficultatem sp
randi.

Sief album cum Opio & sine Opio.

℞. Gummi Arabici Tragacanthæ
Amyli ana ʒ iiij.
Cerussæ lotæ ʒ vj.
Sarcocollæ nutritæ ʒ iij.

Opī ʒ j. Cum albumine oui fiat Sief
Paratur etiam sine Opio, vt vtrumque fit
in promptu. Rhases alibi sumit Cerussæ
ʒ: Mesue addit Tus.

Ad oculorum fluxiones, lippitudine
acres, & dolores inde natos leniendos ad
hibetur, cum aliquo conueniente liquore.

Collyrium album, Galeni.

℞. Cadmiæ lotæ, id est, Tutia præpa-
ratæ ʒ xvj.

Cerussæ ʒ j.
Amyli Gummi Arabici

Tragacanthæ ana ʒ iiij. Opī ʒ ij.

Excipiantur cum aqua pluuiæ vel Rosa-
cea, & fiat Collyrium siccum. Paratur
etiam sine Opio.

Ad Oculorum vstiones, pustulas, chy-
moses, fluxiones, lippitudines acres, ac
dolores inde natos leniendos faciunt hæc

Colly-

Collyria: maximè in his qui nullam mordacitatem ferre possunt, vtilia. Sed postèus in Italia est frequentius vñtatum. Vñus est cum ouo.

Pomum Ambra.

℞. Santali Citrini ʒ vj. ʒ ij.
 Ligni Aloës ʒ β.
 Rosarum rubearum Basiliconis
 Lauendulæ Anthos
 Maioranæ ana ʒ iiij. ʒ j.
 Corticum Citri ʒ vij.
 Cinnamomi Nucis Molchatae
 Macis Caryophyllorum
 Coriandrorum præparatorum
 Cardamomi ana ʒ iiij. ʒ j.
 Labdani puri ʒ viij.
 Styracis Calamitæ ʒ vj. ʒ ij.
 Styracis liquidæ ʒ iiij.
 Asæ dulcis ʒ x.
 Cere citrinæ ʒ j. β.
 Terebinthinæ Cypriæ ʒ iiij.
 Aquæ Rosarum ʒ ij. β.
 Moschi Alexandrini
 Ambre cin. ʒ ij. β.
 Fiat massa.

Odore spiritus instaurat, & cordi robur addit.

Vñus est maximè cùm aliqua aëris inquinati suspicio viget: cui tunc temporis An-

B b 6 gelica,

gelica, Zedoaria, Ruta, & præsertim
Camphora rectè adiicitur.

Candela pro suffitu.

R. Styracis Calamitæ

Carbonum Salicis ana ʒ ij.

Benzoini ʒ j.

Caryophyllorum ʒ β.

Laudani ʒ. vj.

Terebinthinæ Cypriæ, & Mucilaginis Tragacanthæ cum Aqua Rosarum factæ q. s.

Fiant Candelæ, Tedæ, vel Auiculæ: quibus pro deliciarioribus Galliam Moschatem aut Ambram addere licebit.

Oleum Ranarum, Mesuæ.

Ranarum fluuiatilium libra dimidia decoquitur in olei Sesamini sextario, in vitro optimè clauso, vsque ad ipsarum dissolutionem.

Arthritidi & Podagræ calidæ prodest.

*Oleum præstantissimum, vermes
pellens, aut necans.*

R. Myrrhæ electæ ʒ vij.

Mastiches ʒ ix.

Aloës Epaticæ ʒ xvij.

Salis communis lib. j.

Con-

Contusa omnia per retortam igne len-
to destillantur magna diligentia. Exibit
primò aqua, dein Oleum admirandum:
uius (inquit Melichius) vnica gutta
preciosissimis etiam gemmis est precio-
rior. Siquidem infantes à vermibus infe-
stos inunctum liberat à morte. Vulnera
etiam, nisi in ipsa vsque ossa penetrèt, gur-
gula vna consolidat intra horas xxiiij.

Oleum Balsami.

2. Terebinthinæ ʒ xvij.
Myrrhæ Cinnamomi
Caryophyllorum
Lucis muscatæ Aloës
Cubebarum Castorei
Sedoariæ
Castiches Galangæ
Signi Aloës
Tormentillæ
Dictamni albi ana ʒ ʒ.
Gummi Hederae
Sauris ana ʒ ij.
Olei Laurini
Albani Gummi Elemi
Olei Oliuarum
Aquæ Vitæ ana ʒ vj.
Rad. Chelidoniæ
Mucocollæ
Matrisilvæ Salviæ ana man. j.
Bb 7 Terenda

Terenda tere, & cum aqua Vitæ permiscenda
atque cum Terebinthina in cucurbita
benè clausam immissa, in balneo Mariæ
calenti quatrimum deponere. Dein super
cineribus igne lento distilla, ita ut bidentium
opus soluas.

Valdè à Melichio hic liquor commenda-
datur in paralyfi, nervis contractis, do-
lore dentium, pestiferis apostematibus
pauculis guttulis.

Oleum Cerae, ex descriptione Melichii

Præstantissimarum esse virium, inquit
comperimus ad dolores hypochondriorum
& Stomachi. Tussi medetur; vulnera sim-
plicia, quæque in partibus facta sunt ne-
crosis, curat. Quod intra corpus exhibere
solet, sic fit:

Cera liquata in aquam communem
proicitur octies aut decies: dein per re-
tortam, cui cineres non subsunt, destilla-
latur igne moderato. Initio autem non
Oleum, sed quiddam Butyro simile pro-
dit: ideoque quinquies vel sexies repeti-
ta destillatione opus erit, donec non con-
crescat ampliùs Oleum. Quod si coagu-
lari videris, destillationem repete, donec
sincerum prodeat Oleum.

Alio modo fit, vulneribus sanandi
vtilis:

Cer

Cera liquata in vinum album quàm haberi poterit optimum, proicitur octies deciesve, semperque diligenter subigitur. Deinde distillatione modò descripta Oleum elicitur.

Oleum Zanetinum, Melichii.

Patavinis & Venetis est in usu, & miracula præstat: calidum enim quantum tolerari potest vulnere instillatum, glutinando xxiiij horarum spatio persanat.

℞. Apii manip. ij.

Chelidonii M. iiij.

Rorismarini Sicilianæ [seu Androsami quorundam]

Plantaginis Absinthii ana M. ij.

Aluix M. iiij. Millefolii M. ij.

lor. Calendulæ M. vj.

lor. Verbasci M. iiij.

Laurentinæ M. vj.

Auricolæ M. iiij.

Succi Rutæ ℥ iiij.

Olei communis lib. vj.

Terebinthinæ

resinæ Pini ana lib. iiij.

Albani ℥ iiij.

Iridis Æris ℥ iiij.

Ex herbis contusis succus exprimitur,

quo Galbanum dissolvitur. Additis po,

tea Oleo & Terebinthina, in vase cooper-

to si-

to simul coquuntur, donec omnis succus
sit absumtus: quo facto per stamen forti-
simè exprimuntur. Expresso adhuc calen-
ti mox Viride Æris additur, & tam diu
subigitur, donec exactè sit commixtum
& colorem viridem adipiscatur oleum.

*Vnguentum Alabastrinum,
Fauentini.*

℞. Succi Chamæmeli recent. ℥ iiij.
Succi Rosarum recent. ℥ ij
Succi Rutæ recent.

Betonicæ ana ℥ j. β.
Succi radicum Althææ ℥ ij.
Olei Rosati Omphacini lib. j. β.
Alabastri opt. & puriss. ℥ iiij.

Pulueriscentur subtiliter, & per diem na-
turalem infundantur in oleo omphacino
deinde cum Cerae albæ q. s. ex omnibus
fiat vnguentum.

Prodest in omni dolore capitis, siue per
essentiam, siue per consensum; adsit febris,
vel non: ac in omni tempore paroxysmi
possumus vti, excepto principio.

*Vnguentum de Tabaco siue Peto,
Iouberti; quod Vnguentum
Nicotianum vocat.*

℞. Foliorum Peti lib. ij.

Pin-

lingued. Porci recent. vel diligenter lota lib. j.

Herba maceretur per noctem in vino subro. Manè bulliat igne lento cum pinuedine, ad Vini consumptionem; & coctur exprimendo: colato addantur

Succi Peti lib. β.

Resinæ Abiegnæ ℥ iiij.

Coquantur ad succi consumptionem; circa finem addendo

Rad. Aristolochiæ rotundæ puluerisatæ ℥ ij.

Ceræ nouæ q. s.

Fiat vnguentum. Si malis Ceratum, augetur pondus Ceræ. Si magis siccare velis, & consolidare, addantur Mumix Succini ana ℥ iiij.

Vsurpatur efficaciter ad scabiem, & præsertim tineam capitis; item ad vlcera & vulnera, tam recentia quàm antiqua; ad inflammationes & furunculos; adusta quoque & morphæam; ad tela item ac ad lobulos extrahendos. Ad scrophulas admirandum esse, asserit huius Vnguenti inventor Ioubertus.

*Vnguentum ex succis,
Iul. Caesaris Arantii.*

Olei Rosati opt lib. j.

Ceræ albæ nouæ ℥ viij.

Folio-

Foliorum Plantaginis Lapathii

Solani Centauri minoris ana man

Herbæ pridie cælo sereno, orto iam sole, æstate aut autumnno incunte collectæ bulliant donec probè coctæ fuerint, postea colentur, torculari exprimantur. Expressum verò, abiectis herbis, denuò moderate ferueat vnà cum oleo, in quo cera lento igne liquecat, donec omnis aqua absumatur humiditas, & solidam Vnguenti formam acquisierit; quo ferè iam refrigerato, adde Camphoræ puluerisatæ ʒ

Vlceribus fœdis ac malignis opitulatur. mundificat, siccatur, abstergit, coquit, & consolidat, fluxiones acres in iisdem temperat, inflammationes reprimat, ac sinu cicatrice tegit.

Vnguentum Pediculorum.

℞. Sem. Staphisagriæ ʒ ij.

Hellebori albi ʒ j.

Salis ʒ ij.

Argenti viui ʒ ij.

Aceti vini ʒ ij.

Axungia porcina lib. j.

Olei Laurini ʒ ix.

Saponis Veneti lib. β.

Fiat vnguentum secundum artem. Quidam omittunt Saponem Venetum: quidam addunt oleum Spicæ.

Vnguen-

*Vnguentum ad verrucas seu carunculas
in meatu urinario natas,
Alphonſi Ferrii.*

℞. Mercurii præcipitati ʒ ij.

Vnguenti de Ceruſſa ʒ β.

Addatur his pro magnitudine affectus
aliquid Olei Vitrioli aut Aquæ fortis, im-
mittendo de his parum ſupra candelam
ceream in canalem. Poſteſt autem loco
Vnguenti de Ceruſſa à principio ſumi
Vnguentum Anodynum, in æqua cum
Præcipitato portione.

Candela ſic ſiunt in hunc uſum.

℞. Cerae albæ lib. j.

Terebinthinæ Venetæ ʒ j.

Liqueſcat Cera; poſtea addatur Tere-
binthina, & in his liquatis intingantur
ellyphnia, ſiantque candelæ iuſtam craſſi-
tatem habentes.

Vnguentum Anodynum.

℞. Olei Liliorum alborum ʒ vj.

Anethini Chamæmelini an. ʒ ij.

Olei Amygdalarum dulcium ʒ j.

Pinguedinis Anatis Gallinæ an. ʒ ij.

Cerae

Ceræ albæ parum. Misce.

Mitigat corporis quacunque parte dolores.

Ceratum ex Betonica, Augustanorum

℞. Terebinthinæ Resinæ Pini

Ceræ flauæ an. \mathfrak{z} ij.

Betonica puluerisatæ \mathfrak{z} v.

Mastiches Turis an. \mathfrak{z} ij.

Mumiæ \mathfrak{z} j. β . Misce, fiat malagma.

Vsus huius cerati est in vulneribus capititis. Vulgo ita fit:

℞. Resinæ puræ

Ceræ nouæ ana \mathfrak{z} vj.

Terebinthinæ lib. ij.

Succi Apii Betonica

Plantaginis an. \mathfrak{z} vj.

*Ceratum Diachalciteos, Galeni,
sen Diapalma.*

℞. Axungię Porci veteris, à membranis per liquationem & colationem purgatæ lib. ij.

Olei veteris

Lithargyri triti & creti an. lib. iij.

Chalcitidis [vstæ,] siue eius loco Vitrioli stalactici \mathfrak{z} iij.

Liquefactis igni Axungię & Oleo miscetur Lithargyrum & Chalcitis siue Vitriolum, mouendo continuò rudicula ex

ramo

ramo Palmæ recentissimo, dempto prius cortice, confecta: verum ubi pars rami medicamento immissa, calore exarescit, abscindatur, & reliqua adhuc recēs immittatur, & coquatur ad convenientem crassitiam, injecto inter coquendum ramo Palmæ viridis minutim inciso. Aliqui sumunt pro ramo inciso succum ex eodem expressum. Alii, ubi propè excoctum est, addunt tenerorum Palmæ ramorum minutim incisorum, & in nodulo ligatorum manip. iiij. In defectu ramorum Palmæ immatur rudicula ex recenti succulentoque ramo Quercus. Alii sumunt ramum Pyri, aut Pruni siluestris, aut Salicis: Alii Cannabis utuntur.

Ambustis, ruptis & contusis, vulneribus crucentis, tumoribusque pestilentibus utile.

Preparatum pro Herniosis, Noribergensibus usitatum, ex descriptione Volkeri Coiter Frisii.

Pul. Mastiches Mumia
 resinis Electri siue Succini
 Gummi Arabici
 Tragacanthæ
 Rosæ opt. Balaustiorum
 Rosarum an. ʒ β.
 sanguinis Draconis

Boli

Boli Armeni

Lapis Hamatilis an. ʒ vj.

Olci Rosarum ʒ iiij.

Myrtini Mastichini an. ʒ j.

Cum Cera & Resina q. s. Fiat Ceratum.

*Emplastrum ad Tophos, Angu-
stanorum.*

℞. Picis naualis

Colophonix an. ʒ iiij.

Mucilaginis Radicum Althex ʒ ij. β.

Galbani Mastiches Myrrhē

Turis Ammoniacy an. ʒ j. β.

Propoleos Visci Quercini

Aristolochiæ rotundæ Aëris vsti

Cera citrinæ

Terebinthinæ an. ʒ iiij.

Fiat secundum artem Emplastrum.

In tumoribus & nodis luis Venereæ fe-
lici successu vsurpatur.*Emplastrum de Ranis, Vigonis,
ex correctione Rondeletii.*

℞. Olei Chamæmelini Anethini

De Spica Liliorum an. ʒ ij.

Pinguëdinis Porci

Pinguëdinis Vituli an. lib. j.

Euphorbii Turis ʒ v.

Olei Laurini ʒ j. β.

Pic

Pinguetudinis Viperæ ℥ ij. β.
Lanarum viuentium num. vj.
Lumbricorum lotorum in vino ℥ iij. β.

Iucci rad. Ebuli

Linulæ Campanæ an. ℥ ij.

Chœnanthi Stœchados

Matricariæ an. manip. j.

Vini generosi lib. j.

Bulliant omnia ad consumptionem
vini.

Colaturæ adde Litharg. auri lib. j. &
in agitentur. Deinde adde Cera citri-
æ q. s. Terebinthinæ Abietis ℥ ij. Au-
erantur ab igne, & adde Styracis li-
uidæ ℥ j. β. Agitentur fortiter. Post-
quam refrigerit aliqua ex parte, adde Ar-
genti viui extincti in salina hominis ieiui-
℥ iij. Fiat Emplastrum.

Hoc Emplastrum, inquit Rondeletius,
incipit quantitatem paruum Argenti viui:
quare efficacius reddetur ad omnia, si Ar-
genti viui ℥ vj. receperit, & Euphorbii
β. Quod Argentum viuum extinguatur
liuâ, superstitiosum est & inutile.

*apis septicus, seu Canterium poten-
tiale, Angustanorum.*

Cineris Clauellati

Calcis viuæ an. partes æquales.

Macerentur per dies aliquot in aqua
com-

communi: postea colentur, & durum quatur vt artis est.

Eo chirurgi in parandis emissariis fonticulis ac abscessibus extrorsum videntibus communiter vtuntur.

Lapis Philosophorum, Augustanorum

℞. Aluminis Rochæ, seu communis Vitrioli Hungarici an. lib. j.

Misceantur in olla non vitreata, affundendo Aquæ fontanę lib. iiij. Hæc perpetuò agitando ad ignem lentum, spuma semper auferendo, liquecant.

Postea ad de

Boli Armeni ℥ j. β.

Cerussæ albæ & mundissimæ ℥ j.

Camphoræ ℥ ij.

Minutissimè puluerisata misceantur rudicula semper agitando, ac sub fine addendo

Aceti vini albi lib. β.

Coque ad iustam lapidis consistentiam.

Mirabilis eius vsus in vlceribus fluidis ac putrida humiditate fœdis: sinus & stulas extergit, ac consolidat: vlceribus insuper malignis, quæ cacoëthe vocantur cicatricem inducit.

LOBI

OBELIANÆ & RONDELETIANÆ
FORMVLÆ ALIQVOT,

omissæ, aut ab ipsis emendatæ;
cum aliis quibusdam.

Decoction Communit, Clysteris.

. Betæ Maluæ Parietarię
Brancę Vrsinæ Mercurialis ana m. j.
Furfurum p. j.
Fiat decoction in sufficienti quātitate aque.
*Quodsi addantur Anisi & Fœniculi ana ʒ ij.
melior erit decoction.*

*Decoction Communit Medicinæ,
ad dissoluenda solutina.*

. Hordei integri p. j.
Cunorum & Passularum ana p. x.
Glycyrrhizæ rasæ ʒ ij.
Iolarum p. j.
Anisi ʒ j. Fiat decoction.

*Dicitur autem Communis, quòd nulli parti
ut humori sit destinata, ut est Pectoralis,
ita utimur in affectibus pectoris; neque pitui-
tem, bilem vel melancholiam euacuet; sed
leniens sit, ad omnia excrementa. Id-
circo Tamarindos expunximus, quia laduna*

CC um-

ventriculum, & ad bilem praescribunt.
Anisum addidimus, ut flatus à *Prunis* & *Hordeis*
 deo genitos discutiat; & quia odorata semina
 cum medicamentis laxantibus admiscenda in-
 perat Hippocrates.

Decoctio Pectoralis.

℞. *Hordei integri* p. j.
Glycyrrhizæ ℥ β.
Capillorum Veneris *Hyssopi ana* m.
Ficium *Dactylorum mundatorum*
Passularum enucleatarum an. p. vj.
Florum Violarum *Buglossi ana* p. j.
Anisi ℥ ij. Fiat decoctio.

Usui erit ad medicamenta laxantia di-
 soluenda; utilis ad deterfionem & expe-
 ctorationem in pleuritide.

Electuarium Caryocostinum.

℞. *Hermodactylorū* *Diagridii ana* ℥ vj.
Caryophyllorum *Costi* *Cumini*
Zingiberis ana ℥ iij.

Mellis despumati ex *Vino albo aroma-*
tico ℥ ix. Misceantur, & fiat Conditum
Vini autem vis, ut *Mellis*, longa deco-
 ctione valdè minuitur. Praestaret ut
 duabus *Mellis* despumati partibus, mol-
 lissimo igne; affuso paucò liquore, & *Vini*
Passi aut *Sapç* parte vna.

Apud

Apud Londinenses quosdam in frequentissimo usu est, ad articulares affectus, podagricosque dolores: *materia tamen fluente*, ait Lobelius, *prestaret vii Rhabarbro & Myrobalanis; aut saltem Hermodylis, permixtis Scammonio aut Diagridio, & alijs.*

*Pilule Sanctæ, Italarum,
ad Luem Veneream.*

. Trochisc. Alhandal Scammonii
alis Gemmæ
agapeni ana æquales partes.
Cum Rhodomelite fiat massa. Dosis ʒβ.
ob Sal Gemmæ humida massa est. Qui-
am ex Succo Porri parandam iubent.

*Chylisma Pilularum, Saccharo condi-
tarum, Thomæ Plateri.*

. Specierum Diambarû, vel Diamarga-
rit. frig. ʒβ.
Cinnamomi selectissimi ʒj.
Spiritus Vini lib. iij. Macerentur per
dies aliquot in vase vitreo, probe obli-
quæ, ne quid expiret. Vas quotidie agitari
debet: deinde relictis in fundo vasis fx-
bus, adde
Trochisc. Alhandal, Rhabarb. electi
ana ʒvij.

C c 2 Scnæ

Senæ mundatę, & Gratiolę præparatę
contusarum ana 3 vj. β.

Turbith & Dacrydii, (Italico more præparati,) ana 3 vj.

Agarici candidissimi 3 iv.

Veratri nigri legitimi 3 iij.

Omnia incisa macerentur in eodem liquore per dies xiv. Colentur, & deinde distillantur in balneo Marię, ad consistentiam, secundum artis præcepta. Tunc de Aloës Succotrinę selectissimę, in pulverem redactę & præparatę, 3 x Formantur Pilulę. Obvolvuntur pulvere Cinnamonis aut Glycyrrhizę, & exactè siccantur per se in umbra. Deinde accipe Albumen unius Ovi, vel q. s. & in eo dissolvitur Gummi Tragacanthi 3 j. pulv. Sacchari albißimi q. s. ex lib. β. operiantur primo tegumenti involucro. Deinde conditum absolvaatur, ut cæterorum tragematum.

Dosis à 3 j. ad 3 β. vel 3 j.

Si Extractum volueris conservare formā Opiatę, tunc adime Trochiscos Alhandal; quos ultimò miscere poteris. Aufer item Aloën, & adde eorum loco Catholicum commune, eodem pondere. Datur in ea forma ad 3 j. vel 3 j. β.

Hac artis lege pleraque alia Catapota & Medicamenta in gratiam molliculorum & morosorum nitidè cōflabat Ludovicus Myreus, Matthiæ Lobelii gener; Anisus iter

em laxatiuum, Cari semen, & similia;
Semen contra vermes, descriptum in
pulueres à prædicto Myreo.

Cremor Tartari.

Tartari subtilissimè triti lib. j.
Superaffusa aqua decoquatur terreo va-
Inter coquendum Spumam colligito,
siccato; quam Tartari Cremorem
pellant. Per se exhibitus, blandè purgat.
i calculosis cum Dacrydio exhibent,
arcano magno.

*Trochisci è Minio, corrodenes,
Ioannis de Vigo.*

Medullæ panis crudi, bene fermentati
3 iv.

alimati electi 3 j.

hii 3 β.

æ Ros. q. s. Fiant Trochisci. Sic-
centur calore clibani tepidi.
lis sepiissimè vtuntur Chirurgi.

Oleum Rosatum completum.

et ex Oleo dulci & maturo, & Rosis
insis, contusis, & soli expositis, & le-
r decoctis in duplici vase, vt Oleum
omphacinum componitur.

C c 3

Hoc

Hoc ad dolores conuenit. Post annum
 valet adhuc ad confortationem & dolo-
 mitigationem. Omphacinum verd post
 num inutile est ad refrigerandum & repela-
 dum. Quare pro completo usurpari potest
 cundo & tertio anno. Regiones autem qua-
 rent Oleo Omphacino, addere possunt Ompha-
 cium & Plantaginem, vel Succum Rosarum
 in infusione Rosarum, vel iteratis infusionibus
 adstrictoriam vim oleo conciliare: aut tem-
 re Vuae acerbæ coquere in Oleo dulci quantitate
 sufficientem prædictæ Vuae, cum acinis, ad
 strictionem.

*Syrupus de Hedera terrestri,
 siue Pulmonarius.*

℞. Hederae terrestris Hyssopi
 Veronicae Pulmonariae Melissæ ana ℥ ss
 Vini optimi lib. ij. β.

In fusione facta per aliquot horas, co-
 quantur s. a. addendo Sacchari albi
 mi lb. j.

Vsitatus est in vitiis pulmonis, & phthi-
 ac aliis fluxionibus ad pectus decumbe-
 ribus.

Aqua Cinnamomi, contra Epilepsiam

℞. Cinnamomi optimi lib. j.
 Sem. Præoniæ recentis ℥ j.

Ga

Gallitrichi Caryophyllorum an. ʒ v.
 Visci quercini Rad. Pæonię ana ʒ β.
 Incisa & contusa omnia macerentur in
 aq. Cinnamomi q. s. per dies octo. Dein-
 de fiat destillatio per balneum.

Morselli Laxativi.

ʒ. Conseruę Violarum Boraginis
 Buglossi ana ʒ ij.
 Corticum Citri ʒ j.
 Zingiberis ʒ j. β.
 Specierum Diatrágacanthi frigidi ʒ ij.
 Dacrydii ʒ vj.
 Fol. Senę, Turpethi ana ʒ β.
 Croci ʒ j.
 Sacchari albissimi lib. j. Alii sumunt ʒ viij.
 Fiant Morselli.

Passule purgantes, cum Rhabarbaro.

ʒ. Rhabarbari optimi ʒ j.
 Opicę Indicę ʒ ij.
 Cinnamomi ʒ iiij.
 Incisa infundatur in vino dulci recenti
 quantū satis fuerit. Facta vna atque altera
 bullitione, & Saccharo pauco, vt dulce-
 scat, addito, cum hac irrorentur Passularum
 ncia octo, donec ad consistentiam perue-
 niant, in loco calido, secundum artem.

Cc 4 Empla-

Emplastrum ad Hydropem.

℞. Stercoris colūbini aceto macerati lb
Sulphuris viui ℥ j.

Nitri, vel Salis Gemmei ℥ β.

Pul. Rad. Enulæ Baccarum Lauri

Anethi Florum Chamemeli an. ʒ

Sem. Nasturtii ʒ ij.

Decoquantur omnia in Vino ad con-
stentiam, & addantur

Mellis ℥ ij. Terebinthinæ ℥ j.

Succi Ebuli ʒ ij. Iridis ℥ j.

Farinæ Fabarum ʒ j. β. Fiat Emplastrum

Patauii vñtatissimum est.

Emplastrum ad callos pedum efficax

D. Iac. Cargilli Sc.

℞. Gummi Ammoniaci Aceto soluti ℥

Vitrioli Romani, Calcis viuæ ana ʒ

Viridis Aëris ʒ β.

Auripigmenti, Cantharidum ana ʒ j.

Ceræ nouæ ℥ iiij.

Olei Chamæmelini & Euphorbii ana q.

Fiat Emplastrum.

Emplastrum è pelle Arietinâ, ad her-

nias, Arnaldi de Villâ Nouâ.

℞. Lithargyri Auri Lapidis Hæmatitis

San

Sanguinis Draconis Boli Armeni
Mumiæ Galbani Turis
Lumbricorum terrestrium ana 3 β.
Picis naualis Colophonix
Cerae albæ & rubræ ana 3 j.
Rad. Consolidæ maioris, minoris & me-
diæ ana 3 iij.
Rosarum rub. Myrrhæ Aloës ana 3 iij.
stellæ marinæ combustæ
Gallarum combustarum
Aristolochiæ rotundæ ana 3 vj.
Visci Quercini Terebinthinæ ana 3 iij.
Sang. hominis rufi lib. j. minus quarta.
Conficiatur hoc modo: Pellem Arie-
nam, recenter detractam seu excortica-
tam, cum pilis, coque ad dissolutionem.
Solaturæ lib j. misce Viscum Quercinum
dissolutum. Cum spatulâ stannæa agite-
ur. Deinde Ceram, Picem, Colophoniam
adde. Ammoniacum & Galbanum dis-
solvantur in Aceto, & colentur. Adda-
tur deinde pulvis aliorum: Ultimo loco
odorata, & quæ minorem calfactionem
ferre possunt. Postremò Terebinthinæ
Sanguis permisceatur. Vermes in Vino
cocti, & diligenter triti, commisceantur.
Coquantur, donec non inquinent manus,
manibus inunctis Ol. Rosato vel Cydo-
norum; non Violaceo, vt vulgus facit.
Calaxentur: fiant magdaleones. Ego, in-
vit Lobelius, tantum mutavi, quòd pro Pal-
leam

Cc 5 leam

610 FORMVLÆ SELECT. PHARM.

leam Marinam, Stellam legerim, qua
ad id efficacissima. Quidam Sanguinis homin
rui legitur, censerem potius hominis pitu
tosi legendum, qui sanguinem viscosiorem
tenaciorem habet. Satis siccant alia medicame
ta: sed parum refert. Nam oporteret acciper
sanguinem eorum qui truncantur capite, i
quibus fluit venalis & arterialis: & sic est sa
siccus & viscosus.

FRAN

FRANCISCI DISSALDEI

D. Medici Parisiensis Regii

PHARMACONETES,

siue

PHARMACITIS BIBLOS:

Liber continens PHARMACA tam
Simplicia quàm composita, quæ
in Officinis parata habere debent
Pharmacopœi.

Apud Galenum lib. 6. Comp. Med. Gen.
 cap. 7. reperias Andromachum scripsisse
 librum *Φαρμακονίτην*, de Remediis quæ ex
 trinsecus corpori admouentur. Sed legen-
 dum, vocabulo non admodum vsitato
Φαρμακωνητήν, vt sit Liber comparādorū
 Remediorum: ad eum modum quo apud
 Pollucem citatur ex Dinarcho *ἐν τω νητῆρι*,
 aut vocabulo vsitatissimo *Φαρμακίῳ*.

POPVLO SALMVRIENSI

Fr. Diffaldeus Medicus

S. P. D.

CONQUESTI sunt apud me sapius vestri pharmacopœi (Cines optimi,) quod in tanto Medicamentorum, tam Simplium quàm Compositorum pelago haerentes, quod in medicum usum parare, quod omittere debeant, ignorent. Vnde fit, ut Officinis, copiam alioquin Remediorum laborantibus, ea saepe deficiat quae ad morborum curationem sint necessaria. Hinc quanta agris perniciēs oriatur, Eius nequē Invenire innoxios non difficile dictum est; non parvo etiam ipsorum Pharmacopœorum damno, qui necessariis dum saepe carent, multa inutilia sibi sibi corrumpi experiuntur. Ego itaque ex longo usu, multumque tristitia, quam vestri habeo, experientia, agrorum bono publico hac exaravi, ut non posterum nec medicis deficiat quod praescribant, nec pharmacopœis, quo medicorum praescripta consequantur: Et venia locus non sit, si eorum officinae aut necessariis carent, aut pravis scient. Volo praeterea, ut hoc perpetuo meministis Pharmacopœi, hac sibi Pharmaca tantum se, hoc est, si ex suo arbitrio abutantur, venena praesentissima; sin ex arte ac methodo à eritis medicis in usum traducantur, remedia efficacissima: atque ut pie simul ac eleganter

C c 7

ab He-

ab Herophilo olim dictum, ad restituendam
 nitatem $\chi\epsilon\iota\gamma\alpha\varsigma$ $\delta\epsilon\omega\nu$. Ne ergo eorum usum si
 permittant temerarii; aut, si permiserint, s
 nerè in eos à iudicibus, quibus publice salus
 cura tradita est, animaduertatur. Seruavi au
 tem in his scribendis eam temperiem, ut i
 Simplicibus ea tantum enumerarem, qua
 Officinis asseruari solent, iis qua ex tempore co
 ligi possunt omissis, & iis etiam qua ad illa
 strum tantum & magni nominis Compositi
 num dispensationem comparanda veniun
 quòd ea satius sit recentia habere, quàm car
 exosa & vetustate exsoluta, ex Officinis in usui
 producere. Ex Compositis autem, ea etiam sol
 in unoquoque genere recensui, qua & selectio
 ra sunt, & usu frequentiora, & magis ad sa
 lutem agrorum comparandam necessaria; in
 qua in vulgatis Dispensatoriis descripta habent
 tur, solo digito, ut aiunt, indicatis: iis autem
 qua vulgò non extant, integris adscriptis. Si
 factum spero, ut hic Medicamentarius libellus
 & mole minor multò, & suis tamen numeris
 omnibus ornatioꝝ ac cumulatioꝝ prodeat. No
 tas etiam huc illuc adpersi, lecturis, nisi mi
 animus fallit, non inutiles futuras. Hæc si
 publicè prosunt, satis superq; mihi est; qui in
 hoc mustaceo laureolam non quero. Vivite,
 ac Valete.

615
Φαρμακωνητης, η Φαρμακωτης βιβλος,

hoc est,

MEDICAMENTARIVS LIBELLVS,

feu

LIBER CONTINENS PHARMACA,
TAM SIMPLICIA QVAM COMPOSITA,
quæ in Officinis parata habere
debent Pharmacopœi.

MEDICAMENTA SIMPLICIA.

TERRENA & MARINA

Arsenicum.

Bolus Armena.

Ærugo.

Terra sigillata.

Cadmia, seu Lapis
Calaminaris.

Fragmenta pretiosa.

Pompholyx.

Lapis { Bezaardicus
Sanguinalis

Cerussa.

{ Iudaicus,
Lazuli.

Sulphur { Vinum
Excoctum
Flores Sul
phuris

Bitumen Iudaicum

Ambarum Griseum

Corallium.

Alumen.

Margaritæ.

Sal gemmæ

Succinum.

Chalcanthum

METALLICA.

Vitriolum Romanū.

Lithargy-
rum {

Auri

Argenti

Chrysocolle nostra,
siue Borax, res fa-
ctitia.

Argen-

Argentū vium	{	Simplex	Salvia.
		Sublima-	Vitex, seu Agnus
		tum	Senna
		Præcipi- tatum	Epithymum Cuscuta.

P L A N T A R V M

R A D I C E S.

Folia, cum surculis.

Summitates Rubi	Angelicae
Equisetum	Asari
Herniaria	Aristolochiarum
Absinthiū latifoliū	trium.
Ceterach	Althææ
Artemisia.	Capparum, cortex.
Calamintha.	Acori vulgaris.
Euphrasia	Asari
Caryophyllata, cum radice.	Galangæ
Mentha,	Helenii
Origanum.	Pyrethri
Pulegium	Paoniæ
Betonica	Tussilaginis
Verbena	Ireos Florentinæ.
Periclymenum	Acori veri, siue Ca-
seu Caprifolium.	lami aromatici vul-
Chamædrys	garis.
Chamæpitys	Cyperi.
Centaurium minus	Spicæ Nardi.
Hypericum	Sinarum, seu Ching.
Melissa	Salsæ Parillia.
	Ellebori { Albi.
	{ Nigri.
	Rha-

Rhabarbari.

Polypodii.

Agarici. *Fungus est
inter radices adnu-
meratus.*

Hermodactylorum.

Turbith.

Glycyrrhizæ.

Pentaphylli.

Bistortæ.

Tormentillæ.

Plantaginis.

LIGNA.

Aloës

Guaiaci

Nephriticum

Visci quercini

Sassafras

Santali { Albi
Rubri
Citriini

CORTICES.

Guaiaci.

Tamaricis.

Radicum Capparum.

Turis.

Cinnamomi.

Macis.

Fraxini.

Sambuci.

Mali Citrii.

Mali Aurantii.

Cupulæ Glandium.

Malicorium.

FLORES

Verbasci albi.

Rosarum Rubrarum

Violarum.

Cichorii

Nymphææ,

Balauftiorum,

Cytinorum

Buglossi.

Boraginis.

Croc.

Beronicæ.

Caryophyllorum.

Rorismarini.

Agni.

Præoniæ.

Sambuci.

Anethi.

Chamæmeli.

Meliloti

Geniæ.

SEMI-

SEMINA.

Cydoniorum.

Pſyllii.

Acetosc.

Hyoscyami { albi.
nigri.Quatuor { maio-
feminafrig. } ra.
 { mino-
 } ra.Capita Pa { albi.
pauers. } nigri.

Hordei excorticari.

Berberis.

Malux.

Althææ.

Raphani.

Atriplicis.

Cnici.

Periclymeni.

Bombacis.

Coriandri.

Vrticæ.

Cumini.

Sinapi.

Ocimi.

Citri.

Nigellæ Romanæ.

Pæoniæ.

Agni, seu Viticis.

Lini.

Fœnigraci.

Lithospermon.

Saxifragæ.

Lupini.

Orobi.

Fabæ.

Quatuor se- { maio-
minacalida. } iora
 { mi-
 } nora

FRUCTVS.

Amygdala { dulcia.
 } amara.

Ficus.

Gallæ

Nuces Cupressi.

Nuces Moschatæ

Dactyli

Sebesten.

Iuiubæ.

Tamarindi.

Passule { Damasce-
 } na.
 { Corinthia-
 } cæ.
 { Vulgares.
 } Cassia

Cassia cathartica.

Halicacabi.

Quadruplex genus

Myrobalanorum:

ad bilem, Citrina;

ad melancholiam

Inda; ad phlegma

Cepula & Empe-

litica. Quintum ge-

nus Belezicorum ad

densanda tantum

coria usurpari ait

Garcias ab Horto.

Velat tamen omitti

sincera sedulitas in

Compositionibus in

quibus prescribun-

tur.

Colocynthis.

Lauri

Myrti

Bacce

Iuniperi, in

vino rubro

generoso

preparata.

Grana Kermes.

Rorū-

dum.

Piper

Lon-

gum.

succo inspissati.

Absinthii latifolii

Græco-

rū, seu

Agri-

moniæ.

Eupatorii

Mesuæ,

seu A-

gerati.

Auicē-

næ, seu

Canna-

binæ.

Glycyrrhizæ.

Chelidonii maioris.

Ex foliis, caule, radi-

ce, exprimatur suc-

cus ineunte astate: in

areo vase cum melle

prunis decoquatur.

Seruetur ad ocula-

ria remedia.

Cremor Tartari.

Sapa.

Ladanum.

Asa fœtida.

Opium.

Aloë.

Manna Arabum, siue

Mel aërium.

Scam-

Scammonium.

Mel.

Saccharum

Cera.

SVCCI LIQVIDI,

superfuso Oleo.

Lupulorum

Rosarum

Cydoniorum

Berberis

Ribes.

Cichorii.

Citri, seu Limonum.

VINA.

Absinthites.

Euphrasiatum.

Passulatum.

GYMMI ET RESINÆ.

Tragacanthum.

Arabicum.

Caphura.

Sandaracha Arabum.

Bdellium.

Galbanum.

Myrrha.

Mastiche.

Tus.

Styrax { Solida.
Liquida.

Benzoinum.

Ammoniacum.

Terebinthina.

Euphorbium.

Sagapenum.

Opopanax

Pix.

ANIMALIA,

& eorum partes &c
excrementa.

Cantharides.

Pulmo Vulpis.

Hepar lupinum.

Adeps { Gallinæ.

Anseris.

Anatis.

Castorium.

Dens apri.

Vnicornu.

Ebur.

Cetui { Genitale.

Cornu.

Sebum.

Medulla.

Ossordis { Bovis.

Cervi.

Cra-

Cranium hominis
non sepulti.

Hirci { Sanguis.
Sebum.

Sericum { Crudum.
Intinctū

iucco Ker-

mes. Sericū in quibus conficiendis

vulgatū Cra-

mesū ve-

nenatū est,

& Arsenico

infectum.

Leporis { Coagulū.
Pili even-
tre.

Vngula { Alcis.
Asini.

Moschus.

Zibettum.

*Reliqua sedulā diligē-
tiā comparabunt Phar-
macopœi in dispēstatione
singularū Cōpositionū:
ad vocabunt Medicos.*

*Qua verò recentia, at-
que (ut vocant) viri-
dia colliguntur, ut re-
frigerantia atque hu-
medantia ferè omnia,
ea ex tēpore, pro usu ac
necessitate parabuntur.*

COMPOSITA.

Decocta, quæ vulgo à Medicis
nomine tenus indicantur.

Decoctio Clysteris carminativa.

R. Seminum Anisi Fœniculi

Cumini ana ʒ β.

Baccarum Lauri contusarum ʒ iij.

Florum Chamæmeli & Anethi ana m. β.

Coque in aquâ communi ad dimidias.

Deco-

*Decoction communis Clysterum
remollientium.*

℞ Maluæ Violariæ Parietariæ
Betæ Mercurialis ana manip. j.
Foliorum Liliorum alborum m. β.
Seminis Fœniculi ℥ β.
Coque in aqua sufficiente.

Decoction pectorale simplex.

℞. Hordei mundati ℥ j.
Capilli Veneris Scabiosæ Tussilaginis
ana m. j.
Hyssopi m. β.
Passularum mundatarum ℥ vj.
Sebesten, Iuiubarum ana num. xv.
Dactylorum num. vj.
Caricarum pinguium num. iiij.
Glycyrrhizæ ℥ β.
Fiat decoction ex arte in ℥. iiij. Aquæ flu-
uiæ, ad consumptionem libræ vnus.

*Decoction pectorale compositum,
cum Sena.*

℞. Foliorum Senæ mundatæ ℥ ij. β.
Parum bulliant in Decoctione superioris
colati libræ vna & dimidia. Infundantur
sex horas : postea exprimantur leuiter.

Deco-

*Decoctum commune medicine,
cum & sine Sena.*

2. Radicum Polypodii quercini ʒ ʒ.
 affularum mundatarum ʒ ij.
 bebesten Prunorum ana num. xij.
 lorum Boraginis Violarum Rosarum ru-
 brarum ana ʒ ij.

Fiat decoctio secundum artem.

Vt fiat compositum,

1. Foliorum Senæ mundatorum ʒ ij ʒ.
 Parum bulliant in decocti superioris
 lib. j. ʒ. addita Caryophyllorum ʒ j. In-
 undantur sex horas : postea leuiter expri-
 mantur.

Uac Virgineum, ut est apud Weckerum.

1. Aluminis crudi ʒ iiij.

quæ fluuiæ lib. ij.

Decoquantur ad tertias. Postea

Lithargyri lib. ʒ.

ceti optimi lib. j. ʒ.

Coquantur, donec remaneat libra vna.
 mbæ aquæ colatæ misceantur, & agi-
 ntur, donec lactis colorem adipiscantur.

*Potio vulneraria, sive Decoctum
Sclopetarium, ut vulgo paratur.*

1. Cancrorum fluuiatilium vstorum, &
 subti-

subtilissimè puluerisatorum 3 ij.
 Radicum Aristolochiæ rotundæ, & Conf
 dæ maioris

Foliorum Prunellæ

Baccarum Lauri ana 3 j.

Contundantur crasso modo : includan
 tur linteo raro, & bulliant in Vini albi li
 bris tribus, donec tertia pars consump
 sit : addendo circa medium decoction
 Vincæ Peruinæ pugillum vnum.

Fiat colatura.

ALIA COMPOSITA.

Saccharum Rosatum tabulatum.

Saccarum Penidiatum, ex aqua Horde

*Baccilli Bechici, vulgo
 Rebecha dicti.*

℞. Pulueris Diaireos, Diatragacanthi fr
 gidi ana 3 ij.

Pulueris Glycyrrhizæ 3 β.

Sacchari canditi 3 iij.

Sacchari Tabarzeth, hoc est albissimi
 lib. j. β.

Cum Gummi Tragacanthi aqua Rosa
 rum soluto fiat pasta, ex quâ parentur Bac
 culi, ad vsum reponendi.

Me

LIBELLVS MEDICAMENT.

625

Rosatum.
Violatum.
Anthosatum.
Mercuriale, ex succo non decocto pa-
ratum: quod quidam pessimè faciūt.

CONSERVÆ.

Rosarum { Liquida
Solida
Violearum.
Lymphææ
Nictchorii.
Moraginis.
Anthos.
Radicum { Inula.
Symphyti.
Eryngii
Arculorum tenerorum Absinthii latifo-
lii excorticatorum.
Iacynorrhodon cū pauco Saccharo paratū
7 doniatum.
Morticum { Arantiorum.
Citriorum.
Muctum { Cerasorum, Berberis, Ribes.
Omphacii, Cornorum,
Mororum semimaturorum

SYRVI.

Rosarū pallidarū, nouem { Simplex &
ad minimum infusionum { Cōpositus cū
Agarico.
Dd Rosa

Rosarum rubrarum siccarum, ex libra vn
Rosarum, horis viginti quatuor infu
sarum in aqua repida lib. iiij: & expre
sione cocta cū Sacchari albissimi lib. ij

Violarum { Violarum,
Laxatiuus, ex nouem infu
sionibus.

Floribus arborum Persicarum.

De Symphyto.

Florum Nymphææ simplex, ex duabus in
fusionibus, apud Ioubertum.

Cydoniorum { Cum Saccharo.
Sine Saccharo excoctus.

Malorum granatorum *acido-dulcium*: v
ex aqua partibus acidorum & dulcium.

Berberis.

Aciditatis Citri.

Syrupus è Corticibus Mali Citrii.

℞. Corticum Malorum Citriorum re
centium, in aqua maceratorum & præ
paratorum lib. j.

Coquantur in aqua lib. vj, donec lib. ij
superfint: & cum lib. iiij. Sacchari albi
fiat Syrupus.

Condiatur pars vna Syrupi Moschi gra
nis duobus, Ambra griseæ grano vno.

De Pomis Simplex, & Compositus, Sa
boris Regis. Isque duplex: scilicet cum
simplici Senna, & cum triplicata Senna.

Iu-

uiubinus.

De Tussilagine

De Glycyrrhiza. *Sed pro aqua Rosarum accipe aquam infusionis Rosarum pallidarum, ex Fratrū Minorum consilio.*

Adiantinus { Communis.
Monspessulensis, prout haberi poterit.

De Althæa.

Syrupus de Stœchade, descriptionis Fernelii.

Florum Stœchados ℥ iiij.
Chymi Calaminthes Origani an. ℥ j. β.
Aluix Betonicæ Florum Rorismarini
ana ℥ β.

em. Rutæ Præniæ Fœniculi ana ℥ iij.
Coquantur in aquæ libris decem ad dididias. In colatura adde Sacchari & Mellis ana lib. ij. Fiat Syrupus, aromatizatus cinnamomi, Zingiberis & Calami aromatici ana ℥ ij. raro linteo ligatis, & in syrupo appensis.

De Absinthio, Mesuæ. *Ex Absinthio nostrate latifolio, prius seorsim in aqua tepida macerato.*

De Artemisia. *In quo cur pro Buglossa necessario substituendum sit Albugilissa, ut voluit Iouberius, non video: cum Buglossum verum, quæ nostræ Borago est, vel solo flore*

De 2 men

menses potenter moueat, & succo etiam
cundinas deiciat. Attamen Anchusæ pri-
radix (que Arabum Albugilissa est) apud
Dioscoridem vulua indita etiam fœ-
mortuos extrahere dicitur. Ita ut parum
ferat, utram ponas, Anchusam aut Bo-
ginem. Verum correctior multo est & meli-
descriptio Syrupi de Artemisia apud Fer-
nelium: eamque sequendam puto.

Syrupus de Artemisia, Fernelii.

℞. Artemisiæ manipulos ij.
Rad. Helenii Rubiæ Præoniæ
Leuistici Fœniculi ana ʒ ʒ.
Pulegii Origani Calaminthes
Nepitæ Melissophylli Sabinæ
Sampsuchi Hyssopi Prassii
Chamædryos Chamæpityos
Hyperici Parthenii Betonicæ an
manip. j.

Seminis Anisi Petroselini Fœnicu-
Ocimi Dauci Rutæ Nigellæ ana ʒ ii
Contusa macerentur horis viginti quatuor
in Hydromelitis libris octo.

Coquantur ad lib. v. & cum Saccharo
℔. v. percoquantur in Syrupum, conditum
Cinnamomi vnciâ vnâ, Spicæ drach-
mis tribus.

*De Mentha simplex, cum Saccharo pa-
ratum.*

De Ci

De Cichorio } Simplex, ex succo Cichorii,
 & Sacchari dimidio.
 Compositus, Nicolai Flo-
 rentini, (non Prepositi, qui
 Rheum octuplum ponit.)

Ex capitibus vtriusque Papaueris.
 Papaueris Rhœadis.

Diamoron Mesuæ.

Oxyfaccharum simplex.

Oxymel simplex dilutum.

Oxymel Scilliticum merum, & sine aqua,
 aut saltem

acetum Scilliticum, ex quo in rem presen-
 tem posses Oxymel parari.

Syrupus Diacheloncon, seu de Te- studinibus.

1. Carnis Testudinum \mathfrak{z} iiij.
 Hordei mundati \mathfrak{z} ij.
 Carnis Dactylorum \mathfrak{z} j.
 Ascularum Damascenarum
 Glycyrrhizæ rasæ ana \mathfrak{z} vj.
 Cebesten Iuiubas ana num. xij.
 Seminis Bombacis Melonum
 Cucumeris Citrulli ana \mathfrak{z} β .
 Sem. Lactuæ Papaueris albi ana \mathfrak{z} ij.
 Lingulæ caballinæ Pulmonariæ an. man. j.
 Florum Violarum Nenupharis an. \mathfrak{z} β .
 Fiat decoctio, vt decet.
 Colatura clarificata, ad lib. iiij. adde
 Dd 3 Sac-

Sacchari albissimi lib. ij. Sacchari Rosati & Diatragacanthi frigidi ana ʒ
Fiat Syrupus perfectè coctus.

Testudinum caro (amputatis collo, caudis & pedibus) à sordibus repurgetur: inde datur in frusta; simul cum reliquis coquantur. Deinde colaturæ adde Saccharum Rosatum, & Diatragacanthum. Loco Diatragacanthi quidam subiiciunt Saccharum Penidiatum. Vtrumque non malè.

PVLVERES.

Lumbricorum.

Diamargaritum frigidum	} Cum Amb & Moscho
apud Siluium	
	} Sine Amb & Moscho

Triasantali Nicolai.

Diarrhodon Abbatis, apud Nicolaum.

Aromaticum Rosatum Gabrielis, apud Mesuem.

Diambra.

Diatragacanthum frigidum Nicolai.

Diairis simplex Mesuæ

Diacarthami Arnaldi de Villa noua apud Siluium.

ELECTVARIA

PVRGANTIA MOLLIA.

Diacassia Nicolai Præpositi, *additis aquis
partibus Cassia & Mellis, ac non delectâ
Cassia.*

Catholicum { Expulueribus
Ex infusione puluerum,
Senna & Rheo duplicatis
sic parandum, vt sequitur.

*Catholicum ex infusione puluerum,
Sena & Rheo.*

℞. Rad. Polypodii semisiccati
Foliorum Senæ mundatorum ana ℥ vj.
Violarum ℥ iiij.
Sem. Anisi & Fœniculi dulcis ana ℥ ij.
Glycyrrhizæ rasæ
Quatuor Sem. frigidorum maiorum mun-
datorum ana ℥ j.

Contusa omnia (exceptis Senâ, Semi-
nibus frigidis maioribus, & Floribus Vio-
larum) macerentur horis xxiiij in aquæ
fluuię quantitate sufficiente (vel lb. v) po-
stea coquantur leuiter in balneo Mariæ.
Paulo antequam ab igne remoucantur, ad-
de Senam, Semina frigida maiora, & Vio-
larum

D d 3

Iarum Flores. Macerentur calidè aliquot
 horas in balneo. Vbi refrixerint, linte-
 o colentur, & exprimantur leuiter. Col-
 turę pars vna seruetur pro infusione Rhei
 barbari: Altera iterum coquatur, donec
 in consistentiam Mellis crassescat: adiecit
 Sacchari albi lib. viij. & addendo in finem
 decoctionis infusionem vnciarum vi
 Rhei electi, seorsim factam in parte re-
 seruata decoctionis Polypodii. Iterum
 coquatur, sed lento igne.

Postea ab igne remotis adde Florum
 Cassiæ (extractæ ad vaporem decoctionis
 præscripti) & Tamarindorum an. ʒ vi
 Sacchari Candi, & Penidiorum ana ʒ ʒ.
 Fiat Electuarium.

Tryphera Persica Mesuæ, *ex correctione Fra-*
trum Minorum, apud Ioubertum.

Diaprunis ʒ Simplex.

Nicolai. ʒ Solutius. Et quia breui acci-
 scit, quo tempore Pruna recentia desunt, pare-
 tur ex Pulpa decoctionis Prunorum, potiùs
 quàm ut acidum in usum recipiatur.

Confectio Hamech maior, apud Me-
 suem. Huic cur minorem, minùs efficacem,
 præferat Ioubertus, non video. Ingrata est: seu
 non detur delicatis. Neque reprobandum patet
 Serum lactis, quòd longis infusionibus acescat
 (parcaut mihi docti viri.) Nam Serum non
 idèò reiiculum, quòd acidum. Tale enim & te-
 nuia.

uius est, & magis refrigerat; ideoque magis
domat acrium acrimoniam, & felicius eorum
que infunduntur vires elicit. Denique cur in hac
Compositione improbabitur Serum acidum,
cum in Tryphera Persica & Diaphœnico fera-
tur Acetum? Verumtamen, si displicet quodd
in hac Compositione multa sine arte & confusè
traduntur. Nam cur Rhabarbarum coquitur?
(coquitur quidem Mesue; sed recens, puta,
compactum ac validum: at nostrum inuetera-
tum, laxum, propterea que euandidum, constat
coctione vim catharticam amittere: Annon
Cassia & Manna cum Tamarindis cocta cor-
rumpuntur? Annon Dacrydii vires coctione ex-
soluuntur? praterquam quodd sic aliis non fa-
cile Dacrydium commiscetur, ita ut in omnibus
Compositionis partibus par facultas non repe-
riatur?) si cui, inquam, hac displicent, pre-
feratur ea, qua ex Fernellii censura & artificio-
sor & efficacior est; cuius descriptio sequitur.

*Confectio Hamech, ex censura
Fernellii.*

℞. Corticum Myrobalanorum citrina-
rum ʒ ij.
Myrobal. Cepularum Myrob. Indarum
Violarum Colocynthidis
Polypodii querni ana ʒ j. β.
Absinthii Thymi ana ʒ β.
Semen Anisi Fœniculi
D d s Rosa-

Rosarum rubrarum ana ʒ iiij.

Tusa omnia macerentur per diem
lib. ij Seri lactis : deinde coquantur
libram vnam. Fricentur manibus, & ex-
primantur.

Colaturæ adde

Succi Fumariæ Pulpe Prunorum, &
Vuarum Passarum ana lib. β.

Sacchari albi Mellis despumati an. lb.

Coquantur ad consistentiam Mellis : i.

Ispergendo sub finem

Agarici & Senæ pulueratorum ana ʒ

Rhabarbari triti ʒ j. β. Epithymi ʒ

Dacrydii ʒ vj.

Cinnamomi ʒ β. Zingiberis ʒ ij.

Sem. Fumariæ Anisi Spicæ Nardi an. ʒ

Fiat Electuarium.

Benedicta laxatiua Nicolai Alexandrini.

Hiera picra simplex, mellita, Galeni.

Hiera diacolocynthidos Pactii, ex Scrib-
nio Largo, bono medico, in vsum reuocata

Hiera Lagodii, Nicolai Myrepsi.

Caryocostinum Garyopōti, apud Iouberium
capite de Benedicta.

Hydragogum Fernellii { Maius.
Minus.

*Nullum vulgò extat Hydragogum in Officini
Idè duo hæc hîc addēda existimaui. Minus mi-
tius est, ita ut grauidis etiam dari possit: Maius
validius, & non nisi paulo robustioribus idoneum
Hydra-*

Hydragogum minus, Fernelii.

℞. Succī Rosarum pallidarum ℥β β.
 Sacchari albi Mellis optimi ana ℥ xv.
 Coquantur dum exspumaucrint & crasse-
 scant. Tum adde
 Succī radicum Ebuli lib. j.
 Prassii sicci Sem. Fœniculi tritorum
 ana ℥ ij.
 Acinorum Ebuli & Sambuci ana ℥ ij.
 Cinnamomi ℥ vj.
 Macis Galangæ ana ℥ iij.
 Coquantur igne lento, in Mellis cras-
 sificem.

Hydragogum maius Fernelii.

℞. Serī lactis lib. vij.
 Sacchari albi Carnis Cydoniorum ex
 aceto coctorum ana ℥ x.
 Mannę Calabrinę ℥ v.
 Coquantur igne lento, ad Mellis confi-
 stentiam. Sub finem adde
 Foliorum Laureolę preparatę ex Oleo
 Amygdalarum dulcium & Aceto ℥ ij.
Preparatio Laureolę sic faciendā : Folia
 Laureolę macerentur horis xxiiij in Ace-
 to & Succo Portulacę, vel Mali Granati;
 modicę coquantur: exprimantur, siccen-
 tur, terantur. Deinde affunde Aquę Ro-
 D d 6 sarum

farum lib.ß. Olei Amygdalarū dulciū ʒj.

Bulliant rursus ad consumptionem aqua

Pulvis cum superstitute Oleo addatur i
Compositionem.

ELECTVARIA

PVRGANTIA, SOLIDA.

Diacarthami Arnaldi de Villa Noua
apud Siluium. *Hoc Electuario nullum in usu
frequentius; nullius descriptio in Dispensariū
minùs constans.*

De Succo Rosarum Nicolai Præpositi.
*cum suo Scammonio toto, contra sententiam
Siluii; ut verè sit Calcar medicinarum.*

De Citro solutium Guidonis, apud Iouber-
um. *Nam in aliis ferè Sena omittitur.*

ELECTVARIA

VOMITORIA.

Electuaria vom- { Mitius.
itoria. { Validius.

*Nulla extant in Officinis & Dispensatoriis
vulgaribus vomitoria composita. Ideò & hac
hic addere, optimum putauit. Scio parari posse
in rem præsentem, sed qua careant beneficio fer-
mentationis.*

Mitius, Diasarou dictum Fernelio, sic
paratur.

Dia-

Diasaron, Fernelii, vomituum mitius.

℞. Symplicum Menthae & Violarum
ana ℥ viij.

Coquantur ad consistentiam Mellis. Su-
finem, subducto igne, insperge

Rad. Peponis arefactæ

Sem. Raphani & Vrticæ, maceratorum in
aqua Rosarum, arefactorum & trito-
rum ana ℥ j.

Radicis Asari tritæ & cretæ ℥ ij.

Cinnamomi Sem. Fœniculi ana ℥ iij.

Fiat Electuarium.

Validius, imò validissimum Dielleborou,
in morbis contumacibus, robustis corporibus,
in thoracis ampli, faciliè vomentibus, atque cor-
ore ritè preparato usurpandum.

*Dielleborou, Fernelii, vomituum
validum.*

℞. Caryophyllorum ℥ ij.

Fibrarum Ellebori albi siccarum & incisa-
rum lib. j.

Aquæ lib. xiiij.

iat infusio per tres dies. Hinc fiat deco-
ctio ad consumptionem mediæ partis:
& facta diligenti expressione, abijcia-
tur Elleborum. Tum adde

Mellis ℞. viij.

D d 7 Syru-

Syrupi de Nymphæa lib. j.

Succi Raphani ℥ iij.

Repetatur coctio, donec reducatur
consistentiam Mellis.

Electuarium vitreo vase excipiat ;
seruetur ad vsus.

ELECTVARIA

ALTERANTIA.

Electuarium contra vermes.

R. Farinæ Lupinorum ℥ ij.

Corallinæ Dictamni albi ana ℥ j.

Cornu Cerui, Sem. Caulium ana ℥ j

Rhabarbari ℥ β.

Fiat pulvis, diuidendus in duas partes.

Utraque pars coquatur seorsim, cū Sacchari

ri in aqua Graminis dissoluti ℥ iij. Se

uni parti adde Dacrydii ℥ ij. Trochiscorum

Alhandal gr. vj.

Diacodium solidum.

R. Capirum Papaueris albi cum suis se

minibus, quantum voles : Coque: for

titer exprime. Decocti expressi libr

vna coquatur cum altera libra Sacchari

ad consistentiam Confectionis Manu

Christi, rudiculâ aliquamdiu agitando.

Serue

Seruetur ad distillationes ferinas.

Potest parari candidius & suauius ex solo semine, sed minus efficax.

Philonium Persicum Mesuæ.

Philonium Romanum Nicolai.

De Baccis Lauri Rafis.

Diasatyrium. (Nam & huius vsus sapiusculè necessarius est.) Ex tribus autem eius descriptionibus, sequens præfertur Fernelio.

Diasatyrium, Fernelii.

℞. Radicis Satyrii, recentis ac solidæ

Radicis Pastinacæ satiuæ Rad. Eryngii

Nucis Indicæ Strobilorum

Pistaciorum ana ʒ j. β.

Caryophyllorum Zingiberis Anisi

Sem. Erucae Sem. Fraxini ana ʒ vj.

Cinnamomi Caudarum Scincorum

Seminis Bulbi ana ʒ ij. β.

Moschi gr. vj.

Mellis optimi despumati ℞. iij.

Radices rusæ coquantur ex melle, & subigantur: Deinde Nux Indica, Strobili & Pistaciæ rusæ similiter adiiciantur. Postremo etiam reliqua exquisitè trita.

Theriaca trium ætatum.

Mithridatium Damocratis.

Alkermes Mesuæ, ex infusione Serici crudi, & Syrupo Kermesino, cum Ambra tota. No-
cum illis erres, qui falsis ducti rationibus, di-
midiatam

mediatam tantum ponunt, & Compositione reddunt minus efficacem; & , ut ita dicam, minus spirituales. Calor Ambra, inquit, in regionibus Septentrionalibus & frigidioribus metuendus est, quia in his interna magis caleat. Ridiculè. Certè interna magis calent, sed calidius innato, hoc est, temperato & humido; non acri & sicco. Quod si hac Ambra quantitas in regionibus Meridionalibus, ubi calor & acrius & siccior est, calore non nocuit, multo minus nostris, ubi mitior calor est, & humido temperatior, ac quantitate tantum excedens; non qualitate. Ni hac vera sint, astate quam hyeme calida convenientiora; & malè Hippocratis libro De dietis idiorum dixerit, Hyeme parcius & meracius bibendum; astate largius, sed dilutius. Eadem enim ratio regionum, qua temporum.

De Hyacintho, descriptione Iouberti
que hæc est.

*Electuarium de Hyacintho, Iouberti,
ad obstructions hepatis & lienis.*

R. Limaturæ Chalybis vstæ in crucibulo donec rubeat, & diligenter in mortario trita, sine extinctione, ℥ iiij.

Diarrhodon Abbatis

Aromatici Rosati ana ℥ j.

Thymi Epithymi Cinnamomi ana ℥ ss.

Ex vna parte, additis pulueris Hierapicræ ℥ vj. cū Syrupo de Artemisia fiat massa.
Pila.

Pilularum: ex altera, cum octuplo Saccharo fiant tabellæ ponderis drachmarum duarum aut trium. Saccharum coquatur cum parciſſima aqua. Vbi optimè deſpumatum fuerit, pulueres indantur, & continuè agitentur, ne Chalybs inimica reſideat. Mediocriter cocta, & paulo minùs quàm Saccharum Roſatum, deſundantur ſupra marmor aut chartam; manibus ſubigantur, aut ſpathula agitentur; & formentur tabellæ; ne, ſi immotæ reſixerint, cauè reperiantur.

Reſtat Eleſtuarium vnum, Reſumptiuum liſum, ad reſtaurationem virium, in iis qui diuturno morbo conſtabnero. Sic antea deſcriptum à Fernelio.

Eleſtuarium Reſumptiuum, Fernelii.

℞. Roſarum rubrarum
Glycyrrhiæ ana ʒ ij. gr. v.
Gummi Arabici
Fragacanthi ana ʒ ij. ʒ ij.
Santali rubri & albi ana ʒ iiij.
Succi Glycyrrhiæ Amyli
Seminis Papaueris albi
Portulacæ Lactucæ Scariolæ ana ʒ iiij.
Quatuor ſeminum frigidorum maiorum
Sem. Cydoniorum Maluæ Bombacis
Violarum Strobilorum.
Piſtaciolorum recentium

Amygda.

Amygdalarum dulcium

Pulpæ Sebestæn ana ʒ ij.

Caryophyllorum Spodii

Cinnamomi ana ʒ j.

Croci gr. v.

Penidiorum ʒ β.

Terantur: excipiantur triplo Syrupo Vi-
laceo. Fiat Electuarium molle.

TROCHISCI.

De Agarico.

Alhandaal, siue de Colocynthide.

De Karabe.

De Myrrha Nicolai.

Albi Rafis { cum Opio
 { sine Opio.

Gordonis apud Bauderonem.

Trochisci Andronis.

℞. Cytinorum ʒ x.

Gallarum ʒ j.

Myrrhæ Aristolochiæ rotundæ ana ʒ j.

Chalcanthi Aluminis scissilis

Misyos Cyprii ana ʒ ii.

Excipiantur passo. *Antiballomenon, si
Succedaneum Mysios sit Vitriolum vinctum
ustum.*

P I L V

PILVLÆ.

*Ilicæ Rasis, nono ad Almanforem,
capite de Colico dolore.*

℞. Colocynthis & Sagapeni ana ʒ x.
Scammonia ʒ iij. (*aliis ʒ iij. & tertiam, ut
sint ʒ iij. ʒ j. Sed certè delendum est [&
tertiam,] & Arculanus Rasis Commenta-
tor non agnoscit.*)

Forma Pilulas.

Sagapenum vino dissoluendum, colan-
dum; & eo reliqua excipienda. Eorum usus
nonnunquam necessarius in colica biliosa, Picta-
uiensi dicta, ubi alius leuioribus Catharticis
surda non respondet, & vi paulo validiore
metastasis in brachia per aluum reuocanda.

Indæ Haly, apud Mesuem. In quibus Lapis
Lazuli diligenter lauetur, sed non uratur.

Ex Pulvere Hieræ Pachii, incorporato cum
Syrupo Rosato solutiuo.

Auræ Nicolai, non diminuto Scammonio.

Cocciæ Rasis, cum suo Scammonio toto: quæ
prima descriptio est apud Siluium, contra
sententiam Iouerti: ut habeas quas des ro-
bustioribus, & minore quantitate.

De Agarico, Mesuæ.

Lucis maiores, Mesuæ.

Fœtidæ maiores, Mesuæ.

De Her-

De Hermodactylis maiores, Mesue.

De Thymelæa, Mesue, *vel potius* De Esula Fernelii; *quarum descriptio sequitur.*

Pilule de Esula, Fernelii.

℞. Corticum Radicum Esulæ minoris, maceratae horis vigintiquatuor in Aceto Succo Portulacæ, ʒ ij.

Grana Ricini expurgata & torrefacta num. xl.

Myrobalanorum citrinorum ʒ j. β.

Chamædryos Chamæpityos

Spicæ Nardi Cinnamomi ana ʒ ij.

Omnia tenuissimè trita excipiantur vinctiva Tragacanthi Aqua Rosarum soluta & fiat massa. Esula menses octo antè collecta, non recens.

Valdè turbant: sed sunt efficaces in corporibus robustis. Minus exsiccabuntur, sed minus efficaces erunt, si excipiantur Symploce Rosarum solutiva, non mucagine Tragacanthi.

Aggregatiuæ Mesue; in quibus par quantitas Scammonii, Turbith, & Aloës, scilicet ana ʒ vj.

De Hiera, cum Agarico.

Ruffi, seu communes, Melle Rosato comprehensa.

Pilule Scaligeri.

℞. Aloës (bis Succo Endiuie, & bis Succo Rosæ

Rosarum lotæ, & iterum bis imbutæ
 expressione drachmarum sex Rhei electi
 infusi in Aqua Endiuia, cum tertia par-
 te Vini albi, & \mathfrak{z} β . Spicæ Nardi \mathfrak{z} ij. β .
 Galangæ \mathfrak{z} ij.
 Succu Absinthii latifolii inspissati, &
 Salis Gemmæ ana \mathfrak{z} β .
 Fiat massa.

Mercuriales (s; quando vsus venerit) paran-
 da in modum sequentem, ut sunt apud Ro-
 mædum.

Pilule Mercuriales.

Hydrargyri in Succo Limonum pri-
 mum extincti, & postea in Succo Saluia
 nutriti \mathfrak{z} vj.
 loës optimæ \mathfrak{z} v. Rhabarbari \mathfrak{z} iiij.
 lacrydii \mathfrak{z} ij. Agarici \mathfrak{z} j.
 tyracis calamitæ Cinnamomi Macis
 intali citrini Salsæ Parillia
 assafras Moschi ana \mathfrak{z} β .
 Mellis in decocto Guaiaci despumati, &
 ad aquæ consumptionem cocti, quod
 sufficit. Fiat massa, digitis pauco
 Oleo Terebinthinæ imbutis tractanda
 aliquamdiu, ac postea vsui reponenda.

Pilule ex Aristolochia, Fernelii.

Radicum Aristolochiæ rotundæ \mathfrak{z} j.
 Radi

Radicum Gentianæ

Myrrhæ electæ ana ʒ iiij.

Aloës Cinnamomi ana ʒ β.

Zingiberis ana ʒ j.

Omnia exquisitissimè trita excipiantur
Oleo Amygdalorum dulcium recenti.

Paranda in rem presentem.

De Cynoglossò, Mesuæ, addendo Syrac
ʒ iiij. Reliqua quæ à quibusdam adiecta fue-
runt, humores attenuant, quos incrassari
consilium est; ideòque omittenda. Nostri
Cynoglossum non est malum veri Cynoglossi
antibalomenon.

AQVÆ DISTILLATÆ.

Tartari	Nymphææ.	Euphrasiæ.
Vitrioli.	Papaveris	Salviæ
Sulphuris.	rubri	Maioranæ
Vitæ.	Graminis,	Melissæ
Scabiosæ.	Solani.	Scordii.
Endiuia	Plantaginis.	Cardui bene-
Acetosæ.	Herniariæ	dicti.
Cichorii.	Buglossi.	Ulmariæ
Violarum.	Boraginis.	Cruciata.
Rosarum.	Tussilaginis.	Aluminosa.
Lactucæ.	Beronicæ.	Cinnamomi
Pimpinellæ.	Abinthii	
Portulacæ.	Fœniculi.	

Aquæ

Aqua Theriacalis optima.

℞. Radicum Gentianæ Enulæ Campanæ
 Tormentillæ Angelicæ
 Imperatoriæ ana ℥ j.
 Hyperici Ircos Florentinæ ana 3 vj.
 Edoariæ

Porticis Citri sicci, & Arantiorum
 Cinnamomi Caryophyllorum
 Seminis Cardui benedicti
 Corymborum Hederæ

Ranorum Iuniperi ana 3 β.
 Nictamni Scordii Melissæ
 Galendulæ ana manip. β.

Macerentur diem integrum super cin-
 eris calidos, in vase oris stricti, optimè ob-
 turati, cum Vini albi lib. vj.

Die sequente adde decoctionis Ulmarie,
 Mentonicæ & Nenupharis libras ij. Deinde
 bulliant parum, lento igne. Postea fiat
 expressio: in qua dissolue & infunde per
 colatrem Theriacæ optimæ ℥ iiij. Ponan-
 tur in alembico vitreo, & fiat distillatio
 balneo Mariæ.

Aqua distillata seruetur.

Facultates omnes recreat: qualitates
 stiles & venenatas domat: synco-
 pia, cordis palpitationi, vertigini, lethar-
 gia, epilepsia, apoplexia, & paralyti suc-
 currit.

Aquæ

Aqua vitæ aurea, magna & verè Empiricæ
compositionis (Thomæ Erasti:) quam nos,
bus non immutatis, in paulo meliorem ordinem
dedimus.

Aqua vitæ aurea, Thomæ Erasti.

Rosarum ʒ j. β.

Caryophyllatæ Baccarum Iuniperi

Florum Lauendulæ ana ʒ j.

Salviæ minoris Origani Bistortæ

Rutæ Radicum Petroseliniana ʒ vj.

Betonicæ Rorismarini Maioranæ

Pulegii Bismalvæ Valerianæ

Pimpinellæ Succisæ Menthe crispæ

(an Mentha hortensis? Certè non errabit qui
eam accipiet)

Menthæ silvestris Verbenæ Keiri

Radicum Leuistici Tormentillæ

Polypodii ana ʒ β.

Absinthii Hyssopi ana ʒ ij.

Magistratiæ (hoc est Mei, seu Imperatricis) ʒ

Contusa omnia crassiusculè, macerentur

in tribus mensuris spiritus Vini (acci-

pe quantitatem sufficientem, ad iam præscriptorum

& sequentium infusionem ritè peragendam) qui

quies distillati in vase bene obturato, per

dies tres. Postea diligenter distillantur.

Aquæ huic distillatæ infunde

Anisi Glycyrrhizæ

Conseruæ Rosarum ana ʒ i β.

Cia

Cinnamomi Caryophyllorum Malo-
rum Cranatorum (*coricis scilicet*)

Zingiberis albi

Nucis Moschatæ Macis

Galangæ Calami aromatici

Zedoariæ Aristolochiæ rotundæ

Mechoacæ Foliorum Lauri

Seminis Coriandri Cardamomi

Nigellæ Romanæ Sacchari Candi

Manus Christi Perlatæ ana $\frac{3}{4}$ β .

Cubebarū Baccarum Lauri excorticatarū

Cumini (*seminis scilicet*)

Rhapontici (*radicis*) Corticis Arantiorū

Theriacæ ana $\frac{3}{4}$ ij.

Granorum Paradisi Rhabarbari

Croci ana $\frac{3}{4}$ j.

Piperis longi Piperis nigri ana $\frac{3}{4}$ β .

Mellis optimi despumati lib. j.

Contusa omnia crassiore modo in vase

stanneo obturato relinquantur per dies

decem. Singulis diebus agitentur bene.

Postea distillantur denuò: & huic aquæ

distillatæ adde

Sacchari albißimi, tenuissimè pulue-
rati $\frac{3}{4}$ j.

Moschi Alexandrini

Ambra griseæ an. $\frac{3}{4}$ j.

Caphuræ $\frac{3}{4}$ β .

Relinquantur ita per triduum aut qua-

riduum. Postea colentur per pannum ra-

rum, & in loco frigido, vase argenteo aut

Ec stanneo

stanneo purissimo (nam vitrea vasa vis aquæ
eximia frangit) vlu reſeruetur.

Mirè confortat partes principes: Præſtantiſſima ad apoplexiam, epilepſiam
conuulſionem. Præſeruat à peſte. Venen
aduerſatur. Syncopæ præſentiſſimum r
medium.

Aqua diuina, ad vlcera; Fernelii.

R. Sublimati optimi (ex Mercurio ſcilicet)
gr. xij.

Aquæ Plantaginis ℥ vj.

Coque ſuper calidos cineres in phia
vitreâ ad dimidias.

O L E A.

Philophorum
Sulphuris
Terebinthiæ
Ceriæ

Tartari
Caryophyllorum
E Nucibus moſchati
Laurinum Meſuæ.

Oleum contra vermes, præſtantiſſimum

R. Myrrhæ electæ ℥ vij.

Mastiſches ℥ ix.

Aloës hepaticæ ℥ xiiij.

Salis communis lb. j.

Contuſa omnia per retortam igne leni
to di-

LIBELLVS MEDICAMENT. 651

to diligentissimè distillentur. Exibit primò Aqua, deinde Oleum admirandum.

Guttulâ arteriæ in carpis manuum, & regio vmblici irrigantur. Etiam præstantissimum Balsamum est ad vulnera recentia. *Manavit hoc Oleum ab Italis.*

E Spica Lauendulæ.

Gagatinum.

Keirinum.

Chamæmelinum.

Anethinum.

Liliorum, simplex.

Perforatæ, compositum.

Abinthii.

Rutaceum, cum Oleo simplici, non omphacino contra sententiam Siluii. sic enim *ἰπὸν ἡ δὲ αὖτε* melius respondebit.

Castorei simplex, Nicolai Præpositi.

Iuinum Mesuæ.

Cumbricorum.

Scorpionum simplex, Mesuæ.

Sapparinum compositum.

Mastichinum Mesuæ, apud Ioubertum.

Myrtillorum

floribus & capitibus vtriusque Papanecris, Oleo infusis.

Violatum.

Rosatum { Simplex
Completum
Omphacinum

E c 2

Om-

Omphacinū artificiale, apud Bauderon
Cydoniorum, Mesuæ.

CERATA & VNGVENTA

Santalinum Mesuæ.

Stomachicum Galeni, apud Ioubertum
cum Opio.

Rosatum {
Mesuæ { sine Opio.

Populeum Nicolai.

De Tutia, pro oculis.

Desiccatiuum rubrum.

Nicolai Præpositi, *duplicato Oleo Rosaceo om-
phacino, & omisso Oleo Violato.*

Resumptiuum primæ descriptionis apu-
Ioubertum.

Comitissæ.

Album, Rasis, sine additamentis.

Diapompholygos, ex Siluii castigatione

Citrinum: vbi pro Amentho reponere La-

pidem Amiantum; pro Gersâ Serpenta-

riâ, Cerussam Serpentariam, seu Amy-

lum Serpentariæ, ex Siluii consilio

Cerussam autem Serpentariam sic parabis

℞. Radices Ari, initio Veris, antequam folia

mittant, collectas, ablutas, & exteriore corti-

ce mandatas. Contunde in mortario lapideo

Succus per expressionem extrahatur: linteo te-

ctus, sole exsicceetur, aquâ Rosaceâ lauatur.

Rur.

Rursus exsicceetur & reponatur. Verum satius est huius Vnguenti puluerem paratum habere, ut possit ex tempore Vnguentum confici in usus necessarios. Immoderatum enim, minus idoneum est.

Aureum Mesuæ.

Nutritum, seu Triapharmacum simplex, Mesuæ.

Basilicum, seu Tetrapharmacum minus, Mesuæ.

Mundificatiuum de Resina, Iouberti.

Martiatum Nicolai, ex censura Iouberti.

De Althæa, Nicolai.

Enulatum { Gum Mercurio.

Sine Mercurio.

Ægyptiacum Mesuæ.

De Arthanita maius Mesuæ, vel potius

De Lathyride, Fernelii, cuius descriptio sequitur.

Vnguentum de Lathyride, Fernelii.

℞. Succī Lathyridis lib. β.

Succī Esulæ ℥ iiij.

In quibus dissolue

Radicum Cyclaminis ℥ ij.

Scammonie ℥ β.

Granorum Ricini & Lathyridis expurgatorum ana ℥ j. β.

Sem. Fœniculi Rutæ & Anethi.

Baccarum Lauri ana ℥ j.

Ec 3

Trita

Trita omnia macerentur in succis di
vnum. Postea Axungia 3 viij Cera 3 i
liquefiant : & in his sensim omnia d
soluantur, & coquantur igne non acri, d
nec totus humor absumptus sit, & omni
in Unguentum coëant.

EMPLASTRA.

De Mastiche, apud Ioubertum.

De Cerussa, ex aqvis partibus Olei Rosacei
Cerussa, prout emendata est à Iouberto.

Contra rupturam, Nicolai.

Album.

Diachylum { Ireatum, ex Oleo Irimo.
Magnum.

Cum Gummis.

De Mucilaginibus, Nicolai Præpositi.

Diapalma Galeni, *agitando cum baculo Quercino recenti, pro Palmeo.*

De Meliloto, Mesuæ.

Oxycroceum, Nicolai.

De Ianua, Nicolai.

Apostolicum, Nicolai.

cum Mercurio.

De Ranis, {
Vigonis { sine Mercurio.

Pro matrice, Nicolai.

*Duo sunt Emplastrorum genera apud Galenum
libro quarto de Compos. medicam. general. quo*

111

nam sapiuscule mentionem facimus Commentario nostro in librum Hippocratis De vulneribus capitis, à paucis annis, magno medicina commodo ab Italis in usum reuocata; Emplastrum Isis, & Emplastrum Barbarum.

Isis Emplastrum vide apud Galenum libro 5. medicamentorum generalium, cap. 2. & 3. & apud eundem, per paucis immutatis, libro 4. secundum locos, ex Asclepiade, ubi dicitur Isis cephalica. Sic autem descriptum est ab Aetio.

Emplastrum, Isis cephalica Galeno dictum, ex descriptione Aetii.

Viride, quod Isis appellatur, à quibusdam Hermoni sacerdoti Isis tribuitur.

R. Ceræ ℥ xij. β.

Terebinthinae ℥ xxv. (al. xij. β.)

Ammoniæ Aëris vsti

Aristolochiæ longæ

Squamæ Aëris vsti Aëuginis

Turis Salis Ammoniæ ana ℥ j.

Myrrhæ Aloës

Galbanæ ana ℥ j. β. [al. ℥ β.]

Aluminis scissilis (vel Aluminis Roche) ℥ vj.

Olei antiqui ℥ x. Aceti quod sufficit.

Emplastrum hoc Polychrestum est, ad omnia vulnera, præcipuè capitis, cum ossium fractura: Item ad puncturas & aculeos infixos extrahendos: Ad hominum

E c 4 & ca-

& canum morsus, item viperæ, ac scorpionis: Ad artuum fracturas cum vulnere, quia citius callum obducit: Ad fistulas recentes & inueteratas: Ad mammarum & axillarum abscessus, tum ne fiant tum ut facti curentur: Ad strumas: Ad stendas oculorum fluxiones, fronti impostum: Ad ecchymoses, gangranas, & putredines carniū arcendas.

Hoc Emplastrum, inquit Aëtius, absolute Isis appellatur (vel Isis Hermonis:) sed aliud est Emplastrum Isis, quod Epigono tribuitur; quod etiam recipit radicis Dracunculi unciam unam. Eoque Galenus se usum dicit; quia sola Dracunculi radix, per se tusa, ac probe trita in puluerem, maligna ulcera curat. Ad ulcera sordida adhibetur Emplastri pars una, Cerati Rosacei liquidi partes due: Ad ulcera verò quæ modicæ extersione opus habent, Emplastri pars una, Cerati Rosati partes tres. Hoc autem Ceratum Rosaceum sic paratur: R. Olei Rosacei ℥ xij. Cera candida ℥ iij. Fiat Ceratum. Ceratum Rosaceum & Emplastrum proportionē dicta liquantur miscentur, rudicula lignea agitantur; sed non diu ne coloris gratia pereat. Loco Cerati Rosacei potest sumi Unguenti Rosati Mesue tantundem.

Ut formetur Emplastrum Isis, Cera, Trebinthina, & Oleum simul liquefiant: dein addantur Galbanum & Ammoniacum, Aceto soluta: atque ad ignem commixtis addantur ceteri pulueres. Vel, metallicæ

tallica cum Aceto in mortario terito; deinde reliqua trita & cribrata adiccito: liquabilia liquata in mortarium affundito, subigito, vnito; & forma magdaleones.

Ne putes (inquit Galenus) Emplastrum variare, pro varia inscriptione, cum scilicet inscribitur Ἰσὶς ἐκ τῶν ἀδύτων, vel ἡ Ἡγεῖρος ἐκ ἐγγεγραμμένων, vel ἡ Ἐπὶ ἱεροῦ. Nam idem est. Certe Epigoni Emplastrum ab Hermonis Emplastro variat sola radice Dracunculi, quam accipit. Itaque male Londinenses eius radice adiectionem tribuunt Fallopio: & male quoque Isim sine Dracunculi radice Isim Epigoni vocant, quum Hermonis sit potius. Addit Galenus, quibusdam putari hoc Emplastrum ex adytis templi Vulcanonis Ægypto dicati desumptum. Disces ab eodem Galeno, Epigonum, cui postrema Isis Emplastri descriptio tribuitur, carcere conclusum, cum hoc Emplastro quendam diuitem curasset, fuisse dimissum.

Aliud etiam est Isis Emplastrum apud Galenum lib. 4. Compositionis medicamentorum per genera, ὑπὸν, hoc est, flauum dictum, cum superius viride dicatur Aetio.

Emplastrum Isis, flauum dictum,
Galeno.

℞. Argenti Spumæ ʒ c.

Minii Synopici ʒ viij.

Diphrygis Cere Chalcitidis combustæ ana ʒ j. (al. ʒ β.)

℞ e ʒ

Chal-

Chalcitidis crudæ 3 ij.

Olei heminas, seu cotylas duas.

Argenti Spuma & Oleum coquuntur donec bis ac tertio efferuescant: postea Aquæ modicum digitis adspargitur: mox Diphryges, Chalcitis tosta, puluerata insperguntur, sub manu aquam instillando donec non ampliùs medicamentum intercoquendum strepat. Vbi constiterit, Ceram indito. Chalcitis cruda, & Minium e Oleo modico conterantur, & sub finem immittantur, continuè mouendo. Tandem in mortarium conuicito, atque subigito. Repone, ac vtere.

Molle conficiendum est, quia indurescit repositum.

Valet ad vlcera diuturna fluentia, maligna, ac vix curabilia, maximè in tibiis & partibus extremis.

Barbara Emplastra dicuntur Galeno, quæcumque Bitumen recipiunt pro basi. Sed inter alia duo potissimùm commemorat, quibus uti solitus erat: Primo quidem ad maxima vulnera; Altero ad minora. Ideò primum Maius dictum, alterum Minus.

*Emplastrum Barbarum Maius,
Galen.*

℞. Picis lib. viij.

Cera

Cere lib. vj. z viij.
 Resinæ Pini lib. v. z iiij.
 Bituminis lb. iiij.
 Olei puri lb. j. z vj.
 Spumæ Argenti Cerussæ
 Æruginis ana z ij. β .
 Turis z vj.
 Aluminis liquidi z j. β .
 Aluminis scissilis z iiij.
 Opopanacis Squamæ Æris
 Galbani ana z j. β .
 Aloës Opii Myrrhæ an. z β .
 Terebinthinæ z xxiiij.
 Succī Mandragoræ z vj.
 Aceti heminas vj. Fiat Ceratum.

Tempus conficiendi Emplastri Barbari Maioris, est cū viget Mandragora; circa mensem Augustum scilicet.

Bitumen pulueratum, & cribro transactum, ponatur super chartam. Postea Tus, Squamma Æris, Aloë, & Myrrha trita per stamen excutiantur, & seorsim seponantur. Squamma autem super mar-more accuratè læuigetur.

Opopanax & Galbanum, Aceto soluta, ita vt parte Aceti combibitâ, lentore suo adhuc cohæreant, per linteum exprimantur.

Alumen tum liquidum tum scissile in puluerem tenuissimum læuigentur.

His ita præparatis, Pix, Cera, Resina
 E e 6 Pini.

Pini ad ignem liquecant; & si quæ sordidæ sunt, per pannum exprimendo colentur.

Oleum cum Cerussa & Lithargyro a consistentiam Vnguenti excoquatur.

Mox indantur Resina, Pix, & Cera, a superigne non acri commisceantur.

Calentibus adhuc, Bitumen iniicito, & spathula diligenter subigito.

Post hæc Terebinthina, cum Lachrymis, non nimis calida addatur.

Tandem Alumen, & post hoc reliqui pulveres inspersi, accuratè commisceantur. Fiant magdaleones.

Ærugo cum Oleo, Lithargyro & Cerussa coquenda est, ut color Emplastri magis gratus sit. Coctione enim Ærugini coloris gratia augetur potius, quàm minuitur.

Valet, ut ait Galenus, ad solidanda vulnera cruenta & recentia: ad vlcera antiqua & sinuosa: ad canum & hominum morsus; & ad podagram incipientem.

*Emplastrum Barbarum Minus,
Galen.*

℞. Picis Resinæ Pini
Resinæ coctæ, Bituminis ana lb. j.
Spumæ Argenti 3 x.
Cerussæ Æruginis, ana 3 vj.
Opopanacis 3 iij.

Olei

LIBELLVS MEDICAMENT. 661

Olei, tempore hyberno, ꝑ ix; æstiuo ꝑ vj.

Liquanda liquefiant: & tritis terendis,
confice in mortario, cum Aceto.

[Eadem præstat quæ Maius, sed non
tam efficaciter.]

Quod si mitius, & magis anodynum
desideras, adde Succi Hyoscyami ꝑ ʒ.
Opii tantundem.

Fiat Ceratum.

*Ceterum Pharmacopæi, ad dispensationem &
confectionem Compositionum tum purgantium,
tum alterantium, itemque Unguentorum & Em-
plastrorum, aliorumque magni nominis medica-
mentorum, quæ in Officinis asservari debent, Me-
dicos advocabunt; ut eos suæ fidei & diligentia te-
stes oculos habeant, & operis directores.*

F I N I S.

INDEX IN VAL. CORIN RECEPTARIUM.

A.			
ABRIETINA re-		Amaracus. 144, 255,	Aromaticum
lina 535		256, 324, 328, 520.	tum Gab.
Abrotonum 173		544.	Aromatum In
Abfinthium Ponticu		Amarena cerasa. 121	rum libellus
146. 305.		Ambra. 277, 278	cix.
Abfinthium Roma-		Ambra pomum.	Arthanita
num. 146		587	Artimonium
Abfinthium rusticum		Amentum dulce. 335	Arum
305		Amomi loco quid 51	Afarum
Acacia 112, 121, 406.		70, 112, 131, 208,	Alpalathi loco
Acaciz succedanea		246, 259.	254, 255, 257
112, 118, 121, 368,		Amomum verum.	Aspalathus
369, 541.		87, 88.	Asphaltum 103.
Aconi. 339		Amomum falsum. 87,	Aspis
Acori loco quid 53,		88, 131, 539.	Asplenium 153.
62.		Amylum. 36.	289.
Acorus. 125, 249, 539.		Anchusa. 206	Aurea Alexand.
Acorus verus quid.		Angelica 64, 125.	Auri & argenti li
68, 112.		Anguria 193, 194	tura
Adiantum nigrum. 191		Animalium partium	Aurum aut arg
Adipum preparatio.		delectus. 405, 406	foliatum meru
366.		Anthera. 272	Aurum coctum
Adulteria simplicium		Antiballomena. 456	
medicamentorum.		Antimonium , pro Ar-	
406, & seqq.		rimon. 93	
Aëromeli. 239.		Anthophylli. 22	B.
Aerugo. 333		Aphace. 516	Bacilli Bechici,
Agaricus Trochiscat-		Apium. 537	go Rebecha.
tus. 267		Apparine. 315	Balanus Myre
Ageratum. 43		Aqua Cinnamomico-	308.
Agresta. 141		tra epilepsiam. 606	Balaustium 91.
Albatecha. 269		Aqua diuina ad vlce-	Balsami fructus
Alexiterium contra		ra, Fernelii. 650	Balsami loco q
pestem. 567		Aqua thesiacalis, op-	84. 263.
Alleluia. 321		tima. 647	Balsamita. 47, 48.
Allium siluestre. 522		Aqua vitæ aurea,	Balsamum quid
Aloë ablundi mo-		Thomæ Erasti. 648	gnificet. 87. 21
odus cum aromati-		Aque marinæ loco	525, 526.
bus. 359		quid. 288	Bardana 3
Aloë preparatio. 359		Archeutida , seu Ar-	Batega 2
Alum , aut Halum. 92		centhis 223, 259.	Bauca 1
Alypias 96.		Aristoloch. rotunda.	Bedeguar. 162. 20
eius loco quid. 95		118, 119. 277.	Behen albi & rub
Alypum. 95		287. 542.	succedanea 51
Alzanahan , alcha-		Aristol. tenuis. 113.	Benedicta laxati
nach, alzanach,		118. 542	208
Ichthyocolla. 349		Aromaticum Garyo-	Bistorta 51
		phyllatum 17	Bitumen Iudaicu
			105. 541.

Blatt

INDEX.

- Matta Byzantia.* 259
 528
Solus Armenia 538
Baraginis succus cla-
rificandus 170.
Borax 335
Branca vesina 95
Brassica siluestr. 95.
Britannica 536.
Buglossa domestica
 210.
Buglossa siluestr. 296
Buglossa vulgaris
 170
Bulbi sem. loco 98
Bunnias 110. 114
Bupthalmum 321
Burungi 83, 84
C
Achrys. 125
Calamintha cap-
peltris 25
Calamintha dome-
stica 150
Calamintha montana
 24
Calamintha sil. 151
Calami aromatici
veri loco quid 54.
 255, 256, 259, 281
Calamus arom. 249
Calamus odoratus
 543
Calamus vnguentar-
ius 259
Camphorata 321
Candelæ pro carun-
culis in meatu
urinario naus. 595
Candelæ pro suffitu
 588.
Capillus Veneris ve-
rus 192
Carabe 278
Cardamomum 20, 21
Carduncellus 320
Carduus benedictus
 320
Carneola, aut Cor-
neola. 55.
Carolina 162
Carota 101
Carpesium 540, 541.
Carpobalsami suc-
cedanea 23, 47, 297
 540
Carpobalsamus 297
 540.
Caryocostinum 602
Caryon myrsicon
 298
Carydion 298
Cassia flos 442
Cassia, vel Cassia. 115.
 281, fistula, 47, 110.
 535, extracta, seu
Flos Cassia. 442.
 extracta communis
 443 extracta sine
 fol. Senæ 189. ex-
 tracta cū fol. Senæ
 190, extracta pro
 clysterib. 190, li-
 gnea 20. 21. 47.
 523. 535.
Catapucia maior 309
Catharticum hydra-
gogum 418.
Catharticum Impe-
riale 221.
Cathengit, seu Ebu-
lus. 341.
Catholicon 198
Catholicum ex infu-
sione puluerum,
Senæ & Rheo 631
Caulis agrestis 95
Cauterium poten-
tiale 599
Celica, Spica. 221
Centaurium maius
 528, 529 tenue
 542
Centumneruia 320
Cera oleum 590
Cerales 517
Ceratum, vide Ce-
rorum.
Cerota vel Cerata
 345
Cerorum infrigi-
dans Gal. 345
Rosaceum. 656.
Santalinum 345
Stomachale 346
Cerorum 22 Betoni-
ca 596
Diachalciteos, vel
Diapalma 596
 pro Herniosis 597
Cerussa serpentaria
 vt fiat 652
Ceterach 153, 192
Chalcanthum 538
Chalcitis 112, 113
 538
Chalcitidis assatio
 538
Chaleu cecaumenis
 356
Chamedrys 53, 54
Chamæmelum 348
Chamæpitys 111
 144, 203
Cherua 309
Cheyri 263, 303.
Cholagogum rosa-
tum clemens 434
Chylisina Pilula-
cum. 603
Cicuta 522
Cinnamom. 523, 536
Cinnamomum cras-
sum 27.
 tenue 27, 28.
Cinnamum 28, 296
Citri semen 526
Collyrium album,
Galenii 586
Colocyntidis præ-
paratio 363
Coma. 25, 110.
 in Compositionibus
 quid obseruan-
 dum 547, 548.
Condita varia 132,
 133.
Confectio cordia-
lis 58
Hamech 447
Hamech ex cusu-
ra Fernelii 633.
Hamech maior 291
 Ha-

I N D E X.		
Nameth minor	203	loco quid 48. 73. 85. 112. 118.
Libetans	57	Daucus Creticus quis 48.
Anacardina	83	Decoctio Clysteris carminatiua 621
Confectiones aromaticæ.	17.	Decoctio communis Clysterum remollientium 612
Opiatæ 70. & seq.		Decoctum commune medicinarum, cum & sine Sena 601. 623.
Conseruatum facidarum ratio	133	Decoctum pectorale simplex 602. 622
Conseruatum variz	133. 134	Decoctum pectorale compositum, cum Sena. 623
Conserua pro Morbida	520.	Decoctum sclopatorium. Vide Potio vulneraria 613
Consolida maior	92	Denarius 220
Conyza	316. 317	Dentalium 335
Corallium rutilum	91	Diacalaminthum Gal. 25. Mesuz 24
Cordumeni, idem quod Cardamum	281	Diacameron 22
Corticuleleus	403	Diacarthamum 213.
Coffus 22. 23. 40. 532. hortensis 326		Diacatholicum 198. 443
Cocula maior	417	Diacasia cum Manana 188
Crassula	320	Diacastorium 93
Cremor Prisanæ	579	Diachalcitis 596
Cremor Tartari	605	Diacinnamomum 27
Crethamus agrestis.	133.	Diacitronium simplex 134 è succo cydoniorum 135
Crinon	296.	Diacitronium compositum. 135
Crispula	321	Diacnicum cum citro 439.
Crithimum spinosum.	69.	Diacodium Agnarii 91. cōp. Mesuz 90
Crocus Cilicius	110	Diacodium simpl. Mesuz 89
Coricius	117	Diacodium solidum 638
Croton	309	Diacorum 67
Cubebæ	258	Diacostum 40
Cuminum præparatum quid	26	Diacuminum 26
Cyanea glycyrrhiza	117.	Diacureuma maior 44.
Cyclamen	341	Diadamasenum 196
Cymbalaris	337	Diagalanga 34
Cyminum Carmicium	232	Diahyssopus 32
Cyperis	51	
Cyperus rotundus & longus	50. 51	
Cyphi trochisci	120	
D.		
Darseni.	27. 28.	
Dauci Cretici		
		Diairis Salom. 36. simplex
		Dialacca maior
		Diamarenatum 182. simpl.
		Diamargaritum lid. 30. frigid.
		Diambra
		Diamoron Valerii Cordi.
		Diamoschum rum. 33. dulce
		Dianisum Mesuz.
		Dianthos
		Diabolibanum
		Diapalma
		Diapapauer 184.
		Diapenidion
		Diaphoenicon. 441.
		in forma soli 206.
		Diaprasium
		Diaprunum com. laxat. comp. non lax. 195.
		Diarhodon abba 41.
		Diasarum Ferne 583
		Diasarou aliud Ferne 63
		Diasatyrium Ferne 63
		Diasatyrium Mesu 99
		Nicolai 9
		Diascordium Fraca 56
		Diascorii 56
		Diascebesten 41
		Diasena 20
		Diasinapi 579
		Diathamarum 2
		Diatrageacanthum ca lid. 3
		frigid. 3
		Diatrion pipereon 5
		Diatrion satalon 41
		Diaturbith cum rha barb. 213
		minus 213

INDEX.

maius 213.
 Diaxyloides 50
 Diazingiber 52
 Didamnus Creticus
 112. 533
 Didamnus vulgaris
 251
 Dielleborn Fernelii
 637.
 Diploma 280
 Dosis Sacchari ad
 conferuas 134
 Dosis Specierum ad
 libram vnam sac-
 chari in confect.
 solidis 17
 Dosis Specierum ad
 libram vnam mel-
 lis 71.
 Drosomeli 239.
 Dulcis radix. 94

E.

Elaterium 235
 Elect. Caryaco-
 rium 602
 contra vermes 638
 De bacis Lauri. 97
 De Hyacintho Iou-
 berti. 640.
 De limatura Cha-
 lybis 568
 aliter 569
 De ouo, Maximil.
 Imp. 567
 De pomo Citrio
 581
 Diafeordium 566
 Diapronias 65
 Ducis 52
 Elefchaf 209
 Episcop. 209
 Lactiz Gal. 59.
 de Gemmis 54
 Indum 442
 Indum maius 199.
 Indum minus 200
 Iustinum 56
 Lactificans Rasis 60.
 Lenticium 191. 446
 Lenticium de Ma-
 382

Opticum 569
 contra Pestem 565.
 Plinifarcoticum 61
 de Psyllio 209
 Purgans, de Po-
 mo Citrio 581.
 Resumptiuum 66
 Resumptiuum Fer-
 nelii 641
 Rosatū Mesuz 211
 de succo Rosarum
 211 in forma so-
 lida 112
 de Scheffe 193.
 Eleliphacon 85. 312
 Ellebori nigri extra-
 ctio. 374.
 Elops 517
 Emplastra 345, 347.
 & seqq.
 Emplastrum ad cal-
 los pedum 608
 ad hydropem. 608
 album coctum 356
 Apostolicum 353
 Apostolicum aliud
 355
 de Bacis Lauri
 358
 Barbarum Maius,
 Galeni. 658
 Barbarum minus,
 Galeni. 660
 Basilicon magnum
 357
 de Cerussa 654
 de Crusta panis
 358
 de Lapide Calami-
 nari. 357
 Diachylon comp.
 347.
 Diachylon ma-
 gnum 348
 Diachylon paruum
 349
 Diachylon simpl.
 346
 Griseum 357
 Isis cephalica, di-
 ctum 655
 Isis flauum dictum

Galeno 637
 de Meliloto 350.
 de Mucilag. 347.
 Oxycroceum 352
 de Ranis 598
 è pelle arietina, ad
 hernias 603
 ad tophos. 598
 Triapharmacū 352
 Viride 357
 Endinia vera 352
 Entalium 134
 Epatis lupini prapa-
 ratio 366
 Epitaphium Valerii
 Cordi 397.
 Fructus semen 83, 84
 Eruum verum quid.
 516

Esbrium 324.
 Effrix Antidotus
 Aduarii 131
 Antidotus Aëtii.
 122.
 Esulæ preparatio 364
 Eupatorii, eiusque
 succi succedaneum
 43. 162.
 Eupatorium 43. 230.
 Extractions purgan-
 tium medicament.
 artificiosæ 373, 374
 & seqq.
 Extractum melana-
 gogum, sangui-
 nem defecās. 436
 F.

Felix 342
 Fistileum seu Phi-
 ricum 101.
 Flores Casie fistulæ
 solutiæ 187. 447
 Florum delectus 402
 Flos tris 125
 Fœniculus portinus
 48. 64.
 Folia Garyophyllo-
 rum. 207
 Folii succedaneum
 17, 18. 50. 61. 66.
 126, 127, 128. 162.
 255.

Fe-

INDEX.		
Folium	18, 19.	Indaica. 320
Indum	112	Sandra Marix 320.
Malobathri	112, 120	326
Forax quomodo fa-		Moschata 321.
cienda	385	Paralyfis 191, 320.
Fraxinella	252	Turcha 320.
Fructus Balsami	116.	Vetri 324
Fructuum delectus		Herbarum delectus
403.		401.
G Alanga magna		Hermela vel Harna-
17. rufa. 17.		la 249.
Galbanum	528	Hiera Pachii 219.
Gallæ cypressi	272.	Aromatica 454.
Gallion, 127. 319,		picra composita
320. 325		216
Gemmæ Populi	307	picra cum Agari-
Gentiadis radix	117.	co 215
Gerfa serpētaria	335	picra simpl. 215
Gerfamsfaciendi mo-		picra Ralis ad pi-
odus	364.	lulas cochias. 231
Glandes siue Suppos.		Hieralogodium 217
224.		Hippocras, seu Potus
Glans vnguentaria.		Hippocraticus. 578
308, 309.		Holippæ purgantes
Gleba Armena	538	582.
Gluten Alchanach,		Hydragogum maius,
alzanahā, alzanach		Fernelii 635.
349.		Hydragogum minus,
Glycyrrhiza	18	Fernelii. 635.
Glycyrrhiza cyanea,		Hydromel simpl. 576
117.		Compositum 576
Glycyrrhizæ succus		Purgans 577
524		Hyoſcyamus Anti-
Gnaphalion	542	dotis additur. 521.
Grana Solis	208, 228	Hypocistis 90, 537
Granum Ben	308, 309	Hystopus humida 342
Gratiola.	43, 230.	I Arus 316
Gummi splendidum.		Iasme 303
117, 118.		Iasmini Ros 303
Arabicum. 112, 118		Indicorum aroma-
vermiculatum 112		rum libellus Gar-
H Alus, aut Halum,		cix 19
siue Alum 92.		Imperatoria 64
Hedychroon magma		Infusio Rosarum 147
520.		Violarum 148
Helenium	296.	Interpretes bonos,
Heparis lupini prx-		etiā rerum peritos
paratio 366		oportet esse, non
Hepatica	192.	solum Latine, aut
Heptaphyllon	530,	Græcè doctos. 542
531.		Iris Illyrica 77, 523
Herba crassula	320	lua 111. 144. 203.
		arthritica
		moschata 2
		Iulep Rosatum 1
		Violatum 1
		Iuncus Arabicus 1
		odoratus. 128. 1
		534.
		Iuniperus magna 2
		L Ac Virginien
		V Veckeri 6
		Laccæ ablutio. 30
		Lachryma Terebi
		chi 1
		Lachrymarum del
		ctus 40
		Lapathiolum 5
		Lapis Armenus 20
		cancrorum 2
		philosophorum
		600.
		Lapis septicus 59
		Lappa maior 33
		Lassulata 320
		Lauendula 31
		Laureola. 317
		cuius preparatio 63
		Laurus & Laurinus
		oleum 525, 51
		Lemnia terra. 538
		Lenitina & Cassia. 44
		Lenitina, & Solutiu
		187
		Lepidium maius 231
		Lepis chalcu 350
		Leucopiper 128
		Libanotidis speciei
		125
		Libanum 351
		Libra medicinalis 17
		Lichen 192
		Ligustrum 302
		Limatura auri, argen
		ti 23.
		Limaturæ ferri prx-
		paratio 361, 362
		Lingua auis 80. 100.
		ceruina 157, 325.
		Lithontribon 62.
		Lohoch 182 & seqq.
		Lohoch ad asthma
		186
		de Caulibus 576
		de Pa-

INDEX.

- de Papauere 184.
de Pino 183.
de pulmone Vul-
pis 186.
sanum & expert.
182.
de Scilla 185.
Luph planum 100.
Luph crispum 100.
M Abathematicum
95.
Macedonicum 54.63.
Macropiper 282.
Magma Hedychroum
117. 520.
Maionana 254. 324.
Malabathrum, vel
Malobathrum 111.
537.
Malobathri folium
115.
succedaneum 111.
117. 256. 257.
Malum terræ 220.
Mameralocoquid 132.
Mandragora 521.
Mandragoræ pom-
orum succi penuria
quid 284.
foliorum locoquid
337.
Manna Orientalis 239.
Manus Christi perla-
ta 38.
Marathrum 325.
Marum 254. 521. 545.
Mari loco quid 254.
256. 320.
Matricaria 324.
Mastiche 21. 535.
Matrella 321.
Medulla Cerasorum
181.
Medulla prunorum
194.
Medulla prunorum
acetos. 104.
Medullarum præpa-
ratio 367.
Mel locoquid 62. 117.
Mel Anacardium 176.
Embligorum 176.
176.
Odoratum aroma-
ticum Dantisca-
num 150. 151.
Rosatum 173.
Rosatum aliud ef-
ficacius. 173.
passularum 176.
Tabarzer. 184.
Melanagogum extra-
ctum 438.
Melanopiper 282.
Mellis Attici loco
quid 124.
Melon Magnus In-
dus 269.
Mentha aquatica 293.
crispa 323.
Græca 326.
Romana 326.
Saracenicæ 320. 326.
Menthastrium. 269.
Meu 64. 86.
Meu loco quid 71.
85. 111.
Meum 48. 64. 86.
Mezeri præparatio.
364.
Michlera 96.
Miliun Solis 208. 228.
Mira solis, aut Mira
Sole. 309.
Mithridates Rex. 514.
Mithridatum 514.
Andromachi 126.
Democriti 119.
ex Cleopatra &
Antipatro 122.
Mina cytoniorum
arom. 172.
Cytoniorum simp.
172.
Morselli laxativi 607.
Moschocaryon 298.
Moschus 18. 20. 121.
Mostarda seu Diastina-
pi 579.
Mucharus 148.
Muria 288.
Musa Enea, sue
Egetea, vel Zaze-
nea. 71.
Muzus Aperti 40. 140.
Myrob. nigri 232. 235.
Myrrha 527.
Troglodytica 110.
Myrtha 325. 328.
Myrtus 292. 328.
N.
Nabuch 178.
Napus 86. 101.
110. 522.
Narcissus 540.
Nardi Indicæ loco
quid 125.
Nardus Celtica 77.
120. 121. 537.
Galatica 115.
Indica 125. 127. 536.
Nardus quid 56. 65.
Nasalia 223.
Nasturtium album.
232.
Nenuphar. 30. 166.
Nepita, vel Nepeta.
531.
Neremisch 61.
Nerion 231.
Nigra spinæ 118.
Nihil album 338.
Notæ ponderum 372.
Nucleus seminum
quid 30.
Nux Indica moscha-
ta 298.
Myristica 53.
Voguentaria 298.
Nymphæa, alba &
lutea. 30. 167.
O.
Oculus 125 eius
nora. 125.
Oculi cæcorum 278.
Ocimum citratum 330.
Oesypus. 347. 349.
Oesypum faciendi
modus 367.
Oleander 131.
Olea 279.
Oleorum natura &
vires 380.
Oleorum distillatio
artificiosa 377. 378.
& seqq.
Oleum Absinthii 305.
Amyg-

Amygd. amar. 308
 Amygd. dulciū 308
 Anchinum 300.
 Balaninum 308
 Balsami 589.
 de Cappare 289.
 Castorei 285
 Cerz 590
 Chamæmelinū 301
 de Chera 309
 Cheyrium 303
 contravermes 588
 aliud. 650
 Costinum 281
 Cytoniorum 291
 de Euphorbio 285.
 Formicarum 287
 Hyoscyami 310
 Hyperici 293
 Jasminum 302, 303
 Irium 294, aliud
 295.
 ex Iuniperi baccis
 280
 ex Iuniperi ligno
 279.
 de Lateribus 289
 Laurinum 311, 525
 Ligustrinum 301.
 Lilinum 301
 Lumbricorum terr.
 288.
 Mandragoræ 283.
 Mastichinum 284.
 Mentha 304.
 Moschelinum 297
 Myrtilorum 303
 Myrtinum 304
 Narcissinum 301
 Nardinum cōp. 281
 Nardinū simp. 280
 Nenupharis albi
 306.
 Citrini 305
 ex Nymphæa ci-
 trina 306
 Nymphæatum al-
 bum 306
 Omphacinum 292.
 Papaveris 310
 de Piperibus 282
 Populinum 307

INDEX.

Populinum aliud. 307
 Ranarum 588
 Rosaceum 305
 Rosatum comple-
 rum & ompha-
 cinum 605, 606
 Rutæ 299
 Sambucinum 302
 Sampsuchinū 292
 Scorpionum comp.
 287
 Scorpionum simp.
 286.
 Sesaminum 311
 Spica 310
 Tartari 290
 Terebinthinæ 290
 contra Vermes 588
 aliud 650
 Violaceum 306
 Vitellorum ouo-
 rum 293
 Vitrioli 381
 Vulpinum 288
 Zanerinum 591
 Olusatrum 25, 54, 56
 63
 Omphacinum Ole-
 um 292
 Omphacium 141
 Onyx 259, 278
Opis 518.
 Opium 521.
 Opium in oleo dis-
 solui nō potest 284
 Opobalsamum succe-
 daneum, Euriitii
 Cordi 312
 Opobalsam. succeda-
 neum 21, 45, 63.
 94, 101, 110, 119.
 254, 324
 Opobalsam. 87, 525
 Orchis 100, 101
 Origanum Creticum
 232 Orientale
 78.
 Origanum Persicum
 78, 232. eius loco
 quid 78, 232

232
 Oxymel comp. 11
 simp.
 Elleboratum
 Scillit. comp.
 Scillit. simpl.
 Oxyfaccchara cōp.
 simpl.

P.

PAEonia
 Palma Christi
 Pancratium
 Panis porcinius 3
 Papauer rubrum
 Paralysis herba
 Parietaria 291.
 Passulæ laxatiuæ
 purgantes cum R.
 barbaro
 Pastilli Scillitici
 Theriaci 101. 5
 517, 518.
 Pastinaca marina
 Pelecini pznuria
 quid
 Pentaphyllon 5
 Perficaria 3
 Periclymenum 3
 Persici flor. & f.
 vapor & destill.
 aqua aluū soluu
 188
 Petroleum claru
 flauum 31.
 nigr. & crassum 3
 Petroselinum 5
 Agreste 4
 Macedonicum 25, 5
 Pharmacopœus qui
 lis esse debeat 10.
 Pharinacorum para-
 tempus 43
 Philonium ex Gal.
 Aegin. 7
 maius, siue Roma-
 num 7
 Mesuz 7
 Persicum 7
 Phisticum 52, 101
 Phu. 86, 117, 321, 144
 Phyllitis 157
 Phyllon. 130

Pilul

INDEX.

- Pulx* 114 & seqq.
de Agarico. 218
aggregatiuz 230
leptanginz. 224
leptag. Val. Cor-
di. 251
de Aloë & Mañi-
che 242
de Aloë lota 243
Arabicx 227
Arthriticx 227
Astheret 226
Aurax. 229.
de Bdellio 250.
Bechicx 250
Benedicx 231.
Cochix Rhafis. 231
de Colocynthide.
 232.
de Cynoglossa 250
de Esula, Fernelii.
 644.
de Eupatorio. 233.
de Euphorbio. 233
Fortidx maiores
 234.
Fortidx Rhafis 234
de Fumo terræ. 235
de Hermodactylis.
 236.
de Hiera comp. 237
de Hiera cum Aga-
rico 238
de Hiera simplex.
 237
Iliacx 524. & 643
Imperiales 240
Indx 239.
de lapide Armenio
 239
de lapide Lazuli.
 238
Lucis maiores 240.
Lucis minores 241
Maffichinx 241
Mercuriales 645
de Mezereo. 239
de Nitro 584
de Odo rebus 248
de Opopanace 247
Pekilentiales 244
de Quinque gen.
Myrob. 248
de Rhabbarbaro 243
Rufi 244
de Serapino 249
de Sarcocolla 244
de Tribus, seu Rufi
 244
ex Aristolochia,
Fernelii 645.
Sanctx, Itolorum
 603
Scaligeri. 644.
Sine quibus 244.
Stomachicx Al-
kindi 245
Stomachicx Mesuz
 246
Pillularum massx ex-
tract. 376
Pimpinella Germa-
nica 210. 325
Pimpinella Italica
 324, 325
Pinguedinum præpa-
ratio 366
Piper album 531. 532
nigrum 25. 109. 521
 532
longum 533
Pistacium 52. 101.
Plantago maior 310
Plumbi præparatio
 361
polium mōtanum 110
polytrichon 320
pompholyx 338
potum Aibre 587
Ponderum ratio 169
Potio vulneraria seu
Decodum Sclope-
tarium 623
Potus Hippocrati-
cus 578
Præparationes quo-
rumdam simpl. 359
 & seqq.
Prasum viride 356
Primula veris 134.
Propolis 354
Prunorum siluest. va-
por & aqua destill.
aluum solunt 282
Prunus siluest. 332.
Pseudodictamnus
 252
Pulsanx cremor 579
Pulegium 513
ceruinum 269
Pulicaria 316, 317
Pulmonis Vulpini
præparatio 366
Pulpa Casix fistulæ
solut. 187, 188, 189
Ceraforum 181
Prunorum 194
Sem. Asparagi &
Rufi 208, 212
Thamarindorū 189
Pulvis ad Epithema-
ta cordis 69
ad Epithemata he-
patis 70
ad Glandes vel
Suppositoria 224
Pulvis aut Tragea
laxat. 222
medicaminis Tur-
bich. 222
Senx præparatx 223
Sernutatorius 223
Pulvis Epilepticus
 570
pro Gutturis vlee-
ribus 571
contra Hydropem,
Erasti 583.
ad partum, Helidei
 570
contra Scabiē 571
contra Vermes 583
Violarum odora-
tus 572
Punicx siluest. flos 92
 132.
Purpureus color, præ-
intensè splendido.
 541. 542.
Q Vid pro quo 456
 & seqq.
R Adicum delectus
 398
Radix concava 278
Ramich 90
Rapx semen 523
 Raved

Rhaed 265.
Raned Seni. 162. 230.
 233. 240. 255.
Rebecha. Vide Bac-
 cilli Bechici. 624
Requies Nicolai 76
Resina Abietina 535
Terebinthina 535
Rhabarbarum 529
Ponticum 528. 529
Rha siue Rheu Pon-
tici panuria quid
 sumi possit 22. 129
 255.
Rhabarb. extra. 375
Rha Ponticum ve-
rum 88. 110. 113.
Rheoponticum 22
 255. 328.
Rhodesiagma 263
Rhusculinarium, ob-
soniorum 92. 130.
Ricinus 309
Rob 179. 180. 181.
Rob de Berberiscop.
 179
 de Berberis simp.
 179.
Cerasorum 181.
Nucum 180
 de Ribes comp. 179
 de Ribes simp. 179
Rosa asinina 61
Rosa Hierichotis 539
Rosata nouella 65
Rosmarinus 125
Rubricæ Lemniæ lo-
co quid 123
Rubus Idæus 181
Ruscus 208.

S.
Sacchari libra in
Scōfectionibus quā-
tum specierum re-
quirat 17
Saccharum Tabarzet
 27. 211.
Sagapenum 97. 112
Sal Hammoniæ 94
Salis Indi loco quid
 236. 239
Saliunca. 23. 77. 85.

I N D E X.

Salpetre 335
Salvia Romana 326
Sampfuchus 254. 281
Sanguisorba. 320
Sanguinis Hircini
 præparatio 366
Santalū Machoziri. 17
Moschatellinum. 29
Sapa. 165. 229.
Sapphirilocoquid. 58
Sapphirus 55.
Sarda, gemma 55
Satyrium. 98. 102. 104
Saxifragia 47. 56. 145
 221. 325. 326.
Scammonæ præpa-
ratio 362.
Scariola 42. 49. 166.
Scatuncellum 337.
Schoenanthum 40. 43
 102. 534.
Schoenon 119. 124.
 256. 258.
Scilla, & Pastilli scil-
litici 515
Scillæmuccilagoquo-
modo colligēda 186
Scillæ præparatio 363
Scincus 98
Scolopendria 157.
 192. 289. 325.
Scolopendrium. 261.
Scordium 109. 523
Scoria ferri 79
Scoriæ ferri præpa-
ratio 361
Secacul 67. 68. 69. 80
Seitaragi Indum 81.
 235.
Selinon 531.
Semen rosarum. 272
Seminū delectus 402
Semperuina minor
 337.
Sericum crudum 34
Seris. 129.
Serpentes 517
Serpentaria. 100. 316
Serpentariæ locoquid
 364
Sesamum. 311
Seseli. 25. 86. 111.

Creticum 48. 62. 6
 86. 117
 tenue 118
Seta cruda 3
Sextarius. 90. 324
 olei. 29
Sicilicus 92. eius no-
 ra 92
Sief album 586
Sigilli Lemni loc-
quid. 102. 111
Sigillum Lemniū 11
Siler montanum 25
 111.
Simpl. absolute scri-
ptum quid deno-
ter 414 & seqq
Simplicium delectu
 398
Simpl. Adulteria 40
Simplicium legen-
dorum tempus 425
Sinapi album 83. 84
Sinnus. 85
Sinon. 87
Sinonum 47. 87. 88
Sirupi. seu Syrupi
 137. & seqq.
 de Absinthio maior
 143
Acetositis Citri.
 139.
Acetositis Limo-
num 140
Acetosus cōp. 138.
Acetosus simp. 138
 de Agresta 141
Althææ Fernelii
 572
Aranciorum aceto-
forum 140
 de Artemisia 144.
 de Artemisia, Fer-
 nelii 628
Augustini Niphi
 574
Byzantinus comp.
 142
 de Byzantiis simp.
 143.
 de Calamintha 150
 de Cichorio cum

Rha-

INDEX.		
Abbarb. 153, 154	simplex 151	Succed. Lobelii 466
de Cichorio Nicol.	de Succo Endiuiz	& seqq.
Florentini 154	comp. 152	Suchaha 162
de Cichorio, Val.	de Succo Fumiter-	Succinum 252, 278
Cordi 177	rx maior 143	Succorum delect. 403
de corticibus mali	de Succo Myrtillor-	Succus Borag. 169.
Citrii. 626	rum 168	& Buglossi. 170
Dinari 142	de Succo Viola-	Eupatorii. 43, 210
de Duabus radici-	rum 159	Scillæ. 349, 348
bis 137	de Testudinibus,	Violarum 159
de Endiuiz cōp. 152	seu Diachelonon	Sumach 92
de Epithymo. 164.	629.	Suppositoria, seu
de Eupatorio. 162	de Rosis siccis 572	Glandes 224
de Fumaria maior.	Granatorum acero-	Symph. petrum 92
148	forum 142	Synodontes lap. 273
de Glycyrrhiza 160	dulcium. 142	Syrupi. vide Sirupi.
de Hyssopo 161	In fusionis Rosa-	
de Hedera terre-	rum 146	T.
stri, siue Pulmo-	Infusionis Viola-	Tamariscus 76
monarius 606	rum. 146	Terebinthinā co-
de Iuinibis 158	Myrtinus cōp. 168	quendi modus 368
de Lupulo 170	Refectiuus, Cordi	Terebinthus & Resi-
de Melissa, Fernellii	177	na Tereb. 534, 535.
573	Violarū comp. 138	Terebinthi loco
de Mēthamāior 149	Sifer 63	quid 368, 468.
de Mentha minor	Sifimbriūvid. Sifym.	Terra vel Rubrica
150	Sifon 87, 88, 131.	Lemnia 112, 538
de Nymphæa 165	Siftra 64	Sigillata 521, 538
de Papauere comp.	Sifymbrium. 51, 292.	Terræ Cimolix loco
167	Smaragdilo loco quid 57	quid 131
de Papauere simp.	Smaragdus 55	sigillatæ loco quid
167	Solanum 338	57, 58, 75, 112.
de Polypodio 575	Sorba. 339	Testiculi Vulpis, her-
de Pomis 141	Spargula 319, 320	ba. 100, 101
de Præsis 160	vera 325	Tetrahite 320
de Pyris Val. Cordi	Species ad supposi-	Thamar 22
176	toria 224	Theriacalbin, vel Te-
de Quinquæ radi-	Spica Celtica 77, 79.	rentalbin. 239, 246,
cibus 137	102. Lauēdula 310	262, 271.
de Scolopendrio	Romina. 77, 85, 121	Theriaca 101 & seq.
575	Spina nigra vel ex-	312.
de Stæchade cōp.	rulea 112	eius descriptiones
163.	Spodii loco quid 67	varie 512. præpa-
de Stæchade simp.	69, 262, 272.	ratio. 553
163 Fernellii 627	Spodii præparat. 365	verda dicta 514
de Succo Acetolæ	Spodium 264.	CUR γαλβαν
159	Squamæ artis 354, 355	514
de Succo Borag-	Scæte 526, 525	eius vires, quando
nis 160	Syrax, seu storax	recens danda, quā-
de Succo Buglossæ	111, 115, 284.	do antiqua, qua
170.	rubea. 94, 266.	doli 515, 559. & seq.
de Succo Endiuiz	Succedanea 456.	The-

Theriaca Londinon-
 sium 563, 564
 Theriac Monspeliē-
 sis formula 545
 Theriaces prepara-
 tio, ex Lobelio, 562
 Theriaca Rusticorum
 522
 Theriaca Andr. 101.
 Andr. senioris. 114
 Diatessaron. 118
 Theriaca pauper. 565
Onoplos. 513. 517
 Thlaspi 11. 232, 536.
 Thymbra. 26. 39.
 Thymiana. 94. 267
 Hammoniacum 131
 Thus, vide Tus
 Tirus 253
 Tormentilla 530, 531
 Triges laxat. 22
 Tribulus aquatic. 314
 Trifolium acetos. 321
 Trochisci. 253, & seq.
 Trochisci de Absin-
 thio. 273
 de Agarico 257
 Alhandal 273
 Alkekengi. 269
 Alindaractron 117
 Alistx mosch. 266
 Androis 642
 Bechii albi 274
 Bechii nigri 275
 de Berberis. 265
 de Camphora 270
 de Cappare 261
 de Charabe 268
 de Corallo 520, 521
 Cyphi 257
 Diaui 263
 Diaion 263
 Diarrhodon 264
 de Eupatorio 262
 Gallix moschatx
 266
 Hedychroi 253,
 255, 256, 257.
 de Lacca 264
 de Lacca, Valerii
 Cordi 276

I N D E X.

de Myrrha 268
 Ramich 259
 de Rhabarb. 265
 de Rosis 270
 De Rosis simp. 585
 Scillitici 253
 de Spodio 278
 de Succino, Valerii
 Cordi 277
 de terra figill. 271
 Theriaci 109
 de Tiro 253
 de Violis purg. 585
 de Viperis 253
 è Minio, corro-
 dentes 605
 Tryphera magna 77
 minor 78
 Persica 81
 Sarracenia 79
 Trypherarum disse-
 rentiz 449, 450.
 Tus albi aut flauū
 masculum 71
 Tusilago 166
Valeriana 321, 540
 Valerii Cordi
 epitaphium 597
 Vas duplex 180
 Venter Mergi 131
 Vermicularis 337, 336
 Vesicaria 153
 Vicia 516
 Vini Falerni loco
 quid 462
 Viperx 517, 518
 Viola 190, 263
 Violaria 190
 Viperx 109, 253, 513
 Virol. 381 & seq.
 Vlmus 348
 Umbilicus marinus
 278, 335
 Veneris 337
 Unguenta 313 & seq.
 Unguent. Aegyptia-
 cum 333
 Agrippæ regis 313
 Alabastrinum 592
 Album 331
 Album caphur. 344
 Anodynum 595
FINIS.

Apokolorum
 Aregon
 de Arthanita
 ius
 de Arthanita
 nus
 Aureum
 ad Carunculas
 pene
 Citrinum
 Comitissæ
 De Lathyride, I
 nelii.
 Dialthza cōp.
 Dialthza simp.
 Diapomphol.
 Fuscum
 Martiatum
 Martiatum
 gnum
 Martiatum parū
 328
 Nicotianum
 Pectorale
 Pediculorum
 Populeum
 Porabile
 Rosat. Mesur
 Rubeum caphu-
 rum
 ex Succis Arāti
 de Tabaco
 Ungula caballina
 Vomitiūm miti
 Ferneli 542 &
 Vomitiūm valid
 Ferneli
 Vna Lupina
Xylaloēs
 Xylobalsamum
 543, 544.
 Xylobalsami 1
 quid 59, 61, 5
 Xylocasia 21, 2
 Xylocinnamomi
 quid 2
Zambach
 Zarnabum 1
 gum, & rotund.
 Zedoaria 31, 55.
 312, 544.
 Zucumbeth. 55

